

# HIPPOCRATES CONTRACTUS

IN Q U O

Magni *Hippocratis* Medicorum Principis  
Opera omnia, in brevem Epitomen, sum-  
ma diligentia redacta habentur.

Audio & Opera THOMÆ BURNET, M. D. Medici  
Regii, & Collegii Regii Medicorum *Edin-*  
*burgensium* Socii,



EDINBURGI,

Excudebat J. Reid, Sumptibus Georgii Mosman,  
Bibliopolæ. In Area Parliamenti. Anno 1685.



Edinburgb the seventh day of August. 1685

Forasmuch as there being an adresse made to the Lords of his Majesties Privy Councill, By Mr. Thomas Burnet Doctor of Medicine, Physitian ordinary to his most Sacred Majesty, and Fellow of the Royall Colledge of Physitians at Edinburgb, in Scotland, Desiring that in regard he hath composed and caused Print a book Intituled *Hippocrates Contractus*, which is approven by the said Colledge, he might have the ordinary priviledge allowed to Authors and Composers of Books,

The saids Lords having Considered the foresaid adresse, doe hereby give and grant the sole priviledge and licence of printing of the said book to the said Doctor Thomas Burnet, or his order, for the space of Nineteen years after the date hereof. Discharging all persons whatsomever from Printing, reprinting, importing, vending or selling any of the saids books in this Kingdom, without the speciall licence of the said Doctor, or his Assigneyes under the pain of Confiscation thereof to his or their behoove, besides being farther punished as the Councill shall think fit. Extracted by me

Colin Mckenzie.

Cls. Sti. Conf.



ILLUSTRISSIMO ac NOBILISSIMO

Domino, D. **JACOBO**

**PERTHI** Comiti, Baroni de **DRUM-**  
**MOND**, *Strathiernæ Seneschallo Hæ-*  
*reditario, Serenissimo Regi ab inti-*  
*mis & Secrerioribus Consiliis, Re-*  
*gnique Scotiæ summo Cancellario,*  
*Patrono suo Eminentissimo.*

Nec non,

Clarissimis Excellentissimisque Viris D. **RO-**  
**BERTO SIBBALDO** Equiti aurato Archiatro  
& Præsidi dignissimo, D. **ROBERTO TROT-**  
**TERO**, D. **IOANNI LEIRMONTIO** Cen-  
soribus Æquissimis, reliquisque Regii Medicorum  
Collegii apud *Edinburgum* Sociis Doctissimis,

*Hunc parvæ molis librum, in honoris,*  
*summæque observantiæ, & amicitia*  
*integerrimæ tesseram, humillime offert,*  
*dedicatque,*

**THOMAS BURNET,**  
*Socius & Collega.*

## A P P R O B A T I O.

**C**um Dominus Thomas Burnetus *Medicine Doctus*,  
 & *Medicus Regius ordinarius Regique medicorum*  
*Collegii apud Edinburgum Socius*, librum à se com-  
 positum, cui titulus, *Hippocrates Contractus*, no-  
 bis perlegendum exhibuerit; atque in eo nihil sit, quod  
 bonis moribus repugnet, quin ipsa totius Hippocraticæ  
 doctrina medulla in ipso expressa sit, multisque proinde  
 usus, cum tyronibus, tum in praxi versatissimis esse  
 poterit, dignum esse censemus, qui typis impressus,  
 in publicam lucem emittatur. In cuius rei fidem subscrip-  
 tiones nostras manuales apposuimus primo die Augusti  
 anno Domini, 1685.

Robertus Sibbaldus *Præses*,  
 R. M. C.

Robertus Trotterus *Censor*,  
 R. M. C.

Joannes Leirmontius *Censor*,  
 R. M. C.



## Prælatio ad LECTOREM.

**L**icet Macrobio (Lector Benevole) in somnium Scipionis libro, Hippocratem nostrum tam falli quam fallere nescium aperte pronuncianti, assentiri non possim, neque etiam usquequaque placeat, cum multis, divino virum ingenio Ethniscum appellare, fatendum tamen ultro, summum fuisse Philosophum, Summum item Medicum, multorum bonorum nobis auctorem, rarissimi doni virum, semper & ubique laudandum, satis pro dignitate nunquam. Quam fuerit acris ingenii, stupendæ eruditionis, ac iudicii subacti, vel inde conjicere licet, quod ex parvis & vulgaribus initiis, in magnam artem medicinam provexerit, omnesque Antecessores suos longè superârit, in hunc usque diem à nullo hactenus superatus, licet quam plurimi post eum æternâ laude digni extiterint Medici. Genuina enim ejus scripta, quæ temporum injurias huc usque evaserunt, eruditis lectoribus summam semper pariunt admirationem, nec est quod vel ipse Zoilus carpere possit, tam terse, rotunde, eleganter, ac succincte omnia proponit. Vera etiam ut plurimum dicere, qui in artis operibus probè versatur, haud dubie affirmabit. Non mirum ergo quod illum tota dehinc posteritas Medicorum Principem summo suo merito indigitaverit. Præ aliis quibuscunque peritissimum fuisse magnum Hippocratem in prognosi stabilienda, & præsagienda vita & morte, satis indicans aurei & prorsus admirandi prognosticorum & coacarum prænotionum libri: Quam diligens etiam fuerit & curiosus observator omnium, quæ circa egrotantes sunt, rerum, libri Epidemiorum fuscè ostendunt. Liber Aphorismorum tanto ingenio conscriptus creditur, ut

( )  
ut existimarent veteres eum omnem vim ingenii  
humani superare. In morborum curatione adeo  
fœlix, ut Herculem Alexicacum quis jure voca-  
verit, ferocium & ferarum ægriitudinum depul-  
sorem ac domitorem. Hanc suam suspiciendam artem,  
in Græcis servandis, summa benevolentia manife-  
stam fecit, cum peste à Barbaris in Græciam per-  
vadente, demissis per loca convenientia suis dis-  
cipulis, medelas indicavit, quibus qui uteren-  
tur, instantem pestem securè effugere possent:  
Pro qua gratia Atheniensium Senatus, honores  
divinos Herculi (ex quo oriundus) æquales, illi  
decrevit, & corona aurea mille coronatorum co-  
honestavit. Tanti viri fama & gloria permotus  
Artaxerxes Longimanus Persarum rex, illum per  
Hystanen Helle Ponti præfectum, ad exercitum  
suum morbis Epidemicis laborantem curandum,  
maximis propositis muneribus, ac honoribus Per-  
sarum Optimatibus æqualibus, perhonorificè in-  
vitavit, sed ille sorte sua contentus, divitiarum  
& honorum contempтор, nec regi regum (ita enim  
Artaxerxi seipsum vocare placuit) parere, nec  
Græcorum hostibus opitulari voluit. Dignus certe  
est Hippocrates qui omnium Medicorum manibus  
continuo teratur, cujus scriptis evolvendis non  
parvam Medici impendant operam, quem etiam  
nocturna versent manu, versentque diurna; lectio  
enim hic vel decies repetita placebit.

Multis ab hinc annis que proficua magis, &  
utilia ex omnibus Hippocratis libris, gravesque  
omnes sententias in proprium usum excerpti, ut  
peregre ægrorum causa, (quod quandoque fit)  
proficiscens, Hippocratem facile portatilem præ ma-  
nibus semper haberem. Hunc parvæ molis librum  
quem mihi soli diu servaveram, forte conspiciens  
D. Robertus Sibbaldus Eques auratus, Medicus  
doctissimus, Collegij Regij Medicorum Edin-  
burger-

burg  
pluri  
ibor  
lum p  
hoc c  
diam  
ssima  
ant  
mi t  
merit  
stani  
Quo  
iis ex  
fonti  
iis p  
nolun  
possum  
prope  
niqu  
cet  
fami  
cuiqu  
lecto  
dum  
nosle  
que j  
cum  
minu  
breve  
lecto  
ac  
diss

burgenſium Praeſes digniſſimus amicus meus  
 plurimum colendus, ac raptim perlegens, au-  
 thor fuit & ſuaſor ut in Philiaſtorum gratiam il-  
 lum publici juris facerem. Multa quidem me ab  
 hoc conſilio diſſuadebant, quod nimirum ſocor-  
 diam ſoveret, & ab Hippocratis lectione utili-  
 ſſima retraheret, nec bene ſerè ubique audi-  
 ant aliorum operum abbreviatores, licet pluri-  
 mi tales de republica literaria quam optime ſint  
 meriti, ut facile eſſet oſtendere. Hic tamen non ob-  
 ſtantibus, id mihi tandem paſſus ſum perſuaderi.  
 Quod non ſolum perutilem futuram hanc Epitomen  
 iis exiſtimaverim, quibus quando lubet, ipſum  
 fontem adire conceſſum ( expertus loquor ) ſed &  
 iis praefertim qui Hipocratem domi habere, vel,  
 nolunt, vel, ob rem domi anguſtam, vix  
 poſſunt. Multos enim medicos reperire licet ( non  
 propterea laudandos ) qui medicorum principem vix  
 unquam viderunt, ſaltem nunquam legerunt; li-  
 cet omnibus qui Medicinae nomen dedere, tam  
 familiaris, ac notus debeat hic author eſſe, quam  
 cuique domus eſt ſua. Hi forſan hoc perbrevis per-  
 lecto libello, ad Hippocratem diligenter evolven-  
 dum incitari poterunt. Hunc effectum ſi producat hic  
 noſter labor, nec operam nec oleum perdidici. Ubi-  
 que ſerè loca paralela ad marginem notavi. Gre-  
 cum textum conſulto omiſi, ne faſtidium lectoribus  
 minus in ea lingua exercitatis, crearet, tum ut  
 brevior eſſem. Speramus benignis oculis aequum  
 lectorem, conatum hunc noſtrum conſpecturum,  
 ac animum publicam utilitatem adjuvandi cupi-  
 diſſimum amice interpretaturum. Vale.



**M**edicinam revocavit in lucem Hippocrates, genitus in Insula Coo Æsculapio dicata. Is cum fuisset mos, liberatos morbis scribere in templo ejus Dei quid auxiliatum esset, ut postea similitudo proficeret, exscripsisse ea traditur, atque ( Ut Varro apud nos credit ) jam templo cremato, Medicinam instituisse. Plinius. lib. 29. Naturalis Historiæ. cap. 1.

Ex Hippocratis vita per Soranum.

Obiit apud Larisseos, ætatis anno 90. ut alij vero octogesimo quinto, alij centesimo quarto quidam etiam centesimo nono: Inter Gyrtone & Larissam sepultus est. Et in hunc usque diem monumentum ostenditur, in quo multo tempore examen fuit, quod mel conficiebat, quo nurrices infantes superficarijs oris ulceribus (aphthas dicunt) laborantes, apud tumultum illinebant, & facile liberabant. in multis imaginibus velato capite pingitur. Duos reliquit filios, Thessalum & Draconem, qui clarissimi fuisse perhibentur.

Galenus lib. de Theriaca Pisonem, cap. 16.

Summis laudibus prosequor admirandum Hippocratem qui pestem illam ex Æthiopia, ad Græcos, venientem, non alio presidio repulit, quam aerem purum faciendo, ne ab hominibus (qualis tunc erat) infectus hauriretur. Præcepit itaque, ut per totam civitatem ignis accenderetur, qui non solum è simplici materia constaret, sed bene olentes coronas & flores haberet: Talia siquidem ignibus alimenta subministrari consuluit, & ut unguenta quam pinguißima infunderent, & id genus alia bonum odorem fundentia, ut hoc pacto cives aerem purum inspirantes, ab imminente lue tuti forent.

# HIPPOCRATES CONTRACTUS.

## SECTIO PRIMA.

*Hippocratis ius-jurandum, apud.*

**P**ER Apollinem Medicum & Æsculapium, Hygiamque & Panaceam jure-jurando affirmo, me quantum viribus & judicio valuerō, quod nunc juro, & ex Scripto spondeo plane observaturum, Præceptorem quidem qui me hanc artem edocuit, Parentum loco habiturum, eique cum ad victum, tum etiam ad usum necessaria, grato animo communicaturum. Ejusque posteros apud me eodem loco quo germanos Fratres fore, eosque si hanc artem addiscere volent, absque mercede & Syngrapha edocturum, Præceptionum quoque & auditionum totiusque reliquæ disciplinæ, cum meos & ejus qui me edocuit liberos, tum discipulos qui medico jure-jurando nomen fidemque dederint participes facturum, aliorum præterea neminem. Victus etiam rationem, quantum facultate & judicio consequi poterō, ægris utilem me præscripturum, eosque ab omni noxa & injuria vindicaturum; neque cujusquam præcibus adductus, aliqui medicamentum lethale propinabo, neque hujus rei Author ero; neque similitatione mulieri pessum subdititium ad foetum corrumpendum exhibebo: sed castam & ab omni scelere puram, tum vitam, tum artem meam perpetuò prestabo. Neque verò calculo laborantes secabo, sed magistris ejus artis peritis id munus concedam, in quamcunque autem domum ingressus fuero, ad ægrotantium salutem ingrediar, omnem injuriæ inferendæ & corruptelæ suspensionem procul

cul fugiens, tum vel maximè rerum venerarum cupiditatem, erga mulieres juxta ac viros, tum ingenuos, tum servos. Quæ verò inter curandum, aut etiam medicinam minime faciens, in communi hominum vita, vel videro, vel audiero, quæ minimè in vulgus efferri oporteat, ea arcana esse ratus, filebo. Hoc igitur jus-jurandum, si religiosè observâro, ac minimè irritum fecero, mihi liceat cum summa apud omnes existimatione perpetuò vitam felicem degere, & artis uberrimum fructum percipere. Quod si illud violavero, contraria mihi contingant.

---

*Hippocratis Lex, 1010.*

**O**mnium artium Medicina nobilissima. Verum propter eorum qui eam exercent ignorantiam, eorumque qui temerè de his judicant, omnibus artibus jam longe inferior habetur. Cujus erroris ista mihi potissimum esse causa videtur, quod soli arti medicæ nulla in Urbibus, præterquam ignominia, præfixa est poena, quæ eos qui ex ea constant minimè attingit. Hi tragædiarum actoribus maximè similes videntur, quemadmodum enim illi figuram quidem & habitum ac personam eorum quos referunt habent, illi ipsi autem verè non sunt; Sic & Medici fama quidem & nomine multi, re autem & opere valde pauci.

Quisquis medicinæ scientiam sibi verè comparare velit, cum his ducibus voti sui compotem fieri oportet, natura, doctrina, loco studiis apto, institutione à puero, industria & tempore: Imprimis igitur natura opus est, quæ repugnantia irrita sunt omnia. Si verò natura ad optimam viam commonstret, artis doctrina paratur, quam ex institutione à puero, in loco ad disciplinam probe à natura accommodato, cum prudentia sibi comparare oportet. Ad hæc longi temporis industriam accedere necesse est quo disciplina veluti

gra-



gravidata, feliciter & bene crescendo maturos fructus efferat.

*Liber de Arte, des néans.*

**E**orum aliquid quæ nondum inventa sunt, invenire, quodque invenisse quàm non invenisse præstiterit, similiterque imperfecta ad finem deducere, id mihi videtur illius esse munus, qui intelligens existimari expetit. Qui verò ea quæ ab aliis sunt inventa, inhonestorum verborum artificio contaminare contendit, neque quicquam corrigit, sed à peritis inventa apud imperitos traducit, is sanè prudentiæ existimationem tueri velle non videtur, sed potius naturam suam, aut ignorantiam maliciosè prodere.

Medicina est quæ sane in totum à morbis ægros vindicat, morborumque vehementiam obtundit, neque iis qui à morbo victi sunt, manum admoveret, cum id medicinam præstare non posse probe constet.

Qui verò ex morientium calamitatibus artem funditus delere conantur, miror quàmnam satis iusta oratione elati, in morientium intemperantiam causam non rejiciunt, sed eorum qui medicinam exercent prudentiam accusant. Quasi medicorum sit, quæ non conveniant præscribere, in ægrorum autem facultate non sit aliquid contra imperata admittere. Atqui longe magis est rationi consentaneum, ægròs non posse imperatis obsequi, quam medicos ea quæ minimè conveniunt imperare.

Ejusdem est scientiæ morborum causas nosse, & morbos ipsos omnibus medicamentis, quæ augescere morbum prohibent, curare posse. Medicus siquidem suffecerit ad cognoscendum, sufficiet etiam ad sanandum.

Si verò is, in quo morbus cognoscitur, superetur,

ob id sanè quod serius medicum accessit, aut ob morbi celeritatem peribit.

In Medicina valent tum qui in bonis disciplinis liberaliter sunt educati, tum qui a natura non infelicitè sunt comparati.

Si verò res non succedit Medico pro animi sententia, meo quidem iudicio, in morbi vehementiam, non in artem ipsam culpa rejicienda est.

## De Prisca Medicina.

*ἡ ἀρχαία ἰατρικὴ.*

**S**unt autem opifices alii quidem mali, alii verò multum præstantes: quod sanè minimè contingeret, si prorsus non existeret Ars medica, nihilque in eà vel observatione, vel inventione constaret, omnesque illius ex æquo in experti & ignari essent, ægrotantiumque rebus fortuna præ-esset. At verò nunc aliter hæc se res habet: ut enim aliarum artium cunctarum opifices plurimum inter se differunt, tum manu, tum mente, sic etiam in Medica evenit arte.

In Medicina via inventa est, per quam præclara multa longo temporis spatio sunt inventa, & reliqua deinceps invenientur, si quis probe comparatus fuerit, ut ex inventorum cognitione ad ipsorum investigationem feratur.

Necessitate homines coacti artem medicam invenerunt, quod ægrotis oblata bene valentium victus ratio nihil contulerit. Nemo enim, mea quidem opinione, ad Medicinam investigandam animum applicaturus fuisset, si eadem victus ratio, & ægris & sanis accommodata esset.

Multa mala & varia ex plenitudine oriuntur, neque verò minus gravia ex inanitione, ut proinde in his maxima insit varietas, magnaue diligentia requiratur. Modum enim quâdam conjectura colligere oportet.

oportet. Modum autem ad quem ista referas, ut exactè cognoscas, nullum alium invenies præter corporis sensum. Quocirca istud adeo exactè cognoscere, ut leviter in utramque partem pecces, operosa res est. Quanquam equidem vehementer hunc Medicum laudâim qui parum peccet. At exacta certitudo rarò cernitur.

Medicorum plerique malorum navium gubernatorum mihi simillimi videntur; qui si tranquillo mari navem regunt, nemo eos peccare deprehendat, quod si eos vehemens ventus aut tempestas oppresserit, jam omnibus manifestè constat eorum imperitia & culpa fuisse perditam. Ad hunc sanè modum improbi plerique Medici dum leviter affectos curant, in quibus vel gravissimi errores commissi nihil periculi admittunt, (cum multi hujusmodi morbi ac longe frequentius quam graviore hominibus contingant) in iis quidem si delinquant, plebeios latent: ubi verò in magnum & vehementem ac periculosum morbum, incidunt, tum ipsorum ars & errores omnibus sunt conspicui. Horum enim cujusque vindices poenæ præsto sunt, neque in longum differuntur. Ejusmodi naturas quæ celeriter ac vehementer suorum delictorum incommoda percipiunt, equidem reliquis imbecilliores esse censeo.

Rectè mihi videntur illi artem dignam judicasse, quæ ad Deum Authorem ex majorum institutis referretur. Nam neque sicco, neque humido, neque calido, neque frigido hominem lædi existimaverunt, neque horum aliquo ei opus esse. Sed quod in unoquoque potentius esset, & supra naturam humanam, adeo ut ab eâ superari non posset, id lædere censuerunt, & tollere conati sunt. In Homine inest & amarum & salsum, & dulce & acidum, & acerbum & insipidum, aliaque sexcenta, quæ pro copia & viribus varias habent facultates.



## De Medico, &amp; inq̃.

**A**D Medici auctoritatem mihi pertinere videtur, ut perspiciat, quoad ejus natura feret, bene colorato & optime habito sit corpore. Putant enim plerique non inum, si qui minus feliciter corpus dispositum habeant, eos neque aliis rectè consulere posse.

Præterea ejus cultus mundus esto, vestis sit decora, & unguentis utatur benè olentibus citra omnem odoris suspicionem; istud enim jucundum esse ægrotantibus solet.

Eum quoque spectare oportet ut animi temperantiam excolat, non taciturnitate solum, verum etiam reliqua totius vitæ moderatione: Quod ad illi comparandam gloriam plurimum adfert adjumenti.

Bonis etiam ac honestis sit moribus, unaque gravitatem cum humanitate conjunctam habeat: promptitudo enim & facilitas medendi effusè oblata, ab ægris contemnitur, quamvis alioquin summæ benignitatis officium illud sit. At considerandum quando his uti liceat; eadem enim apud eosdem cum rara sunt æstimantur.

Quod ad gestum attinet, vultu sit ad prudentiam composito, non aspero tamen, ne superbus videatur & misanthropus. Qui verò in risum effusus est & supra modum hilaris, molestus habetur, quod vel imprimis vitandum est: æquum item in omni vitæ consuetudine se præstare debet.

Turpissimum est per manus operam non assequi quod cupias.

[*Docet insuper quomodo officina Medica instrui debeat, ubi se demittit Hippoc. ad Tyrocinia prima futuri Medici, imo plebei Chirurghi: veteres enim externa in Medicina discipulos primum exercebant.*]

## De Decenti Habitu.

*ἢ ἐξ ἡμετέρων.*

**A**d incesum eo semper sint habitu, qui non tam ad superfluam curiositatem, quam ad optimam existimationem, prudentiam & animi moderationem comparatur; minimè diffuentes aut superflui: in hominum concursibus graves, ad respondendum appositi, adversus altercantes difficiles, in similibus familiaritatibus contrahendis prospicientes, erga omnes moderati, ad emotiones taciturni, ad respondendum arguti & tolerantes, in occasione prudenter captanda appositi, in victu frugales, & paucis contenti, oratione efficaces, qui quicquid doctrina acceperunt, in medium proferunt, & facultate dicendi utuntur, ad gratiam comparati.

Ad hæc omnia præcipue dux est natura. Etenim si adfuerit his, qui artibus instructi sunt, ad prædicta omnia aditus erit amplissimus.

Præclara res est, quæ ex opere quod quis didicit, proficiscitur oratio: opinio maximè in Medicina in crimen vertitur his qui ea utuntur; in calamitatem verò, his qui ejus opera fruuntur.

*ἰατρὸς φιλόσοφος ἰσθίει.*

Medicum urbanitatem quandam sibi adjunctam habere convenit: Austeritas enim tum sanis tum ægris difficilem accessum præbet: observare autem eum maxime oportet ne multas corporis partes nudet, neque cum plebeiis de rebus multis, sed tantum necessariis, confabuletur.

Quæcunque autem agat, nec perfunctorie nimis (*ἢ ἐγγύς*) nec curiose (*μὴ φαντασίας* pompose) agat.

In ingressu meminisse convenit sessionis, densissimi habitus, amictus compositi, authoritatis, breviloquentiæ, ut nihil perturbate agas, assensus, diligentiæ,

tiz, contradictionis ad ea quæ occurrunt, constantiz in teipso ad tumultus supervenientes, in turbis castigandis severitatis, denique promptitudinis ad ministeria.

Crebro ægrum invise.

Medicus in promptu habeat linamenta concerpta, splenia, vincula, medicamenta tum ad vulnera, tum ad oculos comparata, instrumenta etiam, machinas & ferraamenta; alter item sit apparatus simplicior, quo ad manus operam utaris, ad peregrinationes accommodatus. Promptissimus autem est, qui via quâdam & ratione comparatur. Malagmatum (*sic. cataplasmatum*) quoque genera ad singulos usus præparata habeas, potiones item incidendi facultate præditas, cuique generi accommodatas. Ad manum etiam sint quæ ad Medicamentorum purgationes faciunt, ex locis convenientibus desumpta, eo quo decet modo pro suo quæque genere & magnitudine præparata, tum quæ ad vetustatem diligenter sunt reposita, tum quæ recentia pro temporis occasione in usum veniunt. Reliquaque ad eandem rationem, ut his adornatis, cum ad ægrotum ingressus fueris, nequaquam animo hæreas, cum singula habeas, ad id quod fieri debeat, accommodata.

Priusquam ad ægrotum ingrediaris, fac cognitum habeas quid agendum sit. Pleraque enim non rationatione, sed auxilio indigent; eventa igitur per experientiam cognita, prædicenda. Id enim gloriam adfert, & cognitum est facile.

*Præceptiones. παρηγορίαι.*

**T**Empus dicendum est, in quo occasio consistit, occasio autem, in qua tempus non multum. Medicatio in tempore fit, aliquando etiam occasionem requirit. Ne pigeat ex plebeiis scissitari, siquid  
ad



ad curandi opportunitatem conferre videatur. Sic enim censeo artem universam commonstratam fuisse, quod singula ex fine observata, & ad eadem aggregata fuerint.

Non oportet asseverare quod unum aliquod exhibitum remedium profuturum sit.

Suadeo ut interdum gratis cures, ita ut memoris gratitudinis potiore, quam presentis existimationis rationem habeas, quod si vel hospiti, vel egeno largiendi occasio se offerat, his vel maxime succurrendum est. Qui enim erga homines humanum se exhibuerit, is artis amore teneri censetur. Multi namque ægri cum sciant se morbo minimè saluari teneri, etiam medici diligentia sanitati restitutos esse celebrare gaudent.

Neque sane indecorum fuerit, si Medicus in rei presentis angustia circa ægrum versatur, imperitiæ etiam tenebris circumfusus, alios quoque accersiri jubeat, quo communi consilio quæ in rem ægri sunt, disquirantur, & illi ad præsidiorum facultatem operas suas conferant. Ubi enim assidue urget affectio, morbusque increscit, plurima in animi angustia ad rem presentem opportuna elabuntur. Tunc igitur confidenti animo esse oportet.

Hoc jurejurando affirmare audeam, Medicum ratione utentem, alterum nunquam invidiosè calumniaturum. Sic enim animi impotentiam prodet. Verum id promptius faciunt qui forensæ quæstus sectantur.

Ægri diuturnam appetentiam erigit indulgentia, quæ interdum morbum fovet.



## SECTIO SECUNDA,

*Continens συμμωτικὰ.*

## Liber Prænotionum.

*πρὸ γνωστικόν.*

**M**edicus ad providentiam sibi comparandam omne studium adhibeat. Cum namque præsenferit & prædixerit apud ægros, tum præsentia, tum præterita, tum futura, quæque ægri omittunt, exposuerit, res utique ægro-  
rantium magis agnoscere credetur, adeo ut ma-  
jore cum fiducia sese homines Medico committere  
audeant. Curandi verò rationem optimè molie-  
tur, si ex præsentibus affectionibus, futura præ-  
noverit. Neque enim fieri potest, ut omnes ægro-  
ti sanitatem assequantur, hoc namque longè præ-  
stantius foret, quam futurorum consecutionem præ-  
noscere. Si quid etiam divini (τὸ θεῖον) in morbis  
inest, hujus quoque providentiam ediscere oportet.

Hæc ratione meritò sibi admirationem & boni  
medici existimationem conciliaverit. Qui nam-  
que morbo superiores esse possunt, eos utique  
longè rectius conservaverit ex longo antea inter-  
vallo ad singula consilium dirigens, tum etiam  
morituros, tum evasuros ubi, prænoverit & præ-  
dixerit, extra culpam positus erit.

*Signa  
ex facie.**Coac.*

212.

*Facies**Hippo-  
cratica.*

In morbis autem acutis imprimis quidem ægroti  
facies consideranda venit, sitne benevolentium, præ-  
cipueque sui ipsius similis, ita enim optima erit.  
Quæ verò simili est contraria, periculi plena est.  
Qualis fuerit nasus acutus, oculi concavi, col-  
lapsa tempora, aures frigida & contractæ, imif-

que

que suis fibris inversæ, cutis circa frontem dura, intenta & arida, & totius faciei color pallidus aut niger, aut lividus, aut plumbens. Si itaque inेतente morbo talis facies fuerit, neque adhuc ex aliis signis conijcere poteris, interrogare oportet, num vigilarit homo, an alvus profusè fluxerit, an inædiâ & fame laborarit. Quod si quid horum fateatur, minus periculi subesse putandum erit. Dijudicantur autem ista die ac nocte, si ob eas causas ejusmodi facies fuerit. At si nihil horum præcessisse dixerit, neque intra dictum tempus ad dictum statum redierit, in propinquo mortem esse sciendum est.

Alia etiam signa consideranda, tum ex universo corpore, tum ex oculis. Si namque lucem refugiant, aut præter voluntatem illachrimant, aut pervertuntur, aut alter altero minor sit, aut ejus albæ partes sint rubræ, aut palpebræ lividæ, aut venulis nigris, si oculorum alba obsita fuerint, aut lippientium oculorum sordes (ἀῖμας) circa eorum aciem appareant; aut etiam assidue mobiles, aut foras projecti, aut vehementer cavi fuerint, vel etiam squalida oculorum acies si sit, & minimè lucida, aut si color totius faciei immutatus fuerit, hæc omnia mala perniciosaque existimanda. Per somnum etiam an ex oculis aliquid subappareat spectare oportet; ubi namque non commissis palpebris ex albo quid subapparet, id si neque diarrhæa, neque medicamentum purgans expresse-rit, neque ita dormire consueverit æger, prævum id signum est & funestum valde.

Lethale quoque, labra resoluta, pendentia, frigida & exalbida esse.

At ægrum à Medico in latus dextrum aut sinistrum recumbentem deprehendi oportet, manibusque & cervice ac cruribus paulum reductis, totoque corpore molliter posito. Hic enim ferè sani jacentis est habitus. Is autem habetur optimus

*Ex decubitu.*

*Coac.*  
497.

decubitus, qui bene valentium similis est. Supinum vero jacere, manibus, collo & cruribus, valde projectis, minus bonum. Quod si pronus ad pedes de lecto delabatur, magis formidandum. Quod si etiam denudatis pedibus deprehendatur, nec admodum calidis, manibusque, collo, ac cruribus inæqualiter projectis & nudis, malum id est, inquietudinem enim significat. Lethale quoque hianti ore assiduè dormire. At in ventrem jacere, ei qui per bonam valetudinem ita dormire minimè consuevit, delirium, aut partium circa ventrem dolorem indicat.

*Ex stridore dentium.*

In febribus autem dentibus stridere, ex quibus à puero minimè est consuetum, insaniam & mortem significat, quod si etiam deliranti id accadat, exitiale admodum jam est.

*Ex ulceribus.*  
*Coac.*  
496.

Ulcus quoque sive ante morbum, sive in morbo, natum sit, nosse oportet. Nam si periturus est æger, lividum, pallidum, & siccum ante mortem erit.

*Ex manuum gesticatione.*

De manuum motione ita censeo: in febribus acutis, aut pulmonum inflammationibus, aut phrenitide, aut capitis doloribus, quibus ante faciem feruntur & aliquid frustra venantur, & festucas colligunt, aut floccos è vestibis evellunt, & ex pariete paleas carpunt, ex his omnibus malum & mortem portendi.

*Ex spiratione.*

Spiratio crebra si fuerit, dolorem significat, aut inflammationem in partibus diaphragmate superioribus; quæ verò magna est respiratio & ex magno intervallo, delirium significat. Frigidus autem spiritus, qui è naribus & ore efflatur, valde est funestus. Facile verò spirare, valde magnum ad salutem momentum existimandum, cum in omnibus morbis acutis, quibus febris conjuncta est, tum in his qui intra dies 40. judicantur.

*Ex sudoribus.*

Sudores optimi quidem per omnes morbos acutos, qui diebus judicatoriis contingunt, & peni-



rus febre liberant. Boni verò quicumque toto corpore oriuntur, faciuntque ut æger morbum facilius ferre videatur. At qui nihil tale efficiunt, minimè sunt utiles. Pessimi autem frigidi, qui- que circa caput tantummodo, faciem & cervicem exoriuntur: ii namque cum acuta febre mortem, cum mitiore verò, morbi longitudinem prænunciant. Sudores boni sunt, qui guttatim & cum exhalatione fiunt.

Hypochondria optima quidem quæ dolore vacant, mollia sunt & æqualia, tum dextra, tum sinistra parte: incensa verò aut dolentia, aut intenta, aut inæqualiter affecta dextrâ parte ad sinistram, hæc omnia animadvertenda sunt. Quod si etiam pulsus in hypochondriis insit, perturbati- onem, aut delirium indicat. Verum etiam eorum oculos intueri oportet, si namque oculi crebrò moveantur, insania expectanda est.

Tumor verò in hypochondrio durus & dolens, pessimus quidem est, si totum occupet hypochon- drium, si verò alterutra tantum pars obfessa fue- rit, minus formidabilis erit tumor qui in sinistrâ regione consistit. Significant autem huiusmodi tumores circa principia mortem brevi adfuturam: quod si neque intra 20. diem febris quiescat, ne- que tumor subsidat, ad suppurationem res verti- tur. His autem primo circuitu etiam sanguinis è naribus fluxus contingit, valdeque juvat; verum eos interrogare oportet, num capite doleant, aut ocu- lorum hebetudine teneantur; nam si quid horum adfuerit, eo sanguis repit. In junioribus tamen, neque dum 35. annum attingentibus, sanguinis eruptio maior expectanda est. Tumores molles do- loris expertes, digitisque cedentes, tardiores crises efficiunt, sed tamen minus illis verendi sunt. Quod si intra dies 60. neque febris cesset, neque tumor subsidat, fore suppurationem hoc loco & reliquo ventre significat.

*Liber  
de crisi-  
bus.*

*Coac.*

572.

573.

*Lib. de  
crisi-  
bus. A-*

*phor. 37*

*Secl. 4*

*Ex Hy-*

*pochon-*

*driis.*

*Coac.*

279.

282.

*Coac.*

280.



Ventris tumores minus abscedere nati sunt, quam qui in Hypochondriis oriuntur; minime vero qui infra umbilicum in pus vertuntur.

Suppurationum, quæ hinc proveniunt, ea observatio facienda est. Quæ foras vertuntur, optimæ sunt ubi parvæ sunt & quam maximè foras feruntur, & in acutum tendunt: pessimæ verò quæ magnæ sunt & latæ, minimèque in mucronem attolluntur; at quæ intro rumpuntur, optimæ, ubi nihil cum externâ sede communicant, in sese contrahuntur, nullo dolore afficiunt, totaque regio externa unius coloris apparet.

*Ex pure.*

Pus verò optimum est album, leve & æquale, & quam minimum graveolens. Huic autem contrarium pessimum.

*Ex Hydropre.*

*Coac.*

452.

Aqua inter cutem quæ ex acutis morbis oritur mala; nam neque febre liberat, vehementesque dolores excitat, & lethalis est. Oritur ferè ex laterum inanitate & lumbis, partimque à jecore. Quibus igitur ex laterum inanitate & lumbis initia ducuntur, iis pedes intumescunt, & longa alvi profluvia detinent, quæ neque dolores ex laterum inanitate ac lumbis tollunt, neque ventrem molliorem efficiunt. At quibus à jecore hydrops ortum ducit, his tussis & tussendi cupiditas inest, sed nihil effatu dignum expuunt, pedesque intumescunt, ac venter non nisi dura ægreque egerit, & circa alvum tumores fiunt, qui partim dextrâ, partim sinistrâ parte oriuntur & desinunt.

*Ex Caloris & frigoris inæqualitate.*

*Coac.*

492.

*Ex gravitate & levitate.*

*Coac.*

493.

Caput, manus & pedes frigere, ventre & lateribus calentibus, malum denunciat; at corpus totum æqualiter calidum esse ac molle optimum.

Ægrum quoque facile converti oportet, & cum sese attollit levem esse. Quod si gravis esse videatur, tum reliquo corpore, tum manibus & pedibus, in angusto spes est.

Præter

Præter gravitatem verò si ungues & digiti livescant, mors confestim expectanda est. At omnino nigri tum digiti, tum pedes minus quam liventes perniciosi sunt. Sed alia signa consideranda; si enim facile malum ferre videatur & aliud quoddam ex salubribus signis adfuerit, morbus ad abscessum vergit, ita ut æger morbo quidem superesse, & partes corporis denigratæ decidere debeant.

Testes autem & pudenda ubi sursum contrahuntur, vehementes dolores, & mortis periculum denunciant.

Pessimum est, si neque noctu, neque interdum dormiat, nam aut ob dolorem vigilia adest, aut delirii affuturi hæc nota est.

Alvi dejectio optima est, si mollis est & consistat, eoque tempore quo per sanitatem dejici solet, copia verò ciborum ingestorum rationi responderit. Quod si liquida fuerit dejectio, consentaneum est, ipsam neque stridere, neque paucum & crebrò excerni, frequens enim desidendi labor ægrum fatigat, eique insomniam adfert. Si sæpe & multum alvus feratur, deliquii animi periculum erit. Crassiorem fieri dejectionem oportet, morbo ad crisin eunte. Sit etiam subrufa, neque admodum graveolens. Expedit etiam lumbricos teretes una cum excrementis alvi descendere, morbo ad crisin properante. Valde aquosum aut album, aut pallidum, aut prærubrum, aut spumans dejici, hæc omnia calamitosa sunt. Præter hæc, malum est, quod exiguum, glutinosum, candidum, subflavum & æquale existit. His verò magis funesta sunt nigra aut pingua, aut livida, aut æruginosa, aut graveolentia. Dejectiones variae majorem quam illæ diuturnitatis spem adferunt. Sed tamen non minus sunt funestæ. Hujus modi sunt, strigmentosæ, biliosæ, cruentæ, porraceæ & nigrae, sive secedant simul, sive aliæ ab aliis segregatæ.

*Ex unguibus, & digitis.*

*Coac.*  
493.

*Ex testibus & pudendis.*

*Coac.*

494.

*Ex vigilis.*

*Coac.*

497.

*Ex alvi dejectione.*

*Coac.*

601.

*Lib. de crisis.*

*Lib. de crisis.*

*Coac.*

611.

*Lib. de crisis.*

Fla-

*Ex flatibus.**Codc.*

495.

Flatum sine sonitu ac crepitu exire optimum. Præstat tamen cum strepitu prodire, quam istuc revolvi. Et cum ita erumpit, aut dolere quid hominem significat, aut delirare, nisi fortè sponte sua flatum sic emittendum duxerit.

*Coac.*

281.

Hypochondriorum dolores & tumores recentes quidem & sine inflammatione, murmur solvit in ipso Hypochondrio exortum, idque potissimum si cum stercore, urina & flatu prodierit; sin minus ubi ipsum per se transmissum fuerit, juvat: idque magis si ad inferiores sedes descenderit.

*Ex urinis.**Coac.*

375.

*Lib. de crisib.*

Urina optima est cum & alba fuerit Hypostasis & levis & æqualis per omne tempus quoad morbus judicatus fuerit: talis enim ad securitatem & brevitatem morbi præclare apparet. Sin talis urina intermissio quædam sit ut modo pura reddatur, modo Hypostasis alba & levis subsidat, diuturnior quidem est morbus, & minus res ægri in tuto sunt. Sin subrubra reddatur urina cum Hypostasi æquali & lævi, diuturnioris quidem morbi ea erit, quam illa jam memorata, sed admodum salutaria. Quæ in urinis (*νεμενώδεις*) farinæ crassioris speciem Hypostases referunt, pravae sunt; his multo peiores sunt laminæ (*πιταλώδεις*) albæ verò & tenues admodum sunt perniciosæ; sed his omnibus magis funestæ sunt furfuraceæ. (*πικρογώδεις*) nubeculae quæ per urinas feruntur, albæ quidem bonæ sunt, nigrae verò malæ. Quandiu autem fuerit urina rubra & tenuis, morbum adhuc pepasmi expertem significat. Quod si diu talis reddatur, periculum est ne vires ægri valere non possint, donec urina mitigata fuerit. Inter urinas funestissimæ sunt graveolentes, aqueæ, nigrae, & crassæ. Sed tum viris, tum mulieribus urinae nigrae pessimæ, pueris verò aqueæ. Quicumque tenues urinas ac crudas diu excernunt, siquidem alia ut convalituri signa appareant, his quidem in partibus diaphragmate inferioribus abscessum

*Lib. de crisib.**Lib. de crisib.*

ex-

expect  
tes ara  
liquati  
quæ n  
perster  
quæ d  
censer  
tur, i  
vesica  
reddic  
per se  
Vo  
perm  
Nam  
vomi  
aut n  
ciem  
omne  
beat  
in pr  
qui t  
tridi  
vomi  
Ex  
pulm  
pecte  
tum  
pium  
aut  
tè p  
rum  
lent  
palli  
gine  
app  
mhi  
dat  
I



expectare oportet. Sed & pinguedines supra innatantes araneorum telas referentes, damnare oportet, colliquationem namque significant. In urinis autem quæ nubeculas habent considerandum venit, an supersistent, vel subsidant, & quosnam habeant colores: quæ deorsum feruntur cum dictis coloribus bonæ censendæ & commendandæ, at quæ sursum feruntur, malæ & vituperandæ. Neque tibi imponat vesica quoquo modo affecta, si hujusmodi urinas reddiderit, non enim totius corporis, sed ipsius per se indicium est.

Vomitus perquam utilis est, qui pituita & bile permixtus est, nec admodum crassus nec multus. Nam meraciores pejores sunt. Sin autem id quod vomitione excluditur porraceum sit, aut lividum, aut nigrum, quamcunque horum colorum speciem referat, in pravis habere oportet. Quod si omnes illos colores idem homo vomitione exhibeat, valde quidem id lethale est. Sed mortem in propinquo esse significat lividus ille vomitus qui tetrum odorem spirat. Nam omnes subputridi & graveolentes odores in iis omnibus quæ vomitu rejiciuntur, mali sunt.

Expectoratum verò in omnibus morbis qui in pulmones & latera incidunt, citò & expedite expectorari debet, sputoque flavum valde permixtum apparere; etenim si multo post morbi principium expectoretur aut flavum quid, aut rufum, aut quod multam tussim adferat, neque exquisitè permixtum sit, deterius est. Flavum si sincerum fuerit, periculi plenum est. Quod album est, lentum & rotundum, inutile. Pravum etiam est pallidum admodum & spumans (& viride & æruginosum) at si adeo sincerum fuerit, ut etiam nigrum appareat, id illis deterius est. Malum etiam si nihil expectoretur, nec quicquam pulmo excludat, sed plenus ferveat in gutture.

In omnibus pulmonis morbis gravedines &

D

ster-

Ex Vo-  
mitu.

Coac.

556.

Exspu-  
tis.

Coac.

390.

Coac.

399.



sternutationes tum præire, tum subsequi, malum. Verum in aliis morbis alioquin funestissimis, sternutationes juvant.

*Coac.* 390. Expecttoratum flavum non multo perfusum sanguine, quod peripneumoniacis incunte morbo, expecttoratur, ad salutem apparet mirificeque prodest. Septimo verò die ac tardius, non adeo securum.

*Coac.* 391. Sputa omnia mala sunt quæ dolorem non sedant, pessima etiam nigra ut prius proditum est. At omnium quæ excreantur optima quæ dolorem

*Coac.* 394. sedant. Horum verò locorum dolores, qui neque per sputorum purgationes, neque alvi dejectionem, neque venæ sectionem, aut medicamenta purgantia & victus rationem sedantur, eos ad supurationem tendere sciendum est.

*Ex suppuratis.* Suppuratorum quæcunque bilioso adhuc expectorato suppurant, periculi plena sunt, sive illud biliosum per se, sive puri permixtum expectoretur: *Coac.* 392. Et potissimum si illud suppuratum ceperit expectorari ab ejusmodi sputo, morbo ad septimum diem progrello; atque cum qui talia expectorat, metus est interiturum 14. morbi die, nisi aliquod

*Coac.* 393. bonum signum intervenerit. In bonis signis hæc numerantur. Facile morbum perferre, bene spirare, dolorem sedatum esse, sputum sine difficultate rejicere, corpus æqualiter calidum aut molle videri, sine siti esse, urinas, dejectiones, somnos & sudores (laudabiliter fieri) ut ante definitum est, singula supervenire, bona exultimanda sunt. His enim omnibus sic contingentibus, fieri non potest ut homo moriatur. Quod si ex his quædam quidem contingant, quædam minus, non ultra 14. diem æger vitam producet. Contra autem ægrè morbum sustinere, respirationem magnam & frequentem esse, dolorem minimè sedari, expectoratum vix tussiendo educi, ardere siti, ipsumque corpus à calore inæqualiter affici, ventrem & latera vehementer calere, fronte, manibus

nibus  
ta,  
scrip  
enim  
prius  
II. d  
Re  
tur,  
quæ  
nis in  
febri  
& si  
tur.  
signa  
tio f  
venit  
& n  
sanu  
desup  
in qu  
tos h  
si feb  
levio  
dore  
& et  
sed  
rant  
bore  
adur  
flag  
nim  
Diu  
ones  
bene  
E  
so c  
ilico  
tum

nibus & pedibus frigidis, urinas, alvi excrementa, somnos & sudores, unaquæque qualia descripta sunt, mala esse nosse convenit. Si quid enim ex his sputo supervenerit, morietur æger, priusquam ad diem 14. pervenerit, aut 9. aut 11. die.

Reliquæ suppurationes magna ex parte rumpuntur, aliæ quidem 20; aliæ 30. aliæ etiam 40. aliæ etiam ad 60. diem deveniunt. Suppurationis initium colliges ab eo die quo primum æger febricitavit, aut etiam primum rigorprehendit, & si loco doloris pondus quoddam grave sentiat. Hæc enim sunt ineuntis suppurati certissima signa. Quod si in altero tantum latere suppuratio fuerit; tum vertere, tum ediscere ad hæc convenit, num dolor aliquis alterum latus detineat, & num altero calidius fuerit, atque ubi in latus sanum decubuerit, interrogare, si quod ei pondus desuper impendere videatur, sic enim altero latere in quo pondus extiterit suppuratio est. Suppuratos his signis cognoscere oportet, primum quidem si febris non demiserit, sed quæ interdum quidem levior fuit, de nocte gravior evadat; tum verò sudores incidunt multi (circa collum & jugulum) & etiam tussis, tussiendoque cupiditas iis oboritur, sed tamen nihil tussiendo memorabile expectorant: quin etiam oculi fiunt concavi, ac genæ rubore perfusæ apparent, & manuum ungues fiunt adunci, digiti verò maximèque summi ardore conflagent, & in pedibus tumores fiunt, cibos minimè appetunt, & pustulæ toto corpore oriuntur. Diuturnæ igitur (pectoris & pulmonis) suppurationes his indicantur signis, quibus multa fides habenda est.

Ex suppuratis illi maximè supersunt quos eo ipso die, quo rupta est vomica, febris dimisit, & illico cibos appetunt, ac sitis sunt planè expertes, tum alvus pauca & figurata reddit, tum pus ipsum

Coac.  
402.

Coac.  
402.

Coac.  
402.

Coac.  
402.

sum album est & læve & uniusmodi, & pituitæ expers, tum & si absque dolore & vehementiori tussi expectoretur: qui ita affecti sunt optimè & celerrimè liberantur. Sed (à suppurato) intereunt, quos (à rupta vomica) febris non dimisit, aut si febricitandi finem fecisse videantur, iterato incendio conflagrant, & siti ardent, nec ullo edendi amore tenentur, tum alvo sunt profusiore, pus autem viride & lividum expectoratur, aut pituitosum & spumans. Si hæc inciderint, brevi intereunt. Sed quibus horum alia quidem apparent, alià verò non, ex iis quidam intereunt, alii verò in multo tempore supersunt.

Coac.  
395.

Quibus verò in peripneumoniacis morbis abscessus incidunt pone aures, & suppurant, aut ad infernas partes decumbit, & fistula excitatur, hi sane supersunt. Huiusmodi abscessus fore intelliges hoc modo: si febris detineat, nec ulla doloris remissio adferatur, nec expectoratum convenienter feratur, nec biliosa alvo secedant, nec facile alvus meracis feratur, nec verò urina profusè reddatur, cum multa hypostasi, atque certa salutis spes ab aliis signis salutaribus affulgeat, tum commemoratos abscessus fore spes est.

Coac.  
396.

Qui in crura decumbunt abscessus a peripneumonia vehementi & calamitosa, præclare quidem omnes ad salutem faciunt, sed illi optimi qui in expectorati mutationem incidunt. Si verò tumor & dolor suboriatur, sputo è flavo in pus verso, & foras prodeunte, hoc modo tum securissimè æger superstes futurus est; tum citissimè citra dolorem abscessus quiescet. Quod si neque sputum rectè excernatur, neque urina bona hypostasi prædita sit, periculum est ne articulo claudicat æger, aut ei multum negotii exhibeatur: Si verò dispareant abscessus & intro recurrant, sputo non prodeunte, & detinente febre, gravis morbi periculum & delirii & mortis ægro imminet.

Eorum



Eorum verò qui à peripneumoniâ sunt pu- *Coac.*  
rulenti , seniores magis intereunt , at ex cæteris 439.  
suppurationibus , juniores potius moriuntur.

Lumborum & inferiorum partium dolores qui  
cum febre affligunt , si illis relictis septum trans-  
versum invadant , exitiales admodum sunt.

Cum suppurati uruntur , si purum pus fuerit &  
album , nec tetri odoris , convalescunt ; at quibus  
subcruentum & cænosum , moriuntur.

Vesicæ tum duræ , tum dolentes grave prorsus *Ex vesi-*  
& exitiale periculum minantur ; maximè autem *ca in-*  
exitiales sunt , quæ cum febre assiduâ fiunt. Nam *flam-*  
& ipsarum vesicarum dolores ad mortem inferen- *matio-*  
dam satis sunt , neque alvi hoc tempore excernunt, *ne.*  
nisi durum quiddam & coactum. Solvit autem *Coac.*  
purulenta micta urina album & leve habens sedi- 471.  
mentum. Quod si neque cum urinâ quicquam  
dolor remiserit , neque mollior vesica reddatur ,  
febrisque assidua fuerit , laborantem intra primos  
morbi circuitus moriturum sperandum est. Hòc  
autem morbo potissimum tentantur pueri à 7.  
anno ad 15.

Febres judicantur iisdem numero diebus quibus *Ex fe-*  
& evadunt & moriuntur homines. Etenim febres *bribus.*  
mitissimæ & tutissimis signis conjunctæ , quarto *Lib. de*  
die cessant , aut etiam celerius. Maximè verò *crisibus.*  
malignæ & quæ cum signis calamitosi existunt ,  
quarto die interficiunt , aut etiam prius. Primum  
ergo naturæ & morbi certamen sic definitur , se-  
cundum ad septimum diem producit , tertium  
verò undecimo definitur die , quartum ad 14. pro-  
ducitur , quintum ad 17 , sextum ad 20. neque  
verò horum quicquam integris diebus exactè nu-  
merari potest.

Qui ex morbo evasuri sunt facilè spirant , dolore  
vacant , noctu dormiunt , aliaque securissima signa  
habent. At perituri difficultate spirandi vexantur ,  
delirant , vigilant , cæteraque pessima signa habent.

*Puer-*

*Ex Capitis dolore.*

Puerperis à partu crìses contingunt.

Capitis dolores vehementes & pertinaces cum febre conjuncti, si (funestum) aliquod signum accesserit, valde perniciosi existunt. Si verò absque ejusmodi signis, 20. d. em dolor exceſſerit, & febris detineat, narium profluvium, aut imis in partibus abscessum forè suspicionem adfert. Verum dolore adhuc recenti, æque profluvium sanguinis aut suppuratum sperari potest, tum alias, tum si dolor circa tempora & frontem affuerit. At sanguinis eruptio magis expectanda venit in his qui nondum 35. annum attigerunt in senioribus suppurationo.

*Ex Auris dolore.*

*Coac.*  
189.

Auris dolor acutus cum febre continuâ & vehementi, formidabilis, periculum enim delirii & mortis ægro adfert: moriuntur autem ex hoc morbo juniores quidem homines 7. die aut etiam citius, seniores verò multo tardius. Nam & febres & deliria minus iis suboriuntur, auresque eam ob causam suppurationo præoccupat. Sed in his ætatibus succedentes morbi reversiones plurimos interficiunt. Juniores verò priusquam auris suppuret, intereunt. Si verò pus album ex aure manarit, tum juveni salutis spes affulget, si aliud quoddam ei bonum signum supervenerit.

*En Fauces.*

Fauces exulceratæ cum febre grave aliquid portendunt, at si aliud aliquod signum adfuerit ex his quæ antea prava esse censuimus, ægrum in periculo versari denunciandum est.

*Ex Angina.*

*Coac.*

363.  
364.  
365.

Angina gravissima quidem est & celerrimè interimit, quæ neque in faucibus, neque in cervice quicquam conspicuum facit, plurimum verò dolorem exhibet & difficultatem spirandi, quæ erecta cervice obitur, inducit; hæc enim eodem etiam die, & 2. & 3. & 4. strangulat. Quæ verò ceteræ (anginæ) parem doloris vim adferunt, sed tamen intumescunt, & fauces rubore suffundunt, perniciosæ quidem valdè sunt, sed diuturniores

niores iis quas jam descripsimus, si ingens rubor fuerit. At quibuscunque una fauces & cervix insigniter rubent, huiusmodi sunt diuturniores. Maximèque nonnulli ex iis evadunt, si cervicem & pectus rubor detineat, neque ad interna erysipelas revertatur. Quod si neque diebus criticis dispareat erysipelas, neque tuberculum ad externas partes prorumpat, nec pus expectorarit, facileque ac sine dolore habere videatur, mortem indicat, aut ruboris reversionem; at securius est tumorem & ruborem ad externa converti. Quod si ad pulmonem se vertat, dementiam excitat, & ex his nonnulli suppurati plerumque evadunt.

Quibus febres cessant, neque apparentibus solutionis signis, neque diebus judicatoriis, iis recidiva expectanda est. In longâ febre, salutariter tamen affecto ægro, si neque ob inflammationem aliquam, nec ob ullam aliam evidentem occasionem dolor detinet, in hoc abscessus cum tumore aut dolore ad articulum aliquem expectandus, maximèque in inferioribus locis. Huiusmodi abscessus magis contingere solent iis qui 30. annum non attigerunt, minimè senioribus. *Ex febribus*

Si quis in febre non lethali dixerit sibi caput dolere, aut oculorum aciem caligine quâdam perstringi, & stomachi dolor accesserit, tum vomitio biliosa aderit; ex iis autem quibus incunte morbo caput dolere cepit, 4to morbi die magis premuntur, quam 5to; 7mo autem remissionem consequuntur. At quibus 3. die dolet caput, hi maximè vexantur die 5to. 9. vero aut 11. liberantur. Quicunque vero 5tum diem morbi agentes laborare ceperint, 14. die morbus judicabitur.

At verò quibus in febre caput dolet, & suffusionis caliginosæ loco hebescent oculi, aut etiam ignes micant ex oculis: & cardialgiæ loco, dextra aut sinistra hy-



hypochondriorum parte, distentio quædam percipitur doloris & inflammationis experts, his narium profluvium vomitionis loco, jam jam adfuturum spes est. Sed juvenibus potius illud expectandum est. Iis verò qui 30. annum attingunt & senioribus minus, sed in his vomitiones expectandæ.

Puerulis convulsiones incidunt, si febris acuta fuerit, nec alvus feratur, & somni sunt expertes, & terreantur, & ejularint, tum etiam si colorem mutant, ac pallido vel livido vel etiam rubro suffundantur. Hæ (convulsiones) facilè incidunt puerulis nuper natis ad 7 ætatis annum; at grandiores pueri & viri non adeo per febres convulsionibus prehenduntur, nisi vehementissimum & pessimum quoddam signum ex his quæ in phrenitide fieri solent, affuerit. In Lybia, Delo, & Scythia præscripta signa vera comperiuntur.

## De Humoribus.

ὑμῶν.

**P**Epasmi tempore fiunt, & vel foras vel intro, aut alio fluunt quo decet.

Quæ socia sunt atque vicina primum & maximè vitiantur.

*Aphor.*

21. 23.

*Sec. 1.*

Quæ ducenda sunt, quo maximè vergunt, eo per loca convenientia ducere oportet. Quæ prodeunt copia minimè sunt æstimanda, sed quamdiu prodeant, qualia oportet, & æger facilè ferat.

Si quæ pars ante morbum laborârît, ibi morbi sedes erit, velut iis contigit qui in Perintho tussi & anginâ laborârunt.

Humores quibus anni temporibus efflorescunt, nosse oportet, & quales in singulis morbos efficiant,

ciant,  
nes pa  
Mi  
deranc  
Ut

ter, a  
dem d  
Non f  
ita etia

Pro  
les eru

Ub

bus ca  
guas

Cur  
mis fi

tusses  
etiam

afferre  
re.

Au  
nem e

broru  
value

mado  
tes o

Q  
fauci

tates  
præv

sunt.  
Æ

pora  
M

tem  
N

ben  
tem

cient, & quasnam in unoquoque morbo affectiones pariant.

Mutationes ex quibus ad quænam fiant considerandæ.

Ut se habet Terra arboribus, ita animantibus venter, alit, calefacit & refrigerat: Refrigerat quidem dum vacuatur, calefacit verò cum impletur. Non secus ac stercoreta Terra, hieme, calida est, ita etiam ventriculus.

Pro anni temporis varietate, similes aut dissimiles erunt morbi, qui hoc tempore oriuntur.

Ubi æstas veri similis extiterit, sudores in febribus eæque faciles, neque peracutæ erunt, neque linguas vehementer aridas habebunt. *Aphor. 6. Sect. 3.*

Cum verò ver hibernum fuerit, & extremæ hiemis frigora senserit, hiberni etiam morbi fient, & tussiles & pulmonum inflammationes & angina. Anni etiam tempora morborum reversiones plerumque afferre solent, sicut & ejusmodi morbos facere.

Austri auditus gravitatem afferunt, oculis caliginem offundunt, capitis gravitatem inducunt, membrorum torporem ac languorem faciunt. Cum hic invaluerit, ejusmodi in morbis contingunt, ulcera madentia, os præsertim, pudendum, aliasque partes occupant. *Aphor. 5. Sect. 3.*

Quod si Aquilonia fuerit tempestas, tussiles fiunt, faucium asperitates, alvi duriores, urinæ difficultates, horrores, laterum & pectoris dolores. Hac prævalente, ejusmodi morbi maximè expectandi sunt. *Aph. 5. Sect. 3.*

Æstas bilem gignit, ver sanguinem, & alia tempora, ut singulorum fert natura.

Mutationes potissimum morbos pariunt, & in anni temporibus magnæ mutationes. *Aph. 1. Sect. 3.*

Naturarum alix ad æstatem, alix ad hiemem, benè aut malè se habent, morbi alii ad alia anni tempora benè vel malè se habent; ætates quoque ad *Aph. 3. Sect. 3.*

tempora & regiones, & victus genera & morborum constitutiones.

*Aph. 4.* *Sect. 3.* Regiones ad anni tempora malè affectæ cujus temporis similitudinem habent, ejusmodi morbos pariunt. V. g. inæqualis calor & frigus, si eodem die contigerint, autumnales morbos in regione creabunt; & in reliquis anni temporibus eadem ratio servabitur.

*Lib. 6.* *Epid.* *Sect. 3.* *Aph. 28.* Qui Sanguinem per ora venarum quæ in Ano sunt, profundere solent, ii neque pleuritide, neque pulmonis inflammatione, neque Phagædæna, neque furunculis, neque terminthis corripuntur, ac fortè ne lepra quidem, fortassis verò neque vitiliginibus. Intempestivè autem curati multi, non ita multo post hujusmodi morbis correpti sunt, & perniciosè idcirco habuerunt. Quod in reliquis abscessibus contingit, veluti fistulis, quæ aliorum medela sunt.

*Lib. 6.* *Epid.* *Sect. 3.* Impedimento est (Sanguinis missioni) iis qui cruenta expuunt, anni tempus, pleuritis, & bilis.

*Aph. 31.* Quibus sub judicationis tempus, juxta aures exorta tubercula minimè suppurarint, iis subidentibus, morbi reversionem fieri contingit.

*Lib. 6.* *Epid.* *Sect. 3.* Quæ sedare solent, cum postea apparent, eà si prius fiant, liberant.

*Aph. 28.*

## De Crisibus.

**S**I suborto sudore, morbus cesset, & urina fulva, cum sedimento albo conspiciatur, iis eodem die febris revertitur, quæ 3to die sine periculo judicatur.

Quibus in febre minime lethali, capitis dolor est,



est, aliaque signa circumstunt, in his bilis superat. Qui primis diebus dolore vexati, 4to & 5to die magis urgentur, 7mo die febre liberantur.

Febribus ardentibus si post 7um diem morbus regius succedat, sudoris indicium est.

Judicationem faciunt copiosa mictio, sudor, vomitus, alvi dejectiones, & Sanguinis ex naribus fluxio, mensium item fluxus.

Febre ardente finiente, si morbus regius succedat, non solet amplius sudare, neque alibi usquam abscessum facere, sed sanus evadit.

Tertiana ut plurimum 7. circuitibus judicatur. *Aph. 59. Sect. 4.*

Quibus in molestis febribus, 7. 9. aut 14. die icterus oritur, bonum est, nisi dextra præcordia obduruerint, sin minus, res in dubium venit. *Aph. 64. Sect. 4. Coac.*

Acuti morbi intra dies 14. ferè judicantur. *121.*

Sudores febricitanti si contingant 3, 5, 7, 9, 11, 14, 21, & 30 die, hujusmodi sudores morbos judicant, qui verò non sic contingunt, labores portendunt. *Aphor. 36. Sect. 4.*

Urinarum concoctiones paulatim maturescentes, si diebus judicatoriis concoctæ fuerint, morbum solvunt.

Urinas cum ulceribus conferre oportet. Ulcera namque si repurgando pus album rejiciant, celerem curationem denunciant, sed si ad saniosos humores convertantur, maligna evadunt.

In febribus si urina mutationes habeat, temporis longitudinem indicat, ægrumque tum ad deteriora, tum in alteram partem necessario commutari.

Si urinæ primis minimè similes, sed ex crassis tenues evadant, & omnino tenues, ex difficilem & minimè certam judicationem faciunt.

Quâcunque corporis parte calor aut frigus inest, ubi morbus est; eique celeres in toto corpore mutationes contingunt. Quod si corpus perfrigescat, *Aph. 39. Sect. 4.*

*Aph. 40.* aut rursus incalescat, colorque subinde mutetur, *Sect. 4.* ista morbi longitudinem portendunt.

Si febricitanti sudor succedat, neque febris desinat, malo est, producitur enim morbus, & humiditatem significat. Sano sudor copiosus immodicè contingens morbum portendit, æstate quidem minorem, frigore verò majorem.

Quibus in alvi dejectione bilis atræ quid subest, si copiosius, major est morbus, si parcius, minor.

In febribus ardentibus, si morbus regius & singultus sto die contingat, lethalis est. Morborum reversionibus tentantur, quibus in febricitatis vehementes vigiliæ, aut turbulenti somni adveniunt, aut corporis robur solvitur, aut singulorum membrorum doloribus adsunt, & quibus febres non accedentibus solutionis signis, neque diebus judicatoriis quiescunt.

Si judicatione factâ, urina rubra subsidentiam rubram continens reddita fuerit, his febris reversio eodem die contingit, ex eâque pauci servantur.

Quibus judicationis tempore exorta ad aures tubercula non suppurantur, his solutis morbi reversio pro recidivarum ratione, simili circuitu contingit.

Atrâ bile vexatis & phrenitide detentis, Sanguinis per venas ani profluvium bonum est.

Qui inter loquendum hæsitant ac balbutiunt, ut nec labris moderari queant, si hæc cessent, purulenti evadunt.

Vehementem in locis inferioribus dolorem surditas solvit, aut copiosus ex naribus Sanguis profluens.

Infania magnum morbum consuetudine jam familiarem solvit.

Quibus in febribus ardentibus coxendicium dolor est, oculorum perversio, aut cæcitas, aut

testium tumores, aut mammarum elevatio, hæc febrem solvunt, aut etiam Sanguinis ex naribus profluvium.

Tremores in febribus delirium solvit.

Febri rigor succedens febrem solvit, & sudorem evocare solet.

Quibus in febribus aures obsurduerint his nisi febris solvatur, furorem contingere necesse est. *Aphor. 60.*

Solvit autem Sanguis ex naribus effluens, aut alvus biliosa effundens, aut dysenteria, aut coxendicum, aut genuum dolor succedens. *Sect. 4.*

Quibus dolores derepente oriuntur, præcordia sursum attolluntur, si dolores vehementes ad notam costam contingant, his venæ sectio & deorsum purgatio solutionem adfert.

In aqua intercute detentis, si aquosus humor per venas in alvum aut vesicam effluat, solutio contingit.

Si leucophlegmatia detento vehemens alvi profluvium succedat, solutio contingit.

Qui alvi profluvio diutius cum tussi detinentur, non liberantur, nisi dolores vehementes ad pedes contigerint.

Capite dolore vehementer affecto, si pus per aures aut nares effluxerit, morbum solvit.

Quibus per sanitatem derepente capitis dolores obveniunt, confestimque vox deficit ac stertunt, intra dies 7. pereunt, nisi febris prehenderit.

Lippitudine laboranti, alvi profluvio detineri bonum. *Aphor. 17.*

Convulsione aut corporis distentione vexato, si febris superveniat, morbum solvit. Si febre detentum convulsio prehendam, febris eodem die, aut postero, aut 3. desinit. *Sect. 6. Aphor. 57. Sect. 4.*



## De Diebus Criticis.

περὶ κρίσεων.

**A**rtis magnam partem esse duco, posse quæ rectè scripta sunt speculari. Qui enim hæc noverit, iisque utitur, is mihi in arte non multum falli videtur. Unamquamque sanè tempestatem anni & morborum conditionem exacte addiscere oportet, & quisnam morbus bonus, quis periculo conjunctus, aut in temporis conditione, aut in morbo, quinam morbus longus sit & lethalis, longus quinam salutaris, acutus quinam lethalis, vel salutaris. Ex quibus tum criticorum dierum series contemplanda est, tum etiàm prædicendi facultas suppetit. Preterea ex his, quibus, & quando, & quamnam victus rationem præscribere oporteat, cognoscere licet.

## Prædictorum Liber primus.

Προφητικὸν α.

*Coac.*  
244. 6. **E**X creatio frequens & irrita, si quidem aliud quoddam signum affuerit, phrenitidem portendit.

8. Desipientiæ quæ jam admodum fractis & debilitatis viribus, succedunt, pessimæ sunt, non secus ac Thrasynonti.

*Coac.*  
91. 13. Albicans dejectio in phreniticis mala est. His si rigor contingat pessimum.

93. 14. In furiosa & vehementi mentis emotione, succedentes tremores malignitatem denunciant.

16. Phre-

16. Phrenitici parum bibunt, ex levibus strepibus facile irritantur ac percelluntur, tremuli sunt.

*Coac.*  
96.

18. In febre ardente, si tinnitus aurium, cum visus hebitudine fiant, & ad nares accedat gravitatis sensus, furiosa mentis emotio indicatur.

23. Vocis defectiones cum singultu & virium

*Coac.*

24. exolutione, pessimæ.

245.

44. Ab homine moderato ferox & audax responsum, malum portendit.

38. Ubi alvus humescit, æger lassitudine, capitis dolore, siti, vigiliis torquetur, obscure loquitur, & admodum est impotens, in his casibus vehementem mentis emotionem expectare oportet.

52. Quæ perniciem minantur, ea si absque ulla significatione allevant, mortis periculum denunciant.

56. Ex Hypochondriorum doloribus, abortæ Febres, malignæ sunt.

58. Sudor in febribus acutis multus & copiosus damno est.

65. Ex rigore perfrictiones quæ ad calorem non revocantur, malæ sunt.

70. Dolor in pectore fixus cum torpore, malum denunciat, hi si suborta febre exæstuent, celeriter moriuntur.

97. Lateris dolor cum biliosis sputis præter rationem evanescens, ægros in vehementem & furiosam mentis emotionem agit.

*Coac.*  
418.

106. Lumborum & capitis ac oris ventriculi dolor, cum forti excreatione convulsionem suspectam facit.

107. Non nihil metuendus est cum crisi rigor.

110. In iis quibus rigores imminant, urina restit, & in convulsoribus affectionibus.

*Coac.*  
29.

Præ-

## Prædictorum Liber 2.

Προρρητις β.

**A**Ntequam morbus consistat secura non est predictio.

*De Hy-  
drope.*

Qui aqua intercutem detentus est, & servari volet, cum robustis visceribus & contentis viribus esse convenit, simulque suapte natura facile concoquere, ac benè spirare, sine dolore esse, totumque corpus æqualiter calere, neque extremis partibus esse colliquefactum, prestat namque potius extrema tumefacta esse, etsi optimum est nihil horum adesse. Verum tum mollia, tum gracilia extrema esse oportet, ventrem contactu mollem. At neque tussim neque sitim adesse convenit, neque linguam, cum alias, tum ne à somno quidem, inarescere. Cibos autem suaviter assumere, ac ubi abunde comederit, nihil affligi. Ventrem quoque medicamentis celeriter moveri, alias verò mollia & figurata excernere. Urinam in transitu pro institutâ victus ratione & vinorum mutatione, mutationem sentire. Defatigationem facile sustinere, nec lassitudinem sentire. Si horum omnia vel plurima habeat, spes est ut evadat. In quo verò nihil horum inest, sed contraria adsint, parum relictum est spei.

*De  
Tab.*

Quem rabes malè habet, si probe levare velit, convenit sputum facile tussi rejicere, esseque album & æquale, unius coloris, & sine pituita. Quod à capite defluit ad nares vertatur, neque febris prehendam, ut nec cibos impediatur, neque sitim faciat. Alvus autem quotidie deiciatur, & quod secedit durum esto, & iis quæ assumuntur conveniens. Hominem quam minimè tenuem esse convenit.

venit.  
spidun  
carnos  
is max  
rum h  
Min  
bus ex  
Quod  
laudab  
culent  
nihil  
Ex  
bus in  
ci, &  
levan  
Int  
los in  
tam  
sanari  
timè  
tiones  
nec d  
victu  
alvur  
tem,  
vade  
Pr  
foctu  
ses S  
M  
stan  
tibu  
bus  
L  
nam  
neq  
stor  
quic  
ped



venit. Pectus verò laudandum quadratum & hispidum, cujusque cartilago exigua & admodum carnosa est. In quo namque hæc omnia inerunt, is maximè superstes futurus est. At qui nihil horum habuerit, exitio maximè est affinis.

Minimè evadunt tum virgines, tum mulieres, quibus ex menstruorum suppressione tabes contingit. Quod si ex his aliqua superesse volet, cum multa laudabilia signa accedere, tum verò menses luculenter & manifestè comparere oportet. Alioqui nihil spei relictum est.

Ex Sanguinis eruptione maximè supersunt, quibus in dorso & pectore dolores adsunt melancholici, & ex Sanguinis eruptione dolore quodammodo levantur.

Inter Podagricos qui in senectute tophos aut callos in articulis induratos habent, aut laboriosè vitam tolerant, cum alvo sicca, humanâ arte hi sanari nequeunt. His succedentes dysenteriz optimè medentur, quin & quæcunque aliz colliquationes infernz eos valdè juvant: Juvenis verò, cui nec dum circa articulos calli induruerunt, cuique victus ratio curæ est, ad laborem est impiger, alvumque habet vitæ instituto probè respondentem, is sanè prudentem nactus medicum sanus evadet.

Prægnantes ipsæ plerumque ad partum supersunt, foetumque conservant, etiamsi per multos menses Sanguis & strigmenta per alvum secedant.

Mulieres parvæ grandioribus ad conceptum præstant, tenues crassis, candidæ rubris, nigræ liventibus: Præstant item quibus venæ extant, iis quibus minimè apparent.

Locus conceptui idoneus, quem uterum nominamus, sanus esse, & siccus & mollis debet, ac neque contractus, neque proclivis, neque ore distorto, aut compresso, aut diducto. Etenim quicquid horum contigerit, conceptum fieri impedit.

Ubi ulcus in utero sanatum est, locus iste levior ac durior necessario efficitur, & minus conceptui idoneus.

Qui diu pallidi faciem habent tumidam, eorum certum est, aut capitis, aut viscerum dolore laborare, aut sedem internam quodammodo male affectam esse.

Quibus lienes magni, iis gingivæ vitiantur, & os graveolet: Quibus autem lienes magni sunt, neque Sanguinis eruptiones contingunt, neque os graveolet, in tibiis ii mala ulcera habent, & nigras cicatrices.

Humerorum dolores qui ad manus tendunt, torporesque & dolores exhibent, bilis atræ vomitione sanantur.

## Coacæ Prænotiones.

*Κοινὰι Πρὸςυντοίαι.*

### Titulus Primus.

*De Febris.*

1. **Q**UI ex rigore perfrigent & una dolore tum capitis, tum cervicis impliciti, mox voce capti, parvo sudore madent, ut se collegerint, moriuntur.

4. Ex frigore cum adest metus & mæror præter occasionem, convulsione finis fit. (Nisi hæmorrhoidibus, varicibus, aut etiam menstruali profluvio, convulsione causa tollatur.)

5. Ex frigore pestifera est urinæ suppressio. (ante rigorem præclaret apparet ischuria, & in bonis habetur, sed non è converso; non enim signa critica & causæ critica retro commeant ad significandum.)

*Prover-  
b 51.*

6. In rigore familiares non agnoscere, malum, *Prorrh.*  
oblivio item mala. 64.

7. Posteriorum partium frigus est convulsificum. 67.

10. Qui crebrò & tenuiter exudant (*εφιδρῦντες*) ac subinde rigent, ii perniciosè habent, ac tandem sub mortem suppurati, & alvum turbatam habereprehenduntur.

8. Crebri ex lumbis vel dorso horrores, cum citâ caloris vicissitudine, calamitosi, nam acerbissima urinæ suppressio denunciatur: Atque his exudare pestiferum. (Ex eò quod deductum alimentum elabatur; signum enim est Empyematis cum summâ virium infirmitate conjuncti.) 75

14. Rigores multi cum torpore malignum denunciant. (Ob summam humorum inæqualitatem, quæ valdè exitiales morbos parit.)

15. Rigores qui in 6tum diem incidunt, difficile judicium adferunt.

[Permagni interest quo die, quâve periodo, *Dare-*  
quid fiat in ægris, atque appareat. Ut enim quæ *tus.*  
sunt omnia, quæque apparent diebus criticis, firmiora sunt, quam quæ in alia incidunt morbi tempora: Sic ea quæ speciem boni præ se ferunt, debent haberi suspecta si loco non fiant. Quemadmodum & ea quæ mala esse putantur, mirificos adferunt sanitatis fructus, si antè significata eriseos lege veniant, aut illis diebus quibus certamen naturæ & morbi est in præcinctu.]

17. Dolores horridi cum suspirioso anhelitu, signa sunt tabis.

20. Qui subindè rigore prehendantur, & sub noctem aliquandò gravius habent, pervigiles, in somnis nugantes ac delirantes, interdum sese lotio perfundentes, in convulsionem ii tendunt. *Prorrh.* 101.

21. Qui crebrò cientur in acutis rigores pestiferi. (Quod sint *περίσχυρα μὴ περισπῶντα*. Indican-  
cant aut interni visceris suppurationem, aut frustra  
ten-



tentatam crifim, aut denique nativum calorem extinguui.)

23. Rigor cum posteriorum partium distentione mortem adfert.

*Prorrh.*

I 49.

24. Si cui cum perhorruerit, atque sudarit criticè, rursus poſtridiè horror ſine cauſâ ingruerit, ac tum à pepaſino ſomni ſit expertus, huic eventuram arbitror hæmorrhagiam.

*Dur-*  
*ius.*

[Huc ſpectat hæc difficillima prognofis, ut intelligamus, non raro varias eſſe morborum crifes, quæ ad ſalutem variè ſuſcipiuntur, pro variò humoris motu, naturæ impulſu, & partium obſeſarum conditione: Quæ omnes ſæpè numero denunciantur unâ eâdemque concuſſione, cujuſmodi in rigore cernitur. Eſt conſentaneum, ut ſua cujuſque foci ſit propria evacuatio, capitis per hæmorrhagiam, venarum per liberalem ſudorem, uteri per menſtruale profluviū, omnis ſpes Medici, & cœptæ curationis fiducia, in ſolâ evacuatione ſemper ſtetit.]

*Prorrh.*

I 55.

25. Quæ cum rigore ſiſtuntur urinæ, ſunt pravæ & convulſificæ, idque cum alias, tum ſi cui jam ſoporato ſiſtantur, ac tum præterea parotidas fore ſperabile.

27. Quæ ex rigore incidunt aphoniz, tremore ſolvuntur; ſed & ſupervenientes crebrò rigores, ſuccedentes tremores judicant.

28. Qui ex rigore virium exolutiones & capitis dolores ſentiunt, pleni ſunt periculi: Cruenta his urina prava.

110.

29. Quibus rigor, urina ſubſiſtit.

56.

31. Ex hypochondriorum dolore abortivæ febres, malignæ ſunt: In his ſopor profundus ac altus peſſimus.

32. Qui in febre non intermittente tenuiter & crebrò exudant, cum hypochondrii tenſione, ii ut plurimum malignè habent. Atque in his dolores ad ætromium ac jugulum affixi pravi ſunt.

[Ex

[ Ex sudatiuncula, nulla crisis bona sperabilis; *Dure-*  
 quia nihil paucum criticum. Est autem sudatiun- *tus.*  
 cula capitis & cervicis, aut sudor exiguus quo fit  
 subroscidum totum corpus: Unde vel oppressio  
 partium, vel summa infirmitas significatur, per  
 quam exudat succus alibilis, qui assimilatione pri-  
 vatur. ]

34. In febre (*anaudian*) defectiones sermonis  
 malum.

36. Si quis cum febre laboriosâ perhorruerit,  
 nonnihil criticè exudarit, indeque ardens febri-  
 citarit, malum, idque cum alias, tum si in hoc ne-  
 gotio Sanguis stillarit.

40. Qui ex rigoribus, parvis sudoribus refriges-  
 cunt, malum.

42. Qui exiguo sudore madent cum febre, in  
 metu sunt mortis.

43. Quibus cum biliosa dejectione, premitur  
 morsu pectus (*i. e.* orificium ventriculi) amares-  
 citque os, malum.

45. Si quis in laboriosâ febre, singuliat, vel  
 catoche detineatur, morbo laborat pessimo.

47. Si quis ea faciat, quorum sit insolens, ut  
 si appellat animum ad insueta, aut contra, gra-  
 vissimum habet malum, ac tum delirium ad-  
 est.

48. Quæ cum pravis signis mitescunt, & *Prorrh.*  
 quæ cum bonis non remittunt, molesta sunt & *52.*  
 difficilia.

[ Quemadmodum non minus sua debet habere *Duret.*  
 bona suspecta, qui repentè factus est coloratior  
 & speciosior; quam mala vereri, qui contrâ con-  
 suetudinem multum emacruit, & colorem deco-  
 remque amisit: Ita nemo est omnium qui de se-  
 ipso possit videri securus, si antè vigil, nunc so-  
 poretur, si antè sitibundus, nunc *περὶ λόγους*,  
 superstitute causa sitifera, sitis sit expers. Pluris  
 esse debet unum pravum signum morbi alicujus,

aut partis obsessæ proprium , quam decem bona communia.

*Prorrh.*

44.

45.

66.

40.

51. In homine moderato, ferox & audax responsio , & vox acuta , malum : Hypochondria iis intro sursum trahuntur.

52. Qui ex sudoribus perfrigerantur, ac celeriter recalescunt, malè habere judicantur.

54. Qui abs re nec ulla exhausti ratione , languent infirmi , mortiferè laborant.

55. Diuturna in febre nauseabunda proritatio , screatu finiens , malum portendit.

57. Perpusillæ Sanguinis è naribus stillæ , damno sunt.

*Dure-  
tus.*

[Nisi hæmorrhagiæ liberalioris opinionem faciant , ut sæpè faciunt , quando cum urinæ perpasso in 4tum diem incidunt, apparentque ad hæmorrhagiam 7mo die futuram : Secus enim malignos vel multos humores naturæ dominatu regi non posse , aut infirmitatem summam ipsius naturæ denunciant. Sunt verò sinistri iudicii in qualitate bonâ Sanguinis , at mortiferæ in malâ , qualis in Philisco stillatim manavit.]

*Prorrh.*

57.

58. Omnino malum denunciat , quæ in febre acutâ immeritò (*παραλόγως* præter rationem) sitis extincta est.

59. Qui ad manus contactum resiliunt , malo sunt loco.

*Fesius.*

[In ægris istud diligenter est observandum : Aliquando enim ubi manus in carpum mittitur , quodammodo resiliunt , & cum intremiscentia revelli videntur , aut interdum ad pulsus affilire & leviter assurgere. *Ἀναισθητοὶ ὡς χεῖρα*, dicuntur quibus pulsus velut resilit , aut quasi tremibundus subsultat , & ad manum apparet exiguus tremor. Fit hoc nervis & fibris febris incendio exsiccatis , motrice facultate infirmâ , viriumque languore concurrente. Convulsionem ergo , delirium , aut phrenitidem prædicit , nec leviter suspectum esse debet.]

65. In



65. In febribus vehementes mentis emotiones *Prorrh.*  
(*insidens*) cum silentio; in eo qui voce non est cap- 54.  
tus, perniciem minantur.

68. Febrium initio, si atra bilis sursum aut *Aph. 22.*  
deorsum prodeat, lethale est. *Sect. 4.*

[Excretionum quæ in vitio sunt, quæque do- *Dure-*  
minatu morbi suscipiuntur & fiunt, nulla est om- *tus.*  
nino tam mortifera, quam bilis atra. Est enim  
atra bilis pessimum excrementum, quod feritate  
indomabili cæteris omnibus antecellit, triaque illa  
secum habet conjuncta, quæ vim naturæ adfe-  
runt, quæque illius præsidia maximè labefactant.  
*Tò δεινὸν, τὸ ἀγβρωπικόν, καὶ τὸ οξύδης.* i. a-  
cre, erodens, acidum.]

72. Quibus jam morbo fractis, videndi vis  
audiendique perit, aut etiam labiorum, palpe-  
brarum, vel narium perversio cernitur, mors in-  
stat.

74. In febribus acrisiæ, diuturnitatis quidem sunt  
causæ, non tamen funestæ.

78. Quibus postridie quam invasit, exacerba-  
tio febris est, malè res eunt. At si perendiè mi-  
tius, quarto iniquius exerceantur, gravissimum  
habent malum.

80. Febres si alio die quam judicatorio desierint,  
recidivam metuere oportet.

83. Qui cum feroci perturbatione somno ex-  
cussi, è potestate sui exeunt, gravissimum ha-  
bent malum, & convulsificum: Idque cum alias,  
tum si prorumpant sudores.

[Ut rerum omnium quæ naturæ ad perfruen- *Dure-*  
dum tributæ sunt, nihil est melius, nihil ami- *tus.*  
cius, nihil denique magis consociale, quam illa  
quies, quæ dono Divum gratissima serpit: Ita  
nihil, æquè pestiferum quam molesta vigilia:  
Quemadmodum enim somnus ægrotum reficit, &  
recreat spiritum instauratione, ciborum coctione,  
& morbificorum humorum pepasmo, unde phre-  
nitis

nitis mansuescit : Sic admirabile est quantam principijs trium facultatum labem adferat, quantum naturæ præsidia labefacit, quantisque damnis ipsos ægrotos oneret, si quid vel in causis somniferis vel in somni ipsius necessitate peccetur.]

*Prorrh.*  
5.

90. Quæ in phrenitide memorantur insomnia, bonum denunciant. ( Non turbulenta & tumultuosa, sed placida & tranquilla. )

97. In intensa phrenitide, tremores lethales.

98. Quæ circa res necessarias versantur Deliria, pessima, indeque si ingravescant, mortifera.

114. Quibus per febres assiduas pustulæ toto corpore suboriuntur, mortiferum illud est ; nisi purulento abscessu, qui hic potissimum ad aures erumpit, periculo defungantur.

115. In febre acutâ, exteriora perfrigerari, interiora verò sic uri, ut etiam sitim faciant, exitium portendit.

116. Febres continuæ tertio quoque die ingravescentes, supra modum periculosa.

127. Qui diuturno defuncti morbo, ex animi Sententia cibum capiunt, neque proficiunt, gravissimè relabuntur.

128. Si venæ temporum in febribus pulsent, & facies benè habita fuerit, absque hypochondrii mollitie, diuturnus erit morbus, qui non sine liberali Sanguinis ex naribus profusione, aut singultu, aut convulsione, aut coxendicum dolore desinet.

129. Alvus in febre ardente affatim prorumpens, mortis periculum adfert.

133. Sanguinis ex naribus fluxus in febre ardente 4to die obveniens, malò est, nisi aliud quidpiam benè ceciderit. Quod si die 5to contingat, minus adfert periculi.

137. De febre ardente laborantibus dies 14, aut allevando, aut perimendo decernunt.

142. Si cui febricitanti rubor in facie luceat, unaqueque capitis dolor prægrandis, & venarum emicet pulsus, ferè profluvium Sanguinis è naribus inde venit. Quibus autem fastidia stomachi, cordis morsus, & crebra salivæ, in procinctu vomitio est: Quibus autem ructus adfunt, flatus ventris, sonitus cum inflatione, iis alvus exturbatur.

[Magna expectatio est hæmorrhagiæ criticæ in *Days* morbis acutis, quam si neque Medicus prævidere, *ius*, neque prævisam, cum in propinquo est, velut digito indicare potest, vix videtur summam vituperationem posse vitare.]

144. Quibus autem sæpius recidivæ contingunt, si sextum mensem superaverint, in tabem coxariam ferè incidunt.

149. Febricitare incipientibus Sanguinis è naribus stillicidia cum sternutatione accedentia, si quidem urina 4to die hypostasim habeat albam, vacationem morbi 7mo fore ostendunt.

156. Quæ in febrem cadit convulsio, si eodem die, quiescat, bene est.

## Titulus 2dus.

### De Cephalalgia.

161. **Q**Uæ capitis doloribus & aurium tinnitibus, citra febrem, aut tenebrosam vertiginem, & vocis rarditatem, manuumque stuporem tentantur, in iis aut apoplexiam aut epilepsiam, vel etiam lethargum sperare convenit.

169. In cephalalgia æruginosi vomitus cum *Prorrh.* surditate & somni vacillatæ, insaniam brevi de- *10.* iunciant.



*Prorrh.* 170. Quibus capitis & cervicis dolor, ac totius  
152. corporis infirmitas quædam cum tremore adest, ab  
his hæmorrhagia liberat.

172. Cephalalgiam tollit pus è naribus effluens,  
aut sputa crassa & inodora: Liberat quoque &  
ulcerum eruptio, nonnunquam & somnus, &  
alvi fluxus.

174. Cephalalgia veteriosa cum gravitate ferè  
convulsifica est.

95. 176. Cephalalgici surdastri, qui manibus con-  
tremiscunt, cervice dolent, nigra & aspera mei-  
unt, ac nigra quoque vomunt, planè sunt despe-  
rati.

177. Quibus cum sudatiuncula caput dolet, alvo  
suppressa, convulsione tentantur.

### Titulus tertius.

#### De Caro & Comate.

182. **C**Omate, lassitudine, ac surditate tenta-  
tos, alvus erumpens, & ad crism rubra  
demittens, juvat.

183. Comatosi, fastidiosi, unaque dolenter  
hypochondriaci, sæpe & parum vomentes, aurium  
abscessus habent.

187. Cerebro siderato, alii quidem tertio die,  
alii autem 7mo vitam finiunt, quibus elapsis pe-  
riculo defunguntur; sin autem incisione factâ, os  
dissociatum cernitur, sine dubio moriuntur.

188. Cephalalgicis ex calvarie posticæ fractura,  
si crassior è nare Sanguis rivulosè prorumpat, grave  
malum denunciat.

*Dure-  
tus.*

[ Ictus illatus non minus ossi crassissimo cala-  
mitosus est, quam mitior ictus temporibus at-  
que fronti. Accedit, quod Sanguis niger pro-  
rup-

ruptus , & spaciolissimi merum adfert , & cerebro crudorem & vivacitatis extinctionem inducit. ]

## Titulus quartus.

### De Aurium affectibus.

189. **A**urium dolor intensus cum febre acuta, cumque sinistro quopiam signo, juvenes quidem 7mo die, aut etiam celerius, cum delirio interimit: Nisi liberale sit expuratum ex aure, aut ex naribus hæmorrhagia, aut aliud quoddam laudabile signum extiterit. Seniores autem & serius & rarius tollit; nam in his aures antè suppurant, & delirium minus infestat, sed tamen plerisque horum morbus revertit, & sic moriuntur.

190. In acutis & turbulentis (i. e. cum delirio) morbis obveniens surditas, malo est. Quin & in longis morbis malum portendit: Ac in his ad coxendicis labores convehit.

191. In febre surditas alvum sistit.

[Hujus surditatis causa in meatus auditorii oppilatione consistit, superioris verò in exolutione partis illius cerebri, unde vis audiendi manat. Proptereaque ut illa per se insanabilis est, ita morbi acuti turbulentique consuetudinem desperationem salutis ostendit.]

193. In acutis morbis murmur edentes ac tinnientes aures, mortem prænunciant.

[Quod nec judicatorii sint nec judicantes, & notabilissimæ partis exolutio ostenditur ab exolventis causæ perennitate.]

194. In calidis febribus sonori aurium flatus cum visus hebetudine & narium gravitate, San-

*Prorrh.* guine non prorumpente, è potestate mentis abducunt.

147.

195. Quibus aures obsurduerint, cum capitis gravitate, hypochondrii tensione, & splendoris offensione, Sanguis è naribus prorumpit.

197. Egregie surdi, dum aliquid apprehendunt tremuli, lingua etiam capti & exoluti (vulgaris) gravissimum habent malum.

## Titulus Quintus.

### De Parotidibus.

199. **Q**Uæ cum dolore assurgunt ad aures (parotides) perniciem minantur.

200. In febribus ex prægresso dolore (secundum Duretum exacto jam morbo) rubores ad aures subnascentes (parotides Dureto) signa sunt erysipelatis in facie nascituri, quin & convulsiones cum aphonía & exolutione, ad hæc consequi par est.

*Duretus.*

[Morborum naturam & causas tenere, est hoc sanè aliquid, vel potius multum; ac successiones morborum quo se illi vertant, veluti è speculo prævidere, profecto est artificis fulgore suo urentis, artesque infra se positas prægravantis.]

202. Parotides pravæ sunt Paraplecticis.

203. Parotides (in acutis) suppurati expertes, funestæ, sed forsan his alvi feruntur.

*Prorrh.*

167.

204. Parotides emolliunt tussiculæ cum pyelismo oris.

153.

205. In parotidibus urinæ citò & paulisper mitigatæ, (i. e. modo pepasmi participes modo expertes) pestiferæ; & quæ hujusmodi est refrigeratio, pessima.

*Duret.*

[Quia vicissitudo est magisterii inter naturam &



& morbum, qui ut vires acquirit eundo, sic naturæ fatigantis præsidia labefactat.]

206. In Diuturnis (Dureto acutis) morbis suppurati ad aures tumores, nisi pus admodum album, ac sine odore reddant, interimunt, potissimum vero mulieres.

[Erit profecto catholicum hoc theorema quod unde salus vitæ sperabilis, inde salutis desperatio esse debet, si id merito naturæ non fiat.] *Duretus.*

207. Inter acutos parotides potissimum in causis assurgunt, ac cum si febrem lege critica non expellant, nec ipsæ coquantur, nec Sanguis fundatur e naribus, nec verò urinae crassam excipiant hypostasim, moriuntur: Sed abscessus ejusmodi non raro ante residunt. (*Ampius* scilicet *et*, *an* *exp* *tus*.)

208. Si ad surditatem atque torporem substillum accesserit narium, aliquid sinistri præ se fert. *Proverb.* 141.

209. Ex surditate tubercula ad aures exoriri consentaneum est. 159.

210. Surditatem ex febribus natam solvit profuvium Sanguinis e naribus, alviq; commotio.

## Titulus Sextus.

### De Facie.

211. **F**acies e tumefcente residens, vox item blandior & mollior, tum Spiritus rarior atque facilior, remissionem postridianam fore denunciant. *Lib. de Diebus criticis.*

212. Facies cadaverosa mortifera. Sed ea minus tamen quæ ob vigiliæ, inædiam, aut ventris solutionem ejusmodi est. Atque talis corruptio his de causis orta, uno die finitur. *Progn.*

*Prorrh.* 213. Egregie colorata facies & tetrica (vultuosa)  
49. in morbo acuto, pestifera. insuper frons contracta  
phrenitidem denunciat.

214. Benè colorata facies cum sudoribus diffluentibus, absque febre, faeces vetustas subsistere, aut irregularem dietam testantur.

## Titulus Septimus.

### De Oculorum Affectibus.

219. **I**N febre ortus oculorum rubor, diuturnam ventris afflictionem denunciat.

220. Erumpentes circa Oculos eminentiæ, dum refectioni opera datur (seu ex morbo ægri recreantur) alvum prorupturam ostendunt.

222. Lippitudine affecto suborta febris solutionem affert, sin minus cæcitatis, aut mortis, aut utriusque periculum est.

223. Quibus cum lippitudine capitis dolor accedit, & longo tempore perseverat, cæcitatis metus impendet.

224. Lippitudine laborantem spontè alvus profluens juvat.

*Prorrh.* 226. Oculorum hebetudo (*ἀμαρῆσις*) cum animi defectione citam convulsionem denunciat.  
213. (Spiritu animali dissipato & nervorum principio laeso.

## Titulus Octavus.

## De lingua, &amp; reliquis oris partibus.

229. **L**ingua circa initia quidem rigidiuscula, in eodem verò colore perseverans, procedente verò tempore, ubi exasperatur, livescit, & fit hiulca, seu finditur, mortifera: At verò quæ multum nigrescit, intra 14. diem crifim (sinistri iudicii) fore ostendit. Calamitosissima est nigra & ex virore pallescens.

230. Lingua ad medianam lineam velut alba livida obducta, febris remissionem indicat, idque eodem die, si quod superinducitur crassum est: Sin autem tenuius, postridie, quod si adhuc tenuius, perendie: Eadem planè ostendunt quæ sunt ejusmodi in extima lingua, sed non ita certò.

231. Lingua tremula cum narium rubore, & liquida alvo, si nulla de pulmonibus significatio sit, grave malum denunciat, citasque purgationes perniciosas indicat.

[ Ut lingua omnis contrà naturam tremula est multum terrifica, sic eadem facit, ut Medicus toto corpore perhorrescat, quando ipsa contremiscit cum conditionibus in hac prognosi contentis. ]

235. Linguae asperæ multumque siccae, phreniticæ, 234 Pestiferum est dentes exarescere.

236. Dentis sphacelismus abscessum ad gingivas enatum solvit.



## Titulus Nonus.

### De Voce.

246. **D**Eliria paulisper ferocia, mox erunt im-  
 85. mania.
- Proverb.* 247. Quibus cum febre vox hæret, post acrisi-  
 91. am, tremuli moriuntur. (Et comatosi.)
249. Qui ex dolore (i. e. acerbissima convul-  
 sione intercostalium musculorum) voce sunt capti,  
 crudeliter moriuntur.
254. Si quis voce captus è potestate mentis exeat,  
 morti est proximus.
255. Quæ à rigore incidunt aphonice, funestæ.  
 Sunt in nonnihil Cephalalgici.

## Titulus Decimus.

### De Respiratione.

260. **R**espiratio frequens & parva, inflamma-  
 tionem & laborem denunciat partium  
 spirabilium, at verò magna & rara, dementiam aut  
 convulsionem. Et frigidus quidem spiritus le-  
 thalis est, Lethalis est etiam æstuosus & fuligis-  
 nosus, minus tamen quam frigidus. Tunc ma-  
 gnus foras efflatus, intrò parvus, & contra, fo-  
 ras parvus, intrò magnus, pessimus est, & morti  
 proximus. Quin etiam tarda, velox, obscura du-  
 plex intrò revocatio, qualis cernitur in iis qui super  
 inspirant.

---

## Titulus Undecimus.

### De Cervice.

268. **F**Aucium dolor prægrandis parotidas & convulsiones facit, item cervicis & dorſi acerbos dolores.

270. Cervicis & cubiti dolor eſt convulſificus. Id autem à faciè ( à capite ) naſci ſolet.

273. Cervicis dolor cum in febre omni terrifi- *Prorru*  
cus, tum verò peſtiferus iis qui ſunt in metu in- 73.  
ſaniæ.

276. Fauces exulceratæ in febre, cum alio ſigno difficili, periculoſum.

277. In febribus ſtrangulari repentè, nec deglu-  
tiſſe poſſe, ſine tumore, malum.

---

## Titulus Duodecimus.

### De Hypochondriis.

281. **T**umores hypochondriorum recens obor-  
tos inflammationis expertes, & inde  
dolores natos, ſolvit borborygmus ſub hypochon-  
drio fremens, maximè ſi aut ipſe per ſe ſecedar,  
aut cum urinis & dejectionibus; quin juvat iſ ipſe,  
ſi modo descendit.

283. Stomachi dolor, & pulſus hypochondrio-  
rum febre extinctâ, malum denunciant, idque  
cum alias, tum in ſudatiuncula.

284. Quæ cadunt in hypochondriacum dolori-  
fica mala, cum alias prava ſunt, tum verò ſi fa-  
ciunt profuſiores alvos; pejora autem quæ brevi  
naſ-  
H

nascuntur ; tum quæ assurgunt ex his parotides multum terrificæ , ut cætera expurata.

285. A cardialgia cum torminibus ventris feræ ( lumbrici ) prorumpunt.

286. Dolorificum cordis malum ( i. e. cardialgia cum syncope cordis ) ætate jam grandi , crebro revertens , repentinam mortem ostendit.

291. In dolore hypochondriorum cum borborygmo , lumborum superveniens dolor in febribus , alvos profusiores facit , nisi flatus erumpat , aut copia urinæ feratur.

*Rorrb.*  
158. 292. In diuturno hypochondrii meteorismo , & alvo graveolente , abscessus qui ad aurem assurgit , necat.

295. Hypochondriorum , cordis , hepatis , partiumque circumpositarum dolores excluso Sanguine , ( secundum Foesium cruenta alvi dejectione ) periculo defunguntur , non excluso pereunt.

297. Hypochondriorum dolores in febre , ægro fari nequeunte , si absque sudore solvantur , malum indicant. His dolores ad *Ischia* decumbunt.

287. 301. A suppressione alvi meteorismus hypochondriorum , gravis , maximè verò iis , qui ab inveteratione tabescent , & quibus alvi profusè feruntur.

*Aph. 11.*  
*Secl. 4.* 304. Supra umbilicum labor ac lumborum dolor , qui remediis non cedit , in hydropem sicum desinit.

## Titulus 13.

### De Dorsi & Lumborum affectibus.

306. **L** Umborum dolores Sanguinis profluvium excitant.

307. Quæ



307. Quæ ex lumborum dolore cientur hæ-  
morrhagiæ, largæ.

308. Quibus ex dolore lumborum anadrome  
fit ad caput, torpidæ manus, cardialgiæ, au-  
rium flatus sonori, hæmorrhagiæ largæ, tum al-  
vi profusè feruntur, ac mentes perturbatæ ut plu-  
rimum.

[Sanè lumborum excursus caput replet, ex eâ *Dure-*  
que repletionem, symptomatum capitis omnium pa-  
raphoricorum, cataphoricorum, cephalalgico-  
rum & catarrhoicorum principia causæque ducun-  
tur.] *tus.*

309. Quæ ex dorsi dolore, principia morborum  
ducuntur, difficilia sunt.

310. In dolore lumborum prægrandi, & larga  
dejectione, ab helleboro vomere spumantia mul-  
ta, prodest.

311. Spinæ distortionem cum spirandi difficulta-  
te, Sanguinis fluxus liberat.

314. Ex dolorifici lumborum mali ascensu, ocu- *Prorrh.*  
lorum perversio malum. *69.*

[Omnis afflictio cerebri alterati, quæ propaga- *Dure-*  
tionem habet *ὡς τὴν πρὸς τὴν*, i.e. propagines, me-  
tum adferre solet, interitus, si febris adest acu-  
ta.] *tus.*

315. Dolor in pectore fixus cum torpore sub- *Prorrh.*  
orta febre, malum indicat, iique celeriter mor- *70.*  
tem oppetunt.

[Inter Medicinæ leges quæ sanciantur de acu- *Dure-*  
torum morborum naturâ, deque illorum causis *tus.*  
atque symptomatis, nullæ sunt magis Medico ne-  
cessariæ ad benè medendum, quam illæ quæ ex  
insolentium rerum observatione nascuntur. Quid  
enim minus est febris acutæ quam torpor, obli-  
vio, coma? Sunt quidem hæc omnia, crudi hu-  
moris flatulentique spiritus *ἐκ γυνῆς*, non autem  
Sanguinis multa bile perfusi, qui regnare dicitur  
in febre acuta, proptereaque non sine causâ viden-  
tur

tur mortifera, quatenus longissimè absunt à febre acutâ. Omnia enim quæ fiunt, quæque apparent contrâ naturam morbi & ægri, terrifica esse debent, ac sæpè mortem subesse testantur.]

325. Quibus lumborum & lateris dolor caret evidenti causâ, icterici fiunt.

## Titulus 14.

### De Hæmorrhagia.

326. **Q**UÆ diebus criticis ex hæmorrhagia incidit perfrigeratio eximia, pessima.

*Prorrh.* 327. Sanguinem è diverso fluere, malum est, 125. ut in liene magno, è dextris, & similiter in hypochondriis.

*Prorrh.* 328. Qui ex vulnere subinde rigentes (vel le- 128. viter sudantes) Sanguinem profundunt, gravissimum habent malum, ac inter loquendum derepentè moriuntur.

329. Quibus 5to die larga est hæmorrhagia, 6to. rigor, 7to perfrigeratio, rursusque prægrandis ardor, iis in vitio sunt alvi.

127. 330. Ab hæmorrhagia nigrorum dejectio, malum: Pestiferum est etiam prærubris & æruginosi ferri alvum. Quibus huiusmodi hæmorrhagiæ die 4to contingunt, tandem comate & convulsione conflictati moriuntur, nigris prodeuntibus & alvo inflata.

129. 331. Quæ post (exiguam) hæmorrhagiam & nigrorum dejectionem, in acutis surditas venit, malum: Ibi dejectio Sanguinis mortifera est, surditas autem solvit.

335. Quæ circa initia profusæ sunt hæmorrhagiæ, dum vires recolligunt, (seu in refectione) alvos profusè cient,

336. Pro-

336. Profusa narium hæmorrhagia vi suppressa, interdum adducit convulsionem, sanat autem phlebotomia.

337. Undecimum diem agentibus, substillat *Prorrh.*  
Sanguinis mala sunt, idque cum alias, tum si bis 148.  
fiat & redeat.

[Res malè gestæ accessionem calamitatis adferunt, faciuntque ut ægri pejore sint loco, si rerum ipsarum malè gestarum causa sit & occasio, naturæ irrita, & inanis contentio, quando certamen ipsius & morbi est in procinctu. Præstat enim naturam quiescere, quam aliquid frustra moliri: Ob eam sanè causam, quod omnis irrita proritatio, morbum alioqui sanabilem, ex eventu reddit insanabilem, aut sinistri judicii.] *Duret.*

338. Si largo Sanguinis profluvio supervenerit convulsio, aut singultus, mortiferum.

339. In his qui ad 7. annum progressi sunt cum coloris fædatione, inter ambulandum spiratio coærvata, & terræ appetentia, Sanguinis corruptionem & exolutionem significat.

[Hæc prognosis apperit *τὴν μὲν* vacuandi purgando, & Sanguinem detrahendo.] *Duret.*

340. Quæ in diuturnis exigua apparent Sanguinis e naribus effluvia, mortifera. [Substillum *Duret.*  
Sanguinis eò pejus res ire denunciat, quo sæpius redit.]

341. Quæ ab initio cientur vertigines, hæmorrhagiæ exolvuntur.

[Inter commoda hæmorrhagiæ non in postremis, illud est, quod *τὰ χειρίμω μὴ χειρόντα* *Duret.*  
prohibet esse mortifera, aut certe sinistri judicii. Hæmorrhagiæ multæ difficilia multa dissolvunt.]

345. Qui statis temporibus Sanguinem profundunt, si loco non profuderint, epileptici moriuntur. *Prorrh.* 131.



## Titulus 15.

## De Palpitatione, tremore &amp; Convulsione.

*Prorrh.* 30. 347. Qui toto palpitant corpore, etiamne vitam finiunt voce capti?

348. Omnes qui tremuli convelluntur, sudariunculam habent obnoxiam recidivæ; atque iis rigore superveniente fit crisis: Supervenit autem ventris ardore laceffit. Hic somni arctiores, sunt convulsifici, gravitasque frontis, & mictio ipsa difficilis.

119. 349. Quæ cadunt in hystericas sine febre (potius quam non consuetæ) convulsiones, faciles.

162. 353. Quæ tremulis & anxiiis parvæ assurgunt parotides, convulsionem denunciant, cum in vitio est alvus.

306. 355. Convulsio vulneri superveniens funesta.

*Aph.* 2. *Secl.* 5. 356. Convulsio feбри succedens periculum denunciat, minimum verò pueris.

257. Qui septem annis provectiores sunt, convulsione non tentantur in febre, sin autem, desperati.

358. Convulsionem sanat exorta febris acuta quæ prius non fuit, quod si prius fuerit, exacerbata: Quin etiam prodest, urinam fluere albumineam, seu vitream (*ὀαλοειδὲς*) alvum ferri & somnos inire.

167. 359. In convulsione diu obmutescere, malum, at verò parumper, aut linguæ apoplexiam, aut brachii partiumque dextra sitarum denunciat. Exolvitur autem urinis repente multis & cumulatè proruptis.

362. Quæ

362. Quæ speciem febris & opisthotoni præ se ferunt, urinæ genitinales exolvunt.

## Titulus 16.

### De Angina.

366. **E**Rysipelas (cynanchica) intus foras converti, utile, at foris intrò, mortiferum. Intrò autem convertitur cum rubore evanescente, pectus gravatur, ac difficilius spirat æger.

367. Quibus cynanche ad pulmonem inflectitur, alii quidem intereunt 7 diebus, alii cum evaserint, purulenti fiunt, nulla expurgatione pituitosa sursum facta. Aph. 10.  
Sect. 5.

368. Quibus à forti strangulatu repente (i. e. sponte suâ) stercus excernitur, desperatio est.

371. Inter anginosos, qui cocta citò non expunt, desperati.

[Est *πῆψις*, *πῆψις τῶν παρὰ φύσιν*. *Re-Dure-*  
rum è natura egressarum concoctio. Ut enim ve-  
ra *πῆψις*, i. e. coctio verè dicta est *τῶν ἐσιόντων*,  
i. e. rerum ingredientum, sic ὁ *πῆψις* seu miti-  
ficatio, est ὁ *ἀπὸντων* i. e. exeuntium. Utriusque  
causa effectrix est partium solidarum vitale prin-  
cipium, & vivifica vis quæ manat à corde.] -tus.

372. In Angina qui abs re prorepunt ad caput dolores cum febre, sunt desperatæ salutis.

375. In angina laborantibus absque ratione (*ἀσύνετος*) gracilescentibus faucibus, dolor prægrandis ad pectus aut alvum progressus, purulentas dejectiones facit, si quidem aliter non exolvatur. (alioqui tale quid solutionem præ se fert.)

377. Ex angina sputa glutinosa, crassa, mul-  
tum

tum alba, vi expressa, malum. Atque omnis pepasmus huiusmodi malus. Purgatio multa deorsum, tales paraplectico modo necat.

378. Sputa ex angina subarida, crebra, cum tussi & lateris dolore educta, mortifera. Quin etiam quæ inter potandum per tussim rejiciuntur, quæque difficulter diglutiuntur, malum portendunt.

## Titulus 17.

### De Pleuritide & Peripneumonia.

379. **I**nter pleuriticos quibus initio varix (πυρραι Duteto) sunt exuptiones (Foefio πυρραι, i. e. purulentæ) ii tertio moriuntur, aut 5<sup>o</sup>, quos si evaserint, nec dum multo illis sit melius, 7. aut 9. aut 11. incipiunt suppurari.

381. Siccæ pleuritides & sputi expertes, gravissimæ. Terrificæ autem in quibus dolorifica fursum sunt mala.

*Dure-  
tus.*

[In magna pleuritide salutis desperatio esse solet, si nihil fiat, nihil appareat, quod systrophicæ inflammationis laxitatem adferat, unde remissio sit gravissimorum symptomatum, quæ ab eâ inflammatione dum viget, nascuntur. Systrophicæ inflammationis laxitatem adferunt, fomentum, detractio sanguinis, & liberalis ac libera sputi expurgatio, per quam ipsa pleuritis non raro *αὐτομάτως* quiescit.]

382. Pleuritides graviores quæ sine divulsionibus, quam quæ cum divulsionibus contingunt.

*Dure-  
tus.*

[*ἡ πύσις* indicant vehementem thoracis motum, validamque facultatis animalis in expectorando sputo contentionem.]

383. Qui-



383. Quibus pleuriticis circa initia lingua bile suffusa est, 7mo. judicantur: Quibus autem 3tio aut 4to, ad circiter nonum.

386. Pleuriticis, dolores & alvum emolliri utile est, sputa colorari, nullos in pectore strepitus fieri, urinam rectè procedere: Eorum contraria difficilia sunt, & sputum dulcescere.

387. Pleuritides biliosæ simul & Sanguineæ, ut plurimum 9. aut 11. judicantur, ac ferè saluti concedunt. Quibus autem pleuriticis, initio quidem dolores sunt mites, 5to aut 6to die ingravescent, ferè ad 12. perveniunt, raroque servantur. Periclitantur autem potissimum 7. aut 12. quod si bis 7. evaserint, periculo defunguntur.

[ Sputum rubrum simul & flavum promoveri *Duretus.* debet, iis quæ expurgationem juvant, molliendo, leniendo & sputum ciendo, non autem Sanguinis detractio, retrahi & impediri, quod usu venire videmus non sine mærore & nemesi, ab istis pragmaticis vulgo dictis, qui omnem pleuritidis curationem exigunt in Sanguinis detractio-  
ne sæpius iterata, quamdiu pleuriticus hujusmodi sputa expurgat cum spe salutis prædivite. O homines reipublicæ calamitosos atque funestos! Ipsam pleuritidem quæ suâ sponte nullius operis indigens, cum tali sputo quiesceret, ex eventu reddunt mortiferam. ]

388. Quibuscunque pleuriticis multum in pectore sputum perstrepat, unaque facies plena mæroris, & oculus icteritius & caliginosus, moriuntur.

[ Firmiora sunt argumenta discessionis vitæ aut morbi, quæ ducuntur è signis, quam è symptomatis. ] *Duretus.*

389. Qui è pleuriticis facti sunt purulenti, 40. diebus à rupta vomica expurgantur. *Duretus.*

[ Sanè in pleuritide & peripneumonia sputum *Duretus. ad* flavo exactè permixtum, quodque citam & facilem *390.*  
I ha-

habet anacatharsin, recreat medicum, & consolatur spe certa salutis: Ac tum juvat Medicum spei plenum videre, celerem multum atque fidellem, alacriter & vultu sereno, Medicinam pleuritico facientem.]

Duret.

ad 394.

[Hippocrates Author est auspicandam curationem à Sanguinis detractione, quotiescunque duorum remedium solennium, purgationis dico & phlebotomiz, necessarius usus incidit.]

397. Peripneumonia pleuritidi succedens, tutior est primigenia (potius gravior.)

398. Exercitata & densa corpora celerius à pleuritide & peripneumonia intereunt, quam quæ in otio conflictantur.

399. In morbis pulmonis coryzas (i. e. catarrhos serenos) & sternutamenta præcessisse aut consequi, calamitosum. In reliquis verò morbis (maxime exitialibus) adjumentum adferunt sternutamenta.

Duret.

ad 402.

[Magna sæpè incidit signorum controversia, cum alia Medicum spe consolantur salutis, alia verò metu exterrent interitus. Ac tum difficillima est tecmarsecos ineundæ ratio, ad prædicendum certò quid eventurum sit. Sed ea sic ineunda ex Doctrina Hippocratis, ac primum τεκμαρσιν, i. e. signa syllogistica plus conferre ad tecmarσιν, quam τὰ ἰσχυρὰ i. e. verisimilia. Deinde τὰ ἰσχυρὰ, i. e. quæ sunt ejusdem speciei & inter se consocialia, majorem habere vim, quam ἰσχυρὰ, i. e. dissentanea, quæ sunt alterius speciei. Postremò certa comparatur τεκμαρσιν, ad vitæ quidem præsagium, si cum remissione τὰ παροξυσμικὰ, appareant commoda epiphenomena, ut in pleuritide mitescente, sputum flavo permixtum citò & copiosè editum; Interitus autem, si pathognomonica signa prægrandia, nimis opprimendo accessionem adjungant eorum, quæ à propagatione morbi epiphenomena nominantur;

in-

indeque faciant epiphænomena prava, quæ principatum obtinent in prædicendo de morbis acutis.]

403. Qui futuri sunt purulenti, primum quidem expuunt falsa, mox dulciora.

404. Quibus in pulmone tubercula (φύματα) fiunt, (empyema Dureto) ii 40 diebus à rptione pus expurgant, quos si superent, ut plurimum tabidi fiunt.

405. In lateris dolore, substillum Sanguinis e naribus grave malum.

406. Quibus purulentis mitiora sunt omnia, si postea pus edunt fædi odoris, iis recidiva mortifera.

408. Quicumque spumantem expuunt Sanguinem, dextroque laborant hypochondrio, à jecore spuunt. Multique intereunt.

409. Quibus conatiendo, pus editur cænosum & fædi odoris, ut plurimum moriuntur.

410. Quibus à parte coloratur specillum (μύλα) tanquam ab igne, maximam illi partem intereunt.

414. Raucitas cum tussi & alvo liquida, pus educit.

415. Quibus in peripneumonia, urinæ circa initia crassæ, mox ante 4 diem rentes fiunt, mortiferum.

417. Pectora rubris maculis superparsa, talibus mortem sebesse testantur.

419. Quæ ob puris intro collectionem, febres intermittunt, in his magna ex parte ægri tenuibus sudoribus dissolunt.

422. Qui perhorrescunt crebrò, ad suppurationem deveniunt, quin etiam febris talium, ipsos ad suppurationem ducit.

427. Sanguinem expuentes jurar esse febris expertes, ac tussire leviter atque dolere; ipsum verò spatium ad dies bis 7. crassescere. (malè tenuari-

450.



ri) sed febricitare multum, itemque tussire, atque dolere, tum Sanguinem subinde novum expuere, calamitosum.

428. Quibus intumuit latus, atque incaluit, si cum in oppositam partem decumbunt, grave quippiam suspensum esse videatur, pus ab una parte collectum est.

429. Empyicis à pulmone pus duci per alvum, lethale.

430. Vulnere in thoracem accepto, si quidem externa vulneris pars sanitatem receperit, interna verò nequaquam, suppurationis periculum impendet, & quibus tenera est intus cicatrix, disrumptur facilè.

## Titulus 19.

### De Phthisi.

*Aph. 13.* 433. **Q**ui Sanguinem vomunt (*i. e.* pleno ore *Sect. 5.* profundunt) spumantem, omnique dolore carent sub daphragmate, à pulmone vomunt. Et quibus in ipso rupta est magna vena, & multum illi vomunt, & periculose admodum: Quibus verò minor, minus rejiciunt, & securiores sunt.

*Aph. 11.* 434. E phthificis quibus ad ignem sputum o- *Sect. 5.* let graviter, ac tum capilli fluunt è capite, moriuntur.

435. Tabidis in aquam marinam expuentibus, si pus fundum petit, celerem perniciem denunciat. Sit autem marina aqua in æneo vase.

*Aph. 12.* 436. E phthificis quibus defluunt capilli è capi- *Sect. 5.* te, pereunt à diarrhæa, & quibus phthificis diarrhæa incidit, moriuntur.

437. Quæ phthificis accidit sputorum suppressio,

sio, dementiam infert nugacem. His hæmorrhoidem spes est apparituram.

438. In metu sunt maximo phthises, quæ ex ruptione venarum crassarum, & à catarrho è capite contingunt.

439. Inter ætates illæ demum ostentant periculum phthisis, quæ sunt ab anno 18. ad 35. *Aph. 9. Sect. 5.*

442. Hypochondriorum meteorismus, cum cæteros malè habet, tum verò eos pessimè, quos phthisis exercet.

443. Qui ex longa phthisi consumpti sunt, & desperati, nonnullis antè finem vitæ rigor ciatur.

## Titulus 19.

### De Hepaticis.

447. **I**N Hepatico mala est colliquatio cum raucitate, idque cum alias, tum si tussicula sit.

448. Circa hepar dolentes, cardialgici, veteranosi, perhorrescentes, alvo turbata, macri, ciborum fastidiosi, sudatiunculis crebri, purulenta per alvum profundunt (& ita moriuntur.)

449. Quibus jecur derepentè vehementer dolet, iis febris succedens remedio est. *Aph. 40 Sect. 6.*

451. Quibus inusto hepate, velut amurca prodit, funestum. *Sect. 7.*

## Titulus 20.

## De Hydrope.

453. **I**N sicco Hydrope stranguria prava est, ac prava quoque urina quæ hypostasim habet exiguam.

644. 455. In biliosis alvus turbata, quæ pauca exhibet similia genitura, atque mucosa, doloremque ad inum ventrem inferentia, nec urinæ faciles in meiando, ex talibus desinunt in Hydropem.

456. Si cui aquoso, cum febre urina pauca sit, atque turbida, perniciosum.

457. Ineunte Hydrope, si aquosa incidat diarrhæa cruditatis experts, morbum solvit.

458. Denunciato jam sicco Hydrope, si tormina sint, circa tenue intestinum, ingens malum.

454. 459. Quæ ex Hydropicis veniunt epilepsiæ, mortiferæ.

460. Hydrops qui Medicinæ concedit, ac re-venit, desperatus.

461. Qui secundum venas Hydropici sunt (i. e. leucophlegmatici) prorupta in alvum aqua (indeque diarrhæa suborta) sanantur.

## Titulus 21.

## De Dysenteria.

462. **D**Ysenteria quæ intempestivè sistitur, abscessum facit, vel in lateribus, vel visceribus, aut in articulis: Ac forte quidem biliosa



liosa in articulis, Sanguinea verò in lateribus & visceribus abscessum facit.

463. Dysenteria laborantibus vomitio biliosa initio, grave malum.

464. Quibus è Dysenteria sæva itur ad puriformia, qui superstat humor multum albus erit, & multus.

465. Dejectiones Dysentericæ, quæ rubris, limosis, cumulatè ducuntur, si cum facie rutila & saturo rubore suffusa quiescant, insania est in metu.

466. Dysenteria lienosis non longa quidem, utilis: Longa verò pestifera. Nam quiescente illa, si vel Hydropes veniant, vel etiam Lienteria, mortiferum.

## Titulus 22.

### De Lienteria.

467. **I**N Lientericis, cum feris alvinis, dolores ex intestinorum cruciatu soluti, articulo-  
ram partes attollunt, ac ex hujusmodi tenues squammæ cum rubore & pustulis fiunt: si post multos ac tenues sudores, velut acceptis ex flagris vibicibus, rubescunt.

468. Quos longa exercet Lienteria cum feris (s. e. ascaridibus, alii sævissimis ulceribus) torminibus & doloribus, cum hæc quieverint, intumescunt. His superrigere malo est.

469. Lienterica, quæ cum spiratione difficili & lateris vellicatione conjuncta sunt, transeunt in Pthifin.

470. Ileosis vomere & obsurdescere malo est.

## Titulus 23.

## De morbis Vesicæ.

472. **C**alculosi ea figura siti, ut ne calculus procidat in urinæ ductum, facilius illi meunt.

*Dys-  
uris.*

[Temeraria est omnis Medicina, pestifera & sæpè mortifera, quæ frangendo vesicæ calculo adhibetur. Cui profuerit, vidi adhuc neminem: permultos autem, quibus exitio illa fuit. Sed unicum illud remedium calculosi, quod in sectione positum est, tam præceptum est, ut sæpè in incerto sit Medico, quid agendum; ægro flagitante & implorante auxilium.]

473. At quibus tuberculum est circa vesicam, quod exhibet Dysuriam, quovis illi modo sint collocati, torquentur: Sanatio hujus fit pure prorupto.

474. Quibus urina clam illabitur ad pudendum, exolvuntur desperati.

475. Stranguriæ ileus superveniens septimo die perimit, nisi oborta febre, urina fluxerit cumulatè.

## Titulus 24.

## De Apoplexia, paralyfi &amp; paraplegia.

476. **T**Orpores & stupores præter consuetudinem evenientes, futura denunciant apoplectica.

477. Qui à vulnere (præsertim capitis) sunt im-

impotentes corporis (i. e. in movendo pigres, & hebetes in sentiendo) exorta febre rigoris experte, servantur: Non exorta verò fiunt apoplectici, partim dextra, partim sinistra.

478. Quæ apoplecticis veniunt hæmorrhoides, salutare, refrigerationes verò & torpores malum denunciant.

479. In apoplecticis ex magna spirandi molestia subortus sudor, mortem adfert. In his rursus, si febris accedat solutio contingit.

[Ultima pars hujus prognoseos non est Hippocratica veritatis.] DHYE-  
TUS.

480. Apoplexia repente oborta, solubilis, adveniente febre lenta, mortifera est.

[Frustra ciendo humorem morbificum, quicquid enim humorem ciet, neque dissipat, neque exhaurit, oppressionem infert majorem, & gravioribus malis auget ægrotum.] DHYE-  
TUS.

## Titulus 25.

### De Melancholia & Mania.

483. **Q**uibus (Melancholicis) à metu febris vacuo (vel cum refrigeratione) ad furorem egressio est, id febres cum sudoribus, & somni arctiores nec turbulenti exolvunt.

486. Quæ cum silentio sunt mentis emotiones (*crises*) inquietæ, oculos circum agentes, ac spiritum sublime intrò vel foras ducentes, mortiferae; sed tamen diuturnas inferunt paraplegias, quin etiam furiosi evadunt hoc modo affecti. Quibus autem alvo turbata exacerbatio est, iis ferè sub crisin nigra ducuntur.



---

 Titulus 27.

## De Phymate &amp; Phlebotomia.

491. **D**Olores qui latus invadunt in febribus ( melius finè febribus ) æqualiterque ibi finè signis subsistunt , phlebotomia offendit. Ac si quem teneat cibi fastidium , & si quis habeat tumidum hypochondrium ; tum quibus perfrigeratio est cum torpore, non finè febre , Sanguinem detraxisse nocet. Nam cum sibi mitius esse putant, intereunt.

---

## Titulus 28.

## De Prognostico omnibus totius corporis morbis communi.

**H**unc titulum supra pete in libro prognosticorum , ex quo totus desumitur.

---

## Titulus 29.

## De Pertusionibus Capitis.

498. **Q**uibuscunque tempora præciduntur, convulsio incidit è diverso partis præcisæ.

499. Quibus concussum est cerebrum, doluitque percussis aut lapsis, continuo voce capti, nec vident, nec audiunt, ac ferè moriuntur.

500. Qui-

300. Quibus cerebrum vulneratur, iis ut plurimum febris & bilis vomitiò incidit, & corporis apoplexia. Tales autem sunt desperati.

301. Ossium capitis fracturæ cognitu difficillimæ quæ circa futuras fiunt. Fiunt autem potissimum gravibus ac rotundis telis, tum ex adverso illatis, non ex plano. At ossa de quibus fissa sunt nec ne ambigitur, sic discernas, si utraque bucca mandendum exhibueris caulem asphodeli, vel ferulam, atque animum advertere jussieris, cum ipsi os aliquod strepere videatur; confracta namque strepere videntur. Sed procedente tempore fissa quidem (ἰσχυρῶς; Dureto rima occulta) 7mo die, tum 14, tum alias quoque sui significationem edunt. Nam & caro (i. e. pericranium) ab osse abscedit, aut os livescit; dolores item ichorum diffluentium excitantur, eaque jam remediis ægrè cedunt.

## Titulus 30.

### De Vulneribus & fistulis.

302. Quibus omentum procidit, ut putrescat *Aph. 58*  
necesse est. *Sect. 6.*

303. Si quod præcisum fuerit tenuium intesti- *Aph. 24*  
norum, non coalescit. *Sect. 6.*

304. Præcisus nervus, aut quod in gena est te- *Aph. 19.*  
nue, aut præputium, non coalescit. *Sect. 6.*

305. Si quando in corpore vel os exectum fue-  
rit, vel cartilago, nunquam augetur.

307. Bilis vomitus vulnere succedens, malum  
denunciat, præcipue in capitis vulneribus.

308. Nervi quicunque crassi (i. e. insignes)  
vulnus accipiunt, ut plurimum claudos reddunt:

Maximè si obliquum vulnus fuerit, ac in musculorum capitibus, præsertim femorum.

*Aph. 18.*  
*Set. 6.*  
*Lib. I de*  
*Morb.* § 99. Interit autem potissimum è vulneribus, si cui vulneratum sit cerebrum, aut spinalis medulla, aut jecur, aut diaphragma, aut cor, aut vesica, aut quædam grandis vena. Moriuntur etiam si in arteriam (asperam scil.) & pulmonem insignes valdè plagæ inflictæ sunt, adeò ut pulmone saucio minor sit exspiratio per os, quam illac excidit, ubi est ipsa pertusio. Intereunt verò quibus nervi interiores, sive tenuis aliquis sive crassus, vulnus acceperint, si plaga transversa fuerit & magna: Quod si parva & recta, nonnulli periculo eximuntur. Sed illi perraro intereunt, qui faciuntur, ubi nulla est corporis partium prædictarum, vel absint ab iis longissime.

§ 11. Ex fistulis molestissimæ sunt, quæ in partibus cartilagineis & carne vacuis enascuntur, ibique sunt cavæ & cuniculosæ (longè excurrentes) ac sanie diffuunt continenter, tum verò caruncula ipsarum adnascitur orificio. Sed illæ facilius sanescunt, quæ in partibus mollibus & carneis, nervoque carentibus oriuntur.

## Titulus 31.

### De morbis Mulierum.

§ 13. **I**N Muliebribus, quæ antè partum a-

§ 36. quosâ prodeunt, malum denunciant.

§ 14. Ora aphthosa in gravidis, bono non sunt: Ac forte etiam alvi humectantur.

§ 15. Ex ilibus ad tenue intestinum migrantes dolores in morbis longis, ex abortu, neque admodum purgata muliere, perniciem denunciant.

§ 16. Quæ



516. Quæ ex partu & abortu copiosa celeriter cum impetu feruntur, si subsistant, molestiam exhibent. His rigor inimicus est, & alvi perturbatio, præcipue verò si laborent ex hypochondrio.

519. Quæ cum suspirio foras effertur spiratio, & colliquatio præter rationem, gravidis abortum denunciant.

522. Salutare est muliebria non cohiberi: Nam inde veniunt epilepsiz: Quibusdam autem ventris longa profluvia; nonnullis etiam hæmorrhoides.

523. Quæ pariunt facile, rigore subinde prius correptæ, iis à partu reliqua difficillima.

528. Uterinæ duritates in alvo admodum dolorificæ, crudeliter atque citò perniciosæ.

531. Convulsionem solvunt muliebria (*i. e.* menstrua) quæ primum aut statim apparent, atque id sinè febre.

534. Quæ cum sopore & gravitate incidunt 517. cephalalgiz gravidis, pessime ipsas habent. His *Prorrh.* autem fortasse profuerit quippiam convulsionis ad- 103. esse.

538. Antè partus subinde rigere, & citra dolorem parere, periculum indicat.

541. Horrore subinde tentatis, lassitudine & capitis gravitate conflictatis, muliebres purgationes erumpunt.

551. Sterilibus vomitio Sanguinis ad concipiendum prodest.

552. Oculorum caligines crebris apparentibus mensibus solvuntur.

554. Quæ fiunt hystericiis febre vacuis convulsionem, faciles: Sicuti Doreadi.

555. Quibus à rigore febris est laboriosa, promovenitur muliebria. His dolens cervix hæmorrhagiam ciet.

## Titulus 32.

## De Vomitibus.

556. **M**ortem adfert ruber vomitus, maximè que si ægrè vomatur.

*Prorrh.*  
79.

558. Vomitiones exiguae biliosæ, malum denunciant; tum verò præcipuè, si pervigilio conflitentur ægri.

565. Ex sinceris vomitibus singultus malus est; mala quoque convulsio. Quin etiam idem existimandum est in immodicis purgationibus, quas inferunt pharmacix.

566. Qui vomituri sunt, prius illi salivant.

568. In omni superflua purgatione, frigus cum sudore exitiale. Tum qui subinde vomunt & siticulosi sunt, male habent. Qui verò anxietate laborant cum lumborum dolore, iis alvus humectatur.

## Titulus 33.

## De Sudoribus.

574. **Q**ui una cum febre incidit sudor, si est acuta, malus.

[Reliqua huc pertinentia ex libro prognosticorum petenda.]

Ti-

## Titulus 34.

## De Urinis.

575. **C**itam dimissionem febris ostendit urina, quæ ex confusa quippiam pingue ostentans aquescit. Quæ autem subrubra est, habetque subrubram hypostasim & lævem, siquidem antè septimum diem (i. e. 4to) fuit hujusmodi, septimo die solutionem fore designat. Sin autem post 7, tardiozem aut plane diuturnam. Et quæ 4to die subrubram nubeculam capit, septimo die liberat, si cætera convenienter sint constituta. Tenuis autem & biliosa, ac ne vix quidem exiguam habens hypostasim, tum quæ in melius, modo in pejus mutatur, temporis diuturnitatem postulat. Quod si ista diutius perseverat, aut ad crisin diuturnitas temporis requiratur, periculo non vacat.

576. Aquosa verò & alba in diuturnis morbis perseverans, difficilem & non securam judicationem facit. (Quia in eâ cruditatis summa sunt omnia, ita ut vix sperabilis sit pepalsmus.)

577. At verò nebulæ in urinis albæ quidem & versus fundum, utiles; rubræ autem & nigræ, lividæ item, difficiles.

578. In acutis morbis periculum denunciat urina biliosa non subrubra, & quæ crassius commotam farinam refert, albas habens hypostases, & quæ colore ac hypostasi variat, & maximè in rheumatismis è capite. Perniciem etiam præ se fert, quæ ex nigra, in biliosam tenuem transit, & quæ sedimentum habet divulsam.

579. Urinæ derepente præter rationem parum concoctæ, vitiosæ sunt. Atque omnino quicquid præ-



præter rationem coctum est in acuto, malum est. Prava autem & illa, quæ ab his prærubra, virulenti quippiam efflorescentis continet. Quæ autem alba funditur & pellucida, mali est ominis, præcipue in phreniticis apparens. Prava est item quæ mox à potu effluit, maximeque pleuriticis & peripneumonicis. Mala est etiam quæ antè rigorem oleosa redditur. Malum est etiam in acutis cum virescentes urinæ sunt, nec in superficie tenus. (Vel nec in colore persistunt.)

§80. Pestifera autem est inter urinas, quæ & hypostasim habet nigram, & ipsa quoque est nigra. Sed pueris pestifera est magis aquosa. Perniciosa est omnis urina quæ clam emittitur. Peripneumonicis perniciosa est, quæ initio coctionem habet, verum post quartum diem, tenuis evadit.

§81. Pleuriticis urina cruenta, obscura cum varia hypostasi & indilcreta, ut plurimum intra dies 14. mortem adfert. Sed illud confestim mortiferum est in pleuriticis urinam reddi porraceam cum nigra hypostasi aut fursfuracea.

§82. Quæ emittitur urina habens pinguem hypostasim, febrem denunciat. (Abire secundum Duretum) cruenta verò circa initia reddita, morbi est longi, at perturbata cum sudore, recidivæ; sicut & alba qualis est jumentorum, cephalalgia, pelliculosa autem, convulsionis: Quæ verò sputiformes habent hypostasies, aut limosas, rigorem denunciant. Quæ araneorum telis similia quædam habet, colliquationem; quæ in erraticis febribus sunt nigrae nubeculæ, quartanas denunciant. Decolores autem quæ nigra ostentant enzoremata, idque cum vigiliis & perturbata mente, phreniticæ: Cinereæ (vel potius livio similes) cum dyspnæa sunt hydropicæ.

§83. Urina aquosa vel conturbata friabili asperitate, liquidam fore alvum denunciat. Quæ verò ad-

admodum tenuis spissa evadit, fortasse erupturum sudorem indicat; jam autem erupisse, quæ spumam in se ipsam insidentem habet.

§85. Urina quæ utilem habet hypostasim, & mox non habet, laborem & mutationem ostendit: Quæ autem perturbata, hypostasim habet, residens, rigorem circa crisin denunciat, fortasse etiam transitum in tertianam aut quarranam.

§86. In pleuriticis, urina subrubra, quæ hypostasim habet levem, securam crisin denunciat. Subviridis autem (vel aliquantulum pallida) & florida cui est alba hypostasis, citam quoque crisin ostendit. Sed admodum rubra & florida, quæ viridem (pallidam) habet hypostasim, levem, exactam, longi & valdè turbulenti est morbi, in alium transeuntis, non tamen funesti. Aquosa verò & alba quæ similem crassioris farinæ hypostasim rubram habet, dolorem & periculum denunciat: At quæ viridis (pallida) rubram & instar crassioris farinæ hypostasim habet, longi & periculosi est morbi.

§88. Vesica intercepta quippiam habet convulsificum, idque cum alias, tum si accesserit cephalalgia; quæ in his torpide exolvuntur, difficilia sunt, non tamen mortifera. Ac forte etiam aliquantulum desipiunt.

§89. Renum repente dolor obortus, cum urina suppressa, lapillos, aut crassam urinam meiando reddendam ostendit.

§92. In biliosis (Duretus in Ileosis) urina intercepta citam mortem adfert.

§93. Urina in febre densitatem habens divulsa, morbi reversionem, aut sudorem portendit.

§94. In longis febribus, exiguis & erraticis, urinæ tennes meiando emissæ, lienosæ.

§95. In febre interdum varias reddi urinas, longi est morbi.

*Provrh.*  
120.

597. Quibus urinæ paucæ & grumosæ, febre non carentibus, tenuium copia ex his emissæ prodest. Tales autem emittuntur ab initio, vel citò habent hypostasim.

598. Quibus urina citò hypostasim habet, celeriter illi judicantur.

599. Epilepticis, urinæ præter morem tenues & crudæ, si repletio nulla adsit, de instanti casu admonent. Idque cum alias, tum si ad acromium, cervicem aut dorsum, dolor & tensio urget. Vel corporis obrepit stupor, vel perturbata insomnia obversantur.

600. Quæ parva copia apparent, veluti stillæ sanguinis, urinæ, vomitiones, & dejectiones, malum denunciant: Pessimum verò si exiguis intervallis sese consequantur.

### Titulus 35.

#### De Dejectionibus.

603. **U**bi alvus modicè intercepta, nigra stercoribus caprarum similia, nec nisi coacta demittit, hoc casu nasus æmulus, malo est.

604. Glutinosa, sincera & alba dejectio, prava est: Prava item quæ multum est fermentata, & aliquantulum pituitosa: Prava etiam cum ex his quæ concreta feruntur, quod subsidet, aliquantulum livescit, purulentum ac biliosum est.

605. Sanguis splendidus alvo per secessum rejectus, malo est, præsertim si dolor aliquis adsit.

606. Spumans dejectio eximiè biliosa (aut circumfusa bile) prava: Tum inde fiunt icterici.

608. Prava



608. Prava est purulenta & Sanguinis atri de- *Aph. 21*  
 jectio, cum febre & alias. Prava quoque varia *Secl. 4.*  
 & abundè colorata dejectio, & tanto peior, quo  
 colore formidanda magis, secus in pharmacia;  
 tum namque periculo vacat, copia non exupe-  
 rans.

[ Nulla quæ sua sponte movetur Sanguinis atri *Dure-*  
 dejectio, in bonis ducenda; semper omnino pe- *tus.*  
 stifera est ac cita morte non rarò funesta. Nam *Aph. 23*  
 qui à morbo emacruerunt, cum nigra dejecerint, *Secl. 4.*  
 postridie moriuntur. Sed mirum illud, ac pene  
 dixerim miraculo apponendum, quod hæmor-  
 rhoicus ater Sanguis tot commodis beat ægrotum,  
 & idem dejectus augeat multis damnis, tantum-  
 que periculo vitæ adjiciat, ut cita inde mors ve-  
 niat. Tum illud etiam subit mirari, quod nigra  
 dejectio sponte ducta, periculo & maleficio est  
 apponenda; sperabili autem salutis ac beneficio,  
 quam movet pharmacia convenienter præscrip-  
 ta.]

611. Liquida dejectio in sopore & torpore de-  
 tentis, pessima esse solet. Lethale etiam est, mul-  
 tum Sanguinem grumosum ex alvo effluere, i-  
 temque candidum & liquidum excrementum cum  
 alvi tumore.

615. Exactè candicans dejectio in febre, non  
 est judicii fausti.

616. Alvus perturbata, ut pauca sæpissimè  
 subducatur, distendit buccas, rubores etiam faciei  
 delet.

617. Stercoracea cum tensione dejectio, labo-  
 rem alvi denunciat, at pituitosa facta protinus  
 cum oris ventriculi dolore, dysenteriam fortè &  
 lumborum dolorem. His distenta alvus, quæ  
 coacta & ægrè liquida reddit, oculusque intumes-  
 cit, habet aliquid convulsorium, iisdem novis sub-  
 inde rigor, periculum creat.

618. Qui nigra egerunt, ii tenuibus & fri- *633*  
 gidis

gidis sudoribus diffluunt. ( Qui sunt mortis rudimenta. )

619. Alvus initio perturbata cum paucis urinis, labentibus inde diebus facta siccior, cum urinis tenuibus ( crudis ) & copiosis, abscessum in articulos prævidendum exhibet. ( Si frigida causa est, calida aures petit. )

620. Frequentes desidendi labores, rigores adferunt: Et quibus alvi excrementum vitiosum est, id maximam molestiam exhibet, si 4to die initium fecerit.

621. Frequentes & ex parvis intervallis desidendi labores, aliquantulum viscida excernentes, cum paucis stercoraceis, hypochondrii & lateris dolore, icterum prænunciant. Animadvertendum autem, num ex istorum suppressione, ii cum virore palleant. Eos verò etiam existimo Sanguinem profundere: Hos quoque lumborum dolores affligunt, & his Sanguineam profundentibus, Sanguis splendidus prodit. Cum sopore & capitis dolore subinde incallescere, perniciem denunciat.

625. Squalida cutis malè affectæ alvi index est. In his prærubræ carunculæ purulentæ fere ex alvo prodeunt.

*Aph.* 28 627. Biliosas alvi dejectiones surditas, & surditatem biliosa alvi dejectio sedat.

*Sect.* 4. 629. Virium exolutio dolorem solvens, alvum maximè humectam reddit.

630. Quæ circa sedem cum dolore suppurant, alvum conturbant.

631. Exitialis est dejectio pinguis & nigra, ac livida cum odoris gravitate, item biliosa simile quiddam lentum aut ciccrum lomento continens, aut veluti florulentos Sanguinis grumos, & infantium egestionem odore referens, ac varia, eademque diu perseverans; talis etiam fuerit cruenta, strigmentosa, biliosa, nigra, viridis, & si

mul & per vices excreta. Exitiosa quoque quacun-  
que prodeundo sensum ægri fallit.

638. Si cui, post diuturnum alvi profluvium, biliosa vomenti & cibos averfanti, sudor effluit multus, repente interimit.

639. Ab assumpto medicamento, si tum in ipso purgationis fluxu, tum postea, Sanguis liquidus confestim exit, malum.

645. Lingua tremula, nonnullis signum est alvi prorupturæ.

647. In humecta alvo, perfrigeratio cum sudore, mala.

648. Qui è gingivis, alvo liquida, Sanguis effluit, lethalis.

649. Dejectio pura cum sudore, febrem exolvit.

### Sectio tertia.

Τὰ φυσικὰ καὶ Ἀιματολογικὰ

### De Natura Hominis.

Περὶ φύσεως Ἀνθρώπου.

**S**I unum esset homo, nunquam doleret, non enim quicquam esset ex quo doleret, si unum existeret: Quin etiam si doleret, necessarium foret, etiam huic unicum tantum remedium esse. At nunc plura sunt, siquidem multa insunt in corpore, quæ cum mutuò inter se præter naturam calescunt & refrigerantur, siccanturque & humectantur, morbos pariunt. Ita ut plurimæ morborum idææ sunt, unde & varia eorum medela.



Corpus hominis continet in se Sanguinem, pituitam, & geminam bilem, nimirum flavam & nigram, ex quibus corporis ipsius natura constat, & per quæ ægrotat ac sanum est. Sanitate tum maximè fruitur, quando hæc inter se moderate affecta fuerint temperie, facultate, & copia, & maximè si optimè mixta fuerint. Ægrotat verò vehementer, quoties horum aliquod, aut parcius, aut copiosius fuerit, aut etiam à cæteris divortium fecerit in corpore, neque cum reliquis cunctis commixtum fuerit.

In immodicis purgationibus, sola vacuata bile, nullus unquam mortuus est. Verum epoto medicamento quod bilem ducat, primum sanè quis bilem vomitione refundet, mox etiam pituitam, deinde quoque atram bilem, idque per vim, sub mortem verò etiam Sanguinem purum evo- met.

Per hiemem augetur in homine pituita, at vere Sanguis increfcit, æstate bilis, autumnno verò atra bilis.

Cum hæc ita se habeant, par est, morbos qui augentur hieme, æstate finiri: Et qui æstate au- gentur, hieme desinere; nisi intra certum die- rum circuitum solvantur; quicumque autem mor- bi vere fiunt, horum discessum, autumnno expecta- re oportet. Quicumque verò autumnnales morbi sunt, horum discessum, necesse est vere fieri. Quod si quis morbus hæc tempora transgressus fuerit, eum annum fore scito.

*Aph. 22.  
Sect. 2.  
De Fla-  
tibus.*

Hæc quoque nosse oportet; quod mobos quos repletio parit, sanat evacuatio, & qui ex eva- cuatione oriuntur, repletionem curantur, & qui ex immoderato labore fiunt, eos quies sanat, qui- que ex otio gignuntur, immoderato labore tol- luntur.

Omnino Medicum sua prudentia obviam ire convenit morbis instantibus, & naturis, & anni tem-

temporibus, & ætatibus, contentaque solvere, & soluta intendere.

Ubi complures uno morbo, eâdem tempestate, vexantur, in id, quod maximè commune est, quoque omnes utimur, potissimum rejicienda causa est: Id autem est quod inspirando trahimus.

In Dorfi & coxendicum doloribus, ex malleolis *Lib. de* externis venæ sectiones fieri debent, in lum- *Ossium* borum verò & testium doloribus, ex malleolis in- *natu-* ternis. *ra.*

Probe nosse convenit hominem primâ ætate in omni vitâ esse calidissimum, postremâ verò frigidissimum.

## De Genitura.

*Dei 2976.*

**G**enituram ex toto corpore, & ex solidis, & mollibus partibus, & ex universo totius corporis humido, secerni assevero. Cujus rei istud est argumentum, quod ubi rem veneream exercemus, tantillo emissio imbecilles evadimus. Semen verò è corpore etiam emittit mulier.

In venere exercenda longe minorem, quam vir, voluptatem mulier percipit, vir verò etiam diuturniorem.

Qui juxta aures sectionem experti sunt, ii venerem quidem exercent, verum semen paucum, imbecillum & infæcundum emittunt. Maxima siquidem seminis pars, è capite secundum aures in spinalem medullam fertur.

Humidi 4. sunt species, Sanguis, bilis, aqua & pituita.

Sic autem se res habent mulierum, si quidem cum viris rem habeant, magis sanæ sunt: Sin

con-

contra, minus benè habent. Nam & coitu uteri humidiores evadunt, qui si plus æquo siccescant, vehementer contrahuntur, sicque contracti, corpori dolorem afferunt, coitus etiam Sanguinem excalefaciens, & humectans causa est, ut menses facilius profluant, quibus minimè prodeuntibus, morbis obnoxie mulieres redduntur.

## De Natura Pueri.

*Περὶ φύσεως παιδὸς.*

**S**I genitura ab utroque parente profecta, in mulieris utero permanserit, primum quidem simul permiscetur, condensatur, & calore increscit, deinde spiritum concipit, tum quia loco calido existit, tum quia mater spirat. Ubi spiritu repleta fuerit, viam ipse sibi foras facit, quæ per mediam genituram exeat; ubi verò via facta, spiritus ille calidus foras erupit, alium rursus frigidum à matre ad se attrahit, idque toto tempore perseverat.

Ubi genitura rota incaluit, & flatu intumuit, ei exteriore parte membrana circumducitur, per quam ad mediam genituram intrò & foras spiritui transitus fit. Equidem genituram 6. diebus in utero retentam & foras prolapsam ipse vidi, & qualis tunc meo iudicio visa est, ex eò reliquorum conjecturam facio. Quàmnam autem ratione istud viderim, enarrabo. Mulieri nobis familiaris, perelegans erat fidicina, quæ cum viris conversabatur, & quam minimè decebat gravidam esse, ne viliori loco haberetur. Hæc audierat quæ mulieres inter se narrant, si quando mulier conceptura sit, genituram intus manere, neque foras egredi. Quibus auditis & intellectis, ea

sem.



semper in animo habuit : Cumque aliquando genituram non exire percepisset , rem ad Dominam detulit , quæ ad me etiam pervenit : Quo audito , ipsa ut in terram desiliret , iussi. Quod cum jam septies fecisset , genitura in terram cum sonitu defluxit. Quam illa videns non sine admiratione spectavit , ego verò qualis erat referam : Ut si quis ovo crudo externam testam undique auferat ; in quo , interiore membrana contentus humor pelluceat ; ad hunc fere modum se habebat ille liquor , prætereaque ruber erat & rotundus. Conspiciebantur autem fibræ albæ & tenues , in membrana , cum sanie crassa & rubra contentæ , & ipsa membrana exteriori parte cruore , ad instar sugillatorum suffusa erat : In cujus medio tenue quiddam extabat , quod mihi umbilicus esse videbatur , & per illum primum respirasse , ex eoque protendebatur membrana tota genituram complectens.

Cum genitura in membrana continetur , spirationem intrò & foras habet , & Sanguine , à Matre in uterum delapso , incrementum accipit.

Caro dum increscit à spiritu discernitur , in eaque simile quodque , ad id quod sibi simile , fertur , densum ad densum , rarum ad rarum , humidum ad humidum ; ferturque unumquodque in proprium locum , ad id cum quo cognationem habet , & ex quo etiam ortum est.

Membrorum distinctio in fœmina fit 42. diebus in masculo verò 30. quod longissimum. Ut plurimum enim intrà hoc tempus , vel paulo minus , vel majus ista distingui contingit. Nam & purgatio à partu fit iis quæ fœminam susceperunt , 42. diebus , quæ verò masculum , 30. Purgationes autem à partu eâ de causa mulieribus contingunt , quod primo tempore ad 42 dies in fœmina , in masculo verò ad dies 30 , paucissimus Sanguis in Pueri alimentum cedit ; ex eo verò ad par-

tum usque tempore, copiosior; ac sanè purgationem in partus purgamentis reddi, & foras exire pro dierum ratione oportet.

Postquam singulis diebus, toto quo diximus tempore, purgatio foras procedit, primò quidem quantum hemina attica una & dimidia, vel paulo plus aut minus pro ejus ratione, dum cesset. Prodit autem velut à victimâ Sanguis, si benè habeat & benè habitura sit mulier, citòque con-  
644 crescit.

Nisi a partus purgamentis mulier repurgetur, magno morbo tentabitur, vitæque periculum incurret, nisi quis celeri adhibitâ curatione, convenientem purgationem promoveat.

Partus purgamenta primis diebus plurima prodeunt, deinde sensim imminuuntur, donec desinant.

Ad masculi motum trium mensium tempus conceditur, fæminæ verò, quatuor. Sic enim ut plurimum contingit. Etsi etiam quidam Pueri antè hoc tempus moventur. Primum autem mas-  
454 moveretur, quod fæmella sit robustior. Cum autem fætus moveretur, tunc sanè lac de se significationem Matrì exhibet.

Pecora cum uterum gerunt, nisi morbo aliquo laborent, potu ciboque pinguiora evadunt; indeque mulier, ex eo quod uterus fætu intumescens, fætæ ventrem comprimatur, quâ compressione, quod in cibo & potu pinguissimum est, foras in omentum & carnem profluit.

Arbores quæ ex aliorum inoculatione proveniunt, eæ non illarum similem, in quas insitæ sunt, fructum ferunt. Quod hoc modo contingit. Primo quidem oculus germinare incipit, cum alimentum habeat primum quidem ab arbore à qua avulsus est; tum verò ab eâ in quam insitus est. Ubi pullularit, tenues ex se radices in arborem demittit, primumque arboris humore, in quam  
in-

insitus est, fruitur, deinde temporis spatio radices in terram demittit, per eam in quam insitus est, & attracto à terrâ humore fruitur, indeque alimentum sumit. Ut proinde mirum minimè videri debeat, si insitæ arbores alios fructus proferrant, cum è terra vivant.

Puer ubi in utero existit, manibus ad genas adhæret, caputque pedibus proximum habet, neque certò dignoscere queas, etsi Puerum in utero videas; utrum caput sursum an deorsum vergat.

Quando mulieri partus instat, tum se movente Puero, & manibus ac pedibus se jactante, membranam quandam abrumpi contingit. Quâ ruptâ, cæteræ imbecilliores fiunt, primumque rumpuntur quæ illam contingunt, deinde postrema. Ruptis autem membranis, fœtus vinculo exolvitur, & agitated foras prodit. Cum verò Puer prodit, utero dilatato, qui mollis est, vi sibi viam aperit, & in caput fertur, si secundum naturam exierit.

Quamdiu autem in uteris manet (fœtus) validior semper evadit, dum membranas decimo mense perrumpat, quando Matri partus instat. Quod si vis quædam Puero contingat, etiam antè præfinitum tempus foras prodit: Quin etiam si alimentum à Matre priùs destituatur, sic quoque antè tempus partio ingruit. At verò si quæ ultra decem menses utero gestare sibi visæ sunt (quod jam sæpe audiui) sibi ipsis imponunt. Cur autem non longiore quam 10. mensium spatio, fœtum utero gestari contingat, referam. Post exactos 10. menses, ubi fœtus grandior est, alimentum & incrementum, quod à matre demittitur, non amplius Puero sufficere potest: Quod in Sanguine enim dulcissimum est, ad se attrahit, simulque aliquantula lactis portione fruitur. Quæ cum ipsi pauciora sint, puerque jam plenior fa-



tum usque tempore, copiosior; ac sanè purificationem in partus purgamentis reddi, & foras pro dierum ratione oportet.

Postquam singulis diebus, toto quo tempore, purgatio foras procedit, primò quantum hemina attica una & dimidia, vel plus aut minus pro ejus ratione, dum Prodit autem velut à victimâ Sanguis, habeat & benè habitura sit mulier, citòq; crescit.

Nisi a partus purgamentis mulier reperi magno morbo tentabitur, vitæque periculum curret, nisi quis celeri adhibita curatione venientem purgationem promoveat.

Partus purgamenta primis diebus plurimè deunt, deinde sensim imminuuntur, donec nant.

Ad masculi motum trium mensium tempore ceditur, fæminæ verò, quatuor. Sic et plurimum contingit. Etsi etiam quidam antè hoc tempus moventur. Primum autem movetur, quod fæmella sit robustior. Ceterum fætus movetur, tunc sanè lac de se purificationem Matri exhibet.

Pecora cum uterum gerunt, nisi morbo laborent, potu ciboque pinguiora evadunt, demque mulier, ex eo quod uterus fætus mescens, fætx ventrem comprimat, compressione, quod in cibo & potu pinguiora foras in omentum & carnem profluit.

Arbores quæ ex aliorum inoculatione nascuntur, ex non illarum similem, in quas fructum ferunt. Quod hoc modo contingit, mo quidem oculus germinare incipit, omentum habeat primum quidem ab arboris avulsus est; tum verò ab eâ in quam demittit, primumque arboris humore,

infans est, frater. hanc vena cava nominatur.  
in dextram descendit, per totum corpus, quam vena cava, &  
& auctoritate a terra haurit sicut, & auctoritate

invenit. Ut pueri ex matre, compressis labris ex Ma-  
dri debeat, si infans ab eis alit, tum etiam spi-  
rant, cum e terra vena.

Puer ubi in utero exierit, matrem. Quod si quis roget,  
leget, caputque pedesque pueri. Puer in utero trahat  
que certo dignoscere potas, utrumque, Pueri nascun-  
turo videas; utrum caput faciat, & quam primum  
veniat.

Quando mulieri partus infans utero habent stercus,  
te Puer, & mambes ut pedesque pueri, & mammam ili-  
membram quibusdam deest, utrumque, si non in

supra, ceteris membris sunt, utrumque, utrumque  
tumpuntur que illam contingit, utrumque, utrumque  
ma. Ruptis autem membris, utrumque, utrumque

olvitur, & agnus fore prodit. Cum videretur  
prodit, utro dilato, utrumque, utrumque  
an aperit, & in caput facit, utrumque, utrumque  
tunc exierit.

Quando autem in utero pueri, utrumque, utrumque  
aures & brachia; quin & ma-  
tut semper exierit, utrumque, utrumque  
se percipit, quando Matre, utrumque, utrumque  
in utero pueri, utrumque, utrumque  
totum corpus in

totum corpus facit, utrumque, utrumque  
inhorrescit, & in-  
mento a Matre prius accipit, utrumque, utrumque  
& articulum reli-  
te tempus primo inguit, utrumque, utrumque  
prehendit, & utrumque  
utrumque, utrumque, utrumque

per se inguit, utrumque, utrumque  
ter non inguit, utrumque, utrumque  
fieri utro gestu, utrumque, utrumque  
Novem autem mensium  
cras 10. menses, utrumque, utrumque, & vitalis est, utrumque

utrumque, utrumque, utrumque  
utrumque, utrumque, utrumque  
utrumque, utrumque, utrumque  
utrumque, utrumque, utrumque  
At 7. mense editus  
par-

etus, plus alimenti quam adsit, requirat, ipse se jactans, membranas dirumpit.

Procreatur avis ex ovi luteo, alimentum verò & incrementum, quod in ovo est candidum. Quod omnibus qui animum adverterint conspicuum esse potest. Cum autem alimentum ex ovo pullo deficit, neque satis ei suppetit unde vivat, copiosius alimentum postulans, vehementer movetur in ovo, & membranz circum circa dirumpuntur. Et ubi avis pullum vehementer moveri senserit, putamen tundendo excavans, ipsum excludit. Atque hæc intrà dies 20 contingere solent, idque ita se habere manifestum est. Nam ubi volucris ovi testam contundendo excavârit, nihil penitus humoris quod alicujus sit momenti in eâ inest, quod totus in pullum absumptus sit.

Si quis ova 20. aut plura gallinis duabus aut pluribus, ut excludantur, supponat, & singulis diebus à secundo exorsus, ad ultimum usque quo ovi putamen detrahatur, subtrahat, frangat, & diligenter inspiciat, is eo, quo dixi, modo, omnia se habere deprehendet; si modo avis naturam cum humana conferre licet. Ex umbilico enim membranas portendi, aliaque omnia quæ de Puerro dicta sunt, eodem prorsus se habere modo, in ovo gallinaceo comperies.

## De Carnibus seu de Principiis.

Περὶ σαρκῶν vel Ἀρχῶν.

**Q**UOD calidum vocamus, id mihi immortale esse videtur, cunctaque intelligere, videre, & audire, sentireque omnia, tum præsentia tum futura: Duæ sunt à corde venæ cavæ, & hæc qui-



quidem arteria , illa verò vena cava nominatur. Arteria calidi plus continet quam vena cava , & spiritus penus est.

Puer dum in utero est , compressis labris ex Matris utero , tum alimentum sugit , tum etiam spiritum , qui in Puero calidissimus est , Matre respirante , in cor attrahit. Quod si quis roget , unde quis hoc sciat , quod Puer in utero trahat & sugat : Huic ita respondendum , Pueri nascuntur stercus in intestinis habentes , & quam primum nati fuerint , tum homines , tum pecora , ilico alvum deponunt ; atqui nullum haberent stercus , nisi in utero suxissent , imo neque mammam ilico ut natum est animal sugere nosset , si non in utero suxisset.

Hominibus plerisque quarto septenario annorum duo dentes enascuntur , qui moderatores nominantur ( σωφρονισῆρες. )

Genitura intra 7. dies habet quæcunque ex corpore ei accedere necesse est ; ut multoties vidi. Eâ enim in aquam coniecta , si acuratus inspexeris , membra omnia habere deprehendes , & oculorum regiones , & aures & brachia ; quin & manuum digiti , & crura , & pedes , & pedum digiti , & pudendum , & reliquum totum corpus in conspicuo est.

Mulier ubi concepit , statim inhorrescit , & incalescit , ac dentibus stridet , & articulum reliquumque corpus convulsio prehendit , & uterum torpor.

Puer 7. mense natus , certa ratione in lucem prodit & vitalis est. Octavo autem mense natus nullus unquam vixit. Novem autem mensium & decem dierum fætus editus , & vitalis est , numerumque ad hebdomadas exactè respondentem habet. Quatuor nempe decades hebdomadarum dies sunt 280. hebdomadarum autem decuriam dies septuaginta constituunt. At 7. mense editus

partus, tres hebdomadarum decurias obtinet, quæ faciunt dies 210. forte quis mirabitur factum 7. mense nasci, atque id quidem certè & sæpius vidi. Quod si quis volet, id facile deprehendet, obstetrices quæ parturientibus præsunt adeundo & percontando.

### De Septimestri Partu.

*Περὶ ἑπταμήνου.*

**E**X his qui septimo mense nati sunt, supersunt quidam, licet ex multis pauci.

Mulieribus de partu fides habenda est; quæ semper proferunt & affirmant, 7. mense & 8vo, & 9, & 10, & 11, partus in lucem prodire, & ex his 8vo mense natos minimè superesse.

Pueris ubi 7. menses attigerunt, tum alia eximia in corporibus fiunt, tum eò tempore dentes apparere incipiunt.

### De Octimestri Partu.

*Περὶ ὀκταμήνου.*

**Q**uod ad partum qui 8vo mense editur, attinet, fieri non posse assevero, ut duas continenter consequentes afflictiones Pueri perferant. Ideoque eos qui 8vo mense nascuntur, minimè superesse. Hic etenim accidit, ut eâ quæ in utero est, & eâ quæ in partu fit afflictione, consequenter laborent. Propterea eorum qui 8vo. mense eduntur, nullus est superstes. Decimestres nuncupatos 7. dierum quadragenariis potissimè

simum , in lucem edi sentio. Perfectissimus factus est primis quadraginta diebus.

## De Superfætatione.

Περὶ ἐπιπύσεως.

**C**Um fætus mortuus fuerit , tum aliis signis conijcere licet , tum etiam jubere oportet , ut modo quidem dextrum in latus jaceat , modo etiam in sinistrum convertatur ; dilabitur enim fætus in utero , quocunque se vertat mulier , velut saxum , aut aliud quidpiam , si mortuus fuerit , & pectinem frigidum mulier habet.

Si parturienti , ante fætum multus sanguinolentus citra dolorem fluxus contingat , periculum est , ne fætus mortuus exeat , aut minimè vitalis edatur.

Mulier prægnans si venerem non exerceat , partu facilius liberabitur.

Prægnantem mulierem vel oculi retracti & caviores redditi tibi indicabunt , & oculorum candidum albedinem nativam non habens , sed lividius.

Prægnantibus si terra aut carbones in cibum expetuntur , eaque edant , in fætus capite , ubi in lucem editus fuerit , horum signum apparet.

Mulier quæ præter naturam crassa & pinguis evasit , & pituita repleta , eò tempore non concipit , quæ verò sua natura talis est , horum gratia concipiet , nisi aliud quid impediat.

Quæ citò concipiebat , si concipere desinat , bis in anno manuum & crurum venam sibi secari jubeat.

Si cui dolores in coxendice , aut in capite , aut in manibus , aut aliqua alia corporis parte fuerint ,



rint, cum verò prægnans est, desinunt, conceptu autem ab utero exoluto, rursus insunt, odorata & bibere, & ad uteri os apponere conducit.

*Lib. 1. c. 1.* Si noscat mulier se genituram suscepisse, tunc ne virum adeat, sed quiescat: Id autem cognoscet, si quidem vir se semen emisisse dicat, mulier verò præ siccitate ignoret. Sin uterus genituram ad pudenda remiserit, & mulier humecta evadat, rursus cum viro concumbat, quoad concipiat.

*Lib. 1. c. 2.* Mulier quæ concipit quidem, fætus autem bimestres perdit, eò exacto tempore, neque prius neque posterius, idque bis aut ter illi contigit, quin etiam si trimestres, aut quadrimestres, aut etiam majores fætus ad eundem istum modum perdat, his uteri in majorem amplitudinem non amplius crescunt.

*Lib. 1. c. 3.* Venum tempus ad conceptum maximè accommodatum.

Virgini, si menses suo tempore non appareant, multum & febricitat, & dolet, sitit, esurit, vomit, insania vexatur, & rursus ad mentem venit.

## De Dentitione.

*Περὶ ὀδοντοποιίας.*

**E**X lactentibus qui urinam multam reddunt, minimè per annum durant.

Quibus alvus multum fertur, si benè concoquant, ii melius habent.

Quibus cum dentes erumpunt, alvus crebrius demittit, minus convulsione tentantur, quam quibus sic rarò alvus subducitur.

Qui-

Quibus in dentitione febris acuta accedit, raro convulsionibus tentantur: Qui cum dentitione benè habito corpore permanent, gravi somno premuntur, periculum est ne eos convulsioprehendat.

Quibus hieme dentes erumpunt, si cætera similiter se habeant, ii melius degunt.

Non omnes dentibus erumpentibus convulsionē tentati, moriuntur, plerique etiam servantur.

Qui cum tussi dentiunt, iis tardius dentes erumpunt, in ipsa autem punctione, magis extenuantur.

## De Corde.

*Περὶ καρδίας.*

**H**umiditatem cor tantam habet quanta maximè ad æstuantis medelam satis sit.

Cor musculus est validus admodum, duos discretos habens in uno amictu ventriculos, utrinque quidem unum, qui nullo modo inter se sunt similes.

Mens humana in sinistro ventriculo à natura instituta est. Et reliquæ animæ imperat.

## De Glandulis.

*Περὶ ἁδένων.*

**C**erebrum ipsum quasi Glandula est. De capite fluxiones velut secretionē contingunt, per aures secundum naturam, per oculos, per na-

res, très numero. Aliæ per palatum in fauces, in gulam, aliæ per venas in spinalem medullam, in Sanguinem, omnes numero septem; ex si discedunt, cerebri purgamenta sunt, & nisi discedant, ipsi morbum creant, non secus ac reliquo corpori, si intrò & minimè foras discesserint.

## De Ossium Natura.

Περὶ ὀστέων φύσεως.

**D**anda est opera, ut quam maximè procul à locis in quibus dolores fieri, & Sanguis colligi solet, venæ sectiones faciamus. Ad hunc enim modum continget minimè magna repente mutatio, & translata consuetudine efficiet, ut ne amplius ad eundem locum coeat. Ossâ corpori firmitatem, rectitudinem, ac formam præbent, nervi verò flexionem, contractionem & distentionem; carnes autem & cutis omnium colligationem ac connexionem. Venæ per corpus diffusæ, spiritum, fluxionem & motum exhibent, ab una multas propagines emittentes. Atque hæc una unde exordium sumat, & ubi desinat, non satis mihi compertum est; circulo enim facto principium non invenias.

## De Aere locis & Aquis.

Περὶ αἰθέρος, ὑδάτων, πῦρος.

**Q**ui artem Medicam rectâ investigatione consequi volet, is primum quidem anni tempora in considerationem adhibere debet, quid hæc



horum quodque possit. Deinde verò ventos tum calidos, tum frigidos, præcipue quidem eos, qui omnibus sunt communes, ac deinceps eos qui cuique regioni sunt familiares. Quin etiam aquarum facultates animo reputare oportet. Quemadmodum enim gustu & pondere, ita & facultate, singulæ plurimum differunt. Terra etiam ipsa inspicienda, nuda ne sit, & aquis careat, an densa & irrigua, & an cavo loco sita sit & æstuoso, an verò sublimi & frigido. Hominum quoque victus ratio, quânam maximè delectentur, inspicienda, an potui, & cibis & otio dediti, an exercitationibus & laboribus gaudeant, & an edaces sint, & à potu sibi temperent, & ex his singula reputare oportet. Hæc enim, præcipue quidem omnia, aut certè plurima probè qui agnovit, cum ad urbem sibi ignotam pervenerit, eum neque morbi regioni familiares, neque communium quæ sit natura, latere poterit, ut neque in eorum curatione hæsitare aut aberrare possit. Qui verò ista rectè cognoverit, is cuiusque temporis impendentis, & anni statum prædicere poterit, & quinam morbi tam æstate, quam hieme in urbe communiter sint grassaturi, tum etiam quânam cuique privatim ex victus mutatione impendere debeant.

Ad artem Medicam Aëstonomia plurimum confert.

Hieme frigidâ Homines capita humida & pituita redundantia habere æquum est, & pituitâ ex capite defluente, eorum alvos crebrò exturbari, eosque ut plurimum habitu corporis esse debiliore, ac neque probè edere nec bibere posse.

Quibus autem capita debilia fuerint, ii nunquam egregii potiores erunt, quod eos crapula magis vexet.

Calidæ sunt aquæ, ubi aut ferrum nascitur,

aut *z9*, aut *argentum*, aut *aurum*, aut *sulphur*, aut *alumen*, aut *bitumen*, aut *nitrum*: Hæc enim omnia caloris vi proveniunt.

Optimæ sunt aquæ quæ ex profundissimis fontibus proveniunt, maximè verò commendantur, quarum fontes ad solis exortus præsertimque æstivos decurrunt; limpidiores enim, & boni odoris, & leves esse necesse est.

Qui sanus est ac valet, is nullo habito discrimine, semper aquam quæ adest, bibat.

At verò de aquis salis, propter imperitiam falluntur quidam, quod alvum solvere existimentur, cum maximè alvi dejectionibus repugnent.

Aquæ ex imbribus collectæ levissimæ & dulcissimæ sunt, tenuissimæ & limpidissimæ. Sol enim quod imprimis in aqua est tenuissimum & levissimum, sursum educit & rapit. Quin etiam ex ipsis hominibus tenuissimum ac levissimum humorem educit; cuius rei maximum est indicium, cum homo vestibus indutus in sole ambulaverit, aut sederit, quasunque enim corporis partes sol aspicit, hæc nullum sudorem emittunt. Sole enim quicquid sudoris comparet, ad se rapit, quæ verò veste conteguntur, hæc exudant, cum verò ad umbram pervenerit, tum corpus æqualiter sudore diffluit.

Pravæ omnes aquæ quæ ex nive & glacie fiunt. Ubi enim semel concreverint, non amplius ad pristinam naturam redeunt. Sed quod in his est splendidum & leve & dulce excernitur & evanescit; remanet verò quod turbidissimum & ponderosissimum. Quod hæc ratione deprehendas, si enim hiemis tempore vasculum, certâ aquæ mensurâ affusâ, sub dió exponere voles, uti maximè congeletur, deindè postridiè in locum calidum delatum, ubi glacies maximè liquecat, cum soluta fuerit, iterum aquam metiaris, aquam multo pauciorē reperias.

De

De annis hoc modo consideratione adhibitâ quis statuat, qualisnam annus futurus sit, numne salubris, an morbosus. Siquidem secundum rationem, in siderum ortu & occasu signa appareant, si per autumnum pluât, & hiems sit moderata, neque admodum blanda; neque præter modum frigida, & vere ac æstate aquæ tempestivæ eveniant, sic annum saluberrimum esse consentaneum est.

Quod si hiems sicca fuerit & aquilonia, verò pluvium & austrinum, æstatem febribus abundare, & lippitudines inducere necesse est. Ubi enim ab imbribus vernis, & ab austro terra humectata fuerit, & plenior æstus derepente supervenerit, tum à terrâ madidâ & calidâ existente, tum à sole adurente, ardorem conduplicari necesse est, hominum ventribus minimè consistentibus, neque resiccato cerebro. Neque enim ubi ver tale extiterit, fieri potest, quin corpus & caro nimio humore diffuant, ita ut omnibus, ac maximè pituitosis, acutissimæ febres immineant. Mulieribus verò & naturis maximè humidis, dysenterias contingere par est. Ac siquidem sub caniculæ exortum aqua & Hyberna tempestas supervenerit, etesiarque spiraverint, quietis spes est, autumnumque salubrem fore. Alioqui periculum est ne Pueri & mulieres moriantur, minimè verò senes, aut ne qui evaserint in quartanas tandem incidant, & ex quartanis in aquam intereant.

At si hiems quidem austrina, pluviosa & placida fuerit; verò aquilonium, siccum & tempestuosum, primum quidem mulieres prægnantes, quibus partus in ver imminet, abortionem facturæ est verisimile, quæ verò pepererint, adeo imbecillos ac morbosos fætus parituras, ut aut statim pereant, aut tenues, debiles & valetudinarii vivant. Atque hæc quidem mu-



lieribus; reliquis verò, dysenterias & lippitudines siccas, nonnullisque defluxiones à capite in pulmonem.

Si verò æstas pluviosa fuerit & austrina, & autumnus similiter, morbosam esse hiemem necesse est, iisque qui pituitâ abundant, & 40. annum excesserunt, febres ardentes contingere æquum est; biliosis verò, pleuritides & pulmonum inflammationes.

*Aph. 13*  
*Sect. 3.* At si æstas sicca & aquilonia fuerit, autumnus verò pluvius & austrinus, sub hiemem, capitis dolores, & cerebri siderationes fieri par est, ac præterea rucedines, gravedines, & tussis, & nonnullis quoque tabes.

*Aph. 14*  
*Sect. 3.* Quod si aquilonius & siccus fuerit autumnus, ac neque sub eanem, neque sub arcturum pluviosus, pituitosis quidem, naturaque humidis & mulieribus confert, biliosis verò hoc est maximè adversum. Admodum enim resiccantur, iisque lippitudines aridæ contingunt, & febres acutæ ac diuturnæ, quibusdam etiam melancholiæ. In bile namque quicquid est humidissimum & aquosissimum consumitur, quod verò crassissimum & acerrimum remanet, quod in Sanguine eadem quoque ratione accidit, unde ii morbi illis contingunt. Pituitosis verò hæc omnia auxilio sunt.

Præcipuè maximæ anni temporum mutationes observandæ sunt, ut neque Medicamentum purgans lubenter exhibeamus, neque partes circa ventrem uramus, aut secemus, ante dies 10. aut etiam plures, sufficiunt tamen 10, at maximi periculi plena sunt ambo solstitia, præcipue æstivum, periculosissima etiam ambo æquinoctia existimantur, maximè verò autumnale. Siderum quoque ortus observandi, præcipuè caniculæ, deinde Arcturi, & Vergiliarum occasus. His enim potissimum diebus, morbi judicationem subeunt,

&

& alii quidem perimunt, alii verò definunt, alii-  
que omnes in alium statum transeunt.

[ Oriuntur Vergiliæ seu Pleiades circa finem  
Aprilis, & occidunt sub initium Novembris, Ar-  
cturus oritur mense Septembri. Hiems durat à  
Pleiadum occasu usque ad æquinoctium vernum,  
ver à verno æquinoctio ad Pleiadum usque exor-  
tum. Æstas verò à Pleiadum ortu, ad ortum Ar-  
cturi. Autumnus denique ab ortu Arcturi ad Pleia-  
dum occasum. ]

De macrocephalis circa Mæotidem paludem de-  
gentibus, quemadmodum se habeant, mihi di-  
cendum est. Initio quidem hominum institutum  
longitudinis capitis causa fuisse videtur. Nunc verò  
natura etiam ad institutum accedit. Longissima  
enim habentes capita generosissimos existimant.  
Hujusmodi est institutum. Cum primum editus  
est infans, caput ejus adhuc tenellum & molle  
manibus effingunt, & in longitudinem adolescere  
eogunt, vinculis & idoneis artibus adhibitis,  
quibus capitis rotunditas vitietur, & longitudo  
augeatur. Hoc institutum primum hujusmodi  
naturæ dedit initium. Successu verò temporis in  
naturam abiit; ut proinde instituto nil amplius  
opis esset. Semen enim genitale ex omnibus cor-  
poris partibus provenit, ex sanis quidem sanum,  
& ex morboſis morboſum. Si igitur ex calvis  
calvi gignuntur, & ex distortis ut plurimum distor-  
ti, quid prohibet, cur non etiam ex macrocephalo  
macrocephalus gignatur.

Cur Asiatici Europæis minus bellicosi existant,  
& moribus sint lenioribus, anni tempestates in  
causa sunt, quæ non magnas, tum ad calorem,  
tum ad frigus, permutationes faciunt, verum  
similes permanent: Unde neque mens stupore  
percellitur, neque corpus vehementer à suo stato  
dimovetur. Ex quibus iram exasperari, ac pru-  
dentix & caloris compotes fieri magis æquum  
est.

est, quam si eodem semper statu permaneant: Mutationes enim inter omnia, Hominis mentem semper excitant, neque sinunt quiescere. Quas ob causas mihi Asiaticorum genus omni ope destitutum videtur; quibus præterea eorum instituta accedere debent. Multo enim maxima Asiæ pars regum Imperio regitur. Qui verò sui potestatem non habent, neque sui iuris sunt, sed Dominis subditi, ii rerum bellicarum nullam curam habent, sed ut ne bellicosi videantur.

Scythæ Carnibus coctis vescuntur, & lacte equino in potu utuntur. Et hippaco (ἵππικον) i.e. caseo equino victitant. Plerique Scythæ eunuchi fiunt, & evirati, & effæminati evadunt, ex eo quod ex defluxione ob diuturnas equitationes laborantes, & circa coxendicem claudicantes, sibi ipsis medentur, utramque venam post aures incidendo. Hac enim curatione seipsos perdunt; juxta aures quippe venæ sunt, quæ incisæ sterilitatem inducunt.

## De Flatibus.

Περὶ φουῶν.

**M**edicus non nisi quæ periculo sunt proxima intuetur, & quæ sunt ingrata contrectat, atque ex aliorum calamitatibus sibi dolorem conciliat.

Ægrotantes verò artis operâ, maximis malis, morbis, laboribus, dolore & morte, vindicantur. His enim omnibus Medicina manifestam medelam adhibereprehenditur.

*Indigna  
prorsus  
Hippoc.  
Senten-  
tia.*

Hujus artis vilia nosse difficile, seria verò facile, ac vilia quidem ipsis Medicis, vulgo autem minime sunt cognita, cum mentis non corporis operâ



opera existant. Obscurissimos & maximè difficiles morbos opinio magis quam ars judicat. Et si in his plurimum imperitiæ peritiæ præstat.

Qui morbi causam cognoverit, is utique ex his quæ in corpore insunt, adeptâ per contraria morborum cognitione, facillè poterit quæ conferunt offerre. Ipsa enim ars Medica maximè à naturâ inest.

Plenitudinem evacuatio sanat, evacuationem *De natura* plenitudo, laborem otium, & otium labor. Atque ut uno verbo dicam, contrariorum contraria *Homini* sunt remedia.

Medicina additio est & subtractio, eorum quidem quæ exuperant, Subtractio, eorum verò quæ deficiunt, Additio. Qui verò istud optimè facit, is optimus Medicus existimandus est, qui-que plurimum abest ab eo præstando, is plurimum in arte Medica deficere censetur.

Hominum & reliquorum animantium corpora triplici alimento nutriuntur, cibo, potu & spiritu.

Tanta corporibus omnibus spiritus inest necessitas, ut si quis aliis omnibus, & cibis & potionibus abstineat, duos tamen, & tres, vel plures dies possit vitam ducere. At si quis spiritus in corpus vias intercipiat, vel exiguâ diei parte, homini pereundum sit; adeò necessarius est usus spiritus in corpore.

## De Morbo Sacro.

*Περὶ ἱερῆς νόσου.*

**M**Orbus hic nihil habet aliis morbis divinius aut sacratius, sed eandem, ex quâ reliqui morbi oriuntur, naturam sortitus est. Homi-

nes verò ex imperitia & admiratione ei naturam quandam & causam divinam inesse censuerunt, quod nulla in re reliquorum morborum similis esset.

Hic morbus pituitosis contingit, biliosis verò minimè. Ac originis initium sumit, cum adhuc fœtus in utero existit.

Quibus in puerili ætate ulcera in caput, in aures, & reliquum corpus erumpunt, si salivosi mucosique extiterint, ii procedente quidem ætate facillimè degent. Tunc enim pituita, quam in utero repurgari oportuerat, emittitur & purgatur; quique sic purgati fuerint, ferè hoc morbo comitiali minimè corripiuntur. Qui verò puri fuerint, ut neque ulcus ullum habuerint, neque mucus aut saliva ulla prodierit, periculum est, ne ii hoc morbo corripiantur.

Oves, & præsertim capræ frequentissimè hoc morboprehenduntur.

Cum inveteraverit morbus, ampliùs curari non potest.

Quibus morbus jam in consuetudinem venit, ii se correptum iri præsentunt, & hominum conspectum fugiunt, domumque, si propè sit, se conferunt, sin minus, in solitudinem, quoquam paucissimi eos cadentes videant, statimque se contegunt, propter affectionis verecundiam, & non (ut plerique existimant) propter numinis metum.

Oportet Medicum non augere morbum, sed properanter profligare, id quod cuique morbo est maximè adversum, non amicum aut familiare exhibendo.

## SECTIO QUARTA.

*Continens vñ Αἰσθησις.*

### De Salubri Victus ratione.

*Περὶ Αἰσθησις ὑγιανῶς.*

**C**Rassi qui tenues fieri cupiunt, ii jejuni omnes exercitationes subire, & adhuc ex labore anhelantes, nec dum refrigerati, cibos aggredi debent, priusque vinum bibere dilutum non admodum frigidum. Quin & semel cibus capiendus, & duriter cubandum.

Sex Hibernis mensibus vomitus ciendus, quod tempus hoc æstivo plus pituitæ gignat, & morbi circa caput & regionem eam, quæ est supra septum transversum, excitantur. At ubi æstas viguerit, infusis utendum. Hæc enim anni tempestas æstiosa est, & corpus bile magis abundat, gravitates etiam lumbos & genua infestant, calores oboriuntur, & venter torminibus torquetur. Corpus igitur refrigerandum, & quæ sursum attolluntur, deorsum ex istis locis deducenda.

Obæsi ac minimè tenues jejuni vomant. Graciliores autem & imbecilliores, à cibus vomitum ciant.

Qui singulis mensibus bis vomere consuevit, hunc præstat duobus ex ordine diebus vomitum ciere, quam decimo quinto die.

Qui postridie cibos eructant, & quibus præcordia, nimirum cibus non concoctis, attolluntur, iis longior somnus confert.



## Liber Primus.

## De Victus Ratione.

Περὶ Ἀγνῆς τῶ πέντων.

**N**ULLUS eorum qui antè nos scripserunt, reprehendendus, quod omnia invenire non potuerint, quin potius laudandi omnes, quod quædam investigatione aggressi sunt.

Si inventus fuerit cujusque naturæ conveniens cibi modus, & laborum numerus, qui neque supra, neque infra, modum excedat, sanitas sanè hominibus exactè inventa fuerit.

Non enim morbi derepente hominibus contingunt, sed paulatim collecti, acervatim se produnt.

Omnia tum animantia, tum homo ipse, ex duobus facultate quidem diversis, usu verò consentientibus, constant, igne inquam & aqua. Quæ duo simul juncta, tum aliis omnibus, tum sibi invicem satis sunt: Utrumque verò seorsim, neque sibi ipsi, neque cuiquam alteri satis esse potest. Horum utrumque hanc obtinet facultatem. Ignis si quidem omnia semper movere, aqua verò omnia semper nutrire potest.

Irrepat in hominem animus (ψυχή) ignis & aquæ temperationem sortitus, corporis humani portionem.

Ars Medica ab eo quod molestum est, liberat, & id, ex quo quis ægrotat, auferendo, sanitatem reddit: Idem & natura per se facere novit.

## Liber Secundus.

## De Victus Ratione.

Περὶ Ἀγνῆτος τοῦ σώματος.

**I**nsulæ continenti vicinæ, rigidiores habent hiemes, marinæ verò tepidiores, propterea quod nives & glacies in continenti perdurant, & ventos frigidos ad vicinas insulas mittunt : In his verò quæ in alto sitæ sunt, per hiemem non perdurant.

Venti omnes natura quidem refrigerant & humectant, verum ex regionum & locorum situ, per quæ ad regiones qualque obveniunt, inter se differunt, & frigidiores, calidiores, humidiores, sicciores, morbosiores, & salubriores existunt.

Hordeum naturâ quidem frigidum & siccum. Inest & quiddam quod purget, ex palearum succo.

Lac ovillum alvum sistit, caprinum verò magis alvum subducit, bubulum minus, equinum & asininum per alvum magis demittitur.

Triticum hordeo valentius est, & magis nutrit, minus autem alvum subducit, tum ipsum, tum succus.

Panis ex farina integra nec excussa, siccatur & alvum subducit, purus verò, plus quidem nutrit, minus autem alvum dejicit.

Ex panibus autem, fermentatus quidem levis est, & per alvum secedit. At non fermentatus, minus quidem alvum dejicit, plus verò nutrit.

Fabæ alimentum quoddam alvum sistens & flatuosum exhibent, pisæ minus quidem inflant,

magis alvum dejiunt. Cicer album alvum & urinam movet, & nutrit. Lentæ æstuosæ sunt, & turbant, & neque alvum dejiunt, neque sistunt. Lini semen in cibo sumptum alvum sistit, & aliquantulum refrigerat.

Carnes bubulæ validæ sunt, & alvum sistunt, nec facile in ventriculis concoquuntur, quoniam crassi & multi Sanguinis est hoc animal. Caprinæ carnes his leviores sunt, & magis alvum dejiunt. Suillæ his quidem magis corpus roborant, & abunde alvum dejiunt. Agninæ ovillis sunt leviores, & hædinæ caprinis, quia exangues magis & humidæ. Vitulinæ carnes ad bubulas eodem se habent modo: At porcellorum carnes suillis sunt graviore. Hoc enim animal naturâ carnosum & exangue, quamdiu tenellum est, superabundantem habet humiditatem. Sylvestris suis caro siccatur, robur affert, & alvum dejiunt; Cervi verò, siccatur & minus alvum dejiunt, magis autem urinam provocat. Leporina sicca est, & alvum moratur, urinam tamen quodammodo ciet.

Omnia ferè volucrum genera quadrupedibus sicciora existunt; nam quæ vesicam non habent, neque urinam reddunt, neque salivam fundunt, prorsus sicca sunt. Palumbis caro siccissima, deinde columbæ, 3. loco perdicis & galli, ac turturis, anseris verò maximè humida. Anatis carnes, & reliquarum avium quæ in paludibus, aut aquis degunt, omnes humidæ existunt.

Ex piscibus leves sunt saxatiles ferè omnes, velut turdus, gobio.

Vinum calidum & siccum, habet & purgans quiddam à materiâ. Vina nigra & austera sicciora sunt, neque per alvum secedunt, neque urinam movent, sed corporis humiditatem abstruendo, siccant & caliditatem inferunt. Dulcia nigra humidiora sunt, calefaciunt autem & inflant



stant, cum humiditatem inducunt. Alba verò & austeri calefaciunt, magis autem urinam movent, quam alvum dejiunt. Vina recentia alvum magis movent, quod musto sint propiora, & nutriunt, item odora magis quam inodora ejusdem ætatis, quia facilius concoquuntur, & crassa quam tenuia. At tenuia dulcia, urinam magis & alvum movent, corpusque humectant, & Sanguinem imbecillum reddunt, eum adversarium corpori Sanguinem augeant. Mustum flatum movet, & subducit, turbationemque in ventre, suo fervore excitat, alvumque dejiunt. Vina acida refrigerant, extenuant & humectant. Sapa calefacit, humectat & subducit.

Allium calidum, urinam & alvum movet, oculis minimè bonum. Nasturtium calidum est, & carnem liquefacit, pituitam albam sistit, proindeque stranguriam infert. Sinapi calidum est, & alvum dejiunt, sed & hoc urinæ difficultatem parit. Apium urinam magis quam alvum movet, radices etiam magis quam ipsum, alvum movent.

Ruta urinam magis quam alvum movet, & præpota adversus venena valet.

Asparagus ficans est & alvum sistit. Salvia ficans est & alvum sistit.

Solanum refrigerat, & in somnis, veneris ludibria prohibet.

Mentha calefacit & urinam ciet, vomitionemque sistit, ac si quis eam sæpè comedat, ejus genitale semen ita colliquefacit, ut effluat, & arrire prohibet, corpusque imbecillum reddit.

Brassica calefacit, per alvum secedit, & biliosa educit.

Betæ succus quidem alvum dejiunt, olus autem ipsum cibo sumptum, sistit. Radices verò alvum magis movent.

Rapum æstuosum est, humectat autem, & corpus

pus conturbat, non tamen per alvum secedit, verum urinæ difficultatem adfert.

Mora calefaciunt & humectant, per alvumque secedunt. Pyra matura alvum dejiciunt, cruda verò sistunt.

Veneris usus extenuat, humectat & calefacit.

Alvum coactam vomitio solvit, & plus æquo fluidam sistit, illam quidem humectando, hanc verò siccando.

Otium humectat & corpus imbecillum reddit. Quiescens enim animus, corporis humidum minimè absunit: labor siccatur, corpusque validum efficit.

Semel die sumptus cibus extenuat & siccatur, alvumque sistit, quoniam animi calore, ventris & carnis humidum absunitur.

## Liber Tertius.

### De Victus Ratione.

*Περὶ Ἀγῆς τῆς τροφῆς.*

**A** Nnum plerique in quatuor partes omnibus notatas dividunt, hiemem, ver, æstatem & autumnum: Ac hiemem quidem à vergiliarum occasu ad æquinoctium vernum; ver autem ab æquinoctio ad vergiliarum exortum; æstatem à vergiliarum ortu ad arcturi exortum: Autumnum verò ab arcturo ad vergiliarum occasum.

Vomitibus post cibos cujusvis generis, humidiores ter in mense utantur, sicciores verò bis.

A cœna minimè deambulandum, sed tantum standum. Mane verò deambulationibus utendum.

dum. Soles vitandi, & frigora tum matutina, tum vespertina, quæcunque à fluminibus, aut stagnis, aut nivibus spirant.

Cum intestinum humiditatem non habeat, stercus ambiens intumescit, viasque obstruit, & dolorem parit, calorprehendit & quicquid biberit aut comederit, evomit, tandem etiam stercus vomitione rejicit: Quo cum pervenerit, minimè hic vivere potest.

## De Insomniis.

*Περὶ ἐνυπνίων.*

**Q**ui de his, quæ per somnos contingunt, rectè conjectaverit, is ea per omnia magnam habere vim comperiet. Quisquis igitur rectè ista dijudicat, is non minimam Sapientiæ partem assequitur.

Oportet manus admoventem, Deorum opem advocare.

Quæ insomnia, de diurnis actionibus mens humana vesperti sub noctem in somnis affert, & eodem modo reddit, quo per diem in re justa, gesta, aut consulta sunt; ea bona, & sanitatem portendere existimanda sunt; propterea quod animus neque plenitudine ulla, neque evacuatione, neque aliâ re quâvis extrinsecus irruente, superatus, in diurnis consiliis perseverat. At insomnia quæ diurnis consiliis adversantur, perturbationem in corpore denunciant. Sol, Luna, Cælum, Stellæ; pura quæque & suo motu agitata, in somnis visa, bona sunt. Sanitatem enim corporis, omniumque ejus partium significant. Quod si quid contra contingat, aliquem corporis morbum portendit. Astris quidem exterior corporis ambitus re-



**S**pondet, Soli Medius, Lunæ verò, qui ad cavitates spectat: Si quod igitur istorum siderum extinguì, aut ladi, aut evanescere, aut cursum sustinere (alii à cursu deflectere) videatur, in illa parte morbum eventurum indicat.

Quod si in stagno, aut mari, aut fluminibus quis natare videatur, bonum non est, cum humiditatis exuperantiam indicet. Huic autem victus ratio sicca, & labores conferunt. At febricitanti bonum est, quoniam calor ab humöribus extinguitur.

Mortuos nitidos & candidatos videre bonum est, bonum quoque quid purum ab ipsis sumere. Quod si contra quis nudos, aut atratos, aut sordidos, aut aliquid accipientes, vel ædibus exportantes videat, minimè est accommodatum; morbum enim indicat.

Per somnum, si quis solitos cibos, aut potus sibi edere videatur, alimenti inopiam, animique abjectionem indicat.

Fluviorum transitus, hostes armati, monstra difformia, morbum, aut furorem præsignunt.

## De Alimento.

Περὶ τροφῆς.

**I**N alimentorum genere, id quod alit, alimentum est, quod alimento est proximum, & quod alimentum est futurum.

Confluxio una, conspiratio una, consentientia omnia.

Venarum origo tanquam radix, hepar est, & arteriarum cor. Ex his per omnia Sanguis & Spiritus pervagatur, calorque per hæc permeat.

Me-

Medulla ossis alimentum , ideò callo firmatur.

Facultas omnia auget, & alit, ac propagat.

## De Ratione Viçtus in Morbis acutis.

*Περὶ Ἀγνῆτος ὀξείων.*

**M**aximè cum Medicum probaverim , qui in morbis acutis longè melius cæteris se gerat. Sunt autem hi , pleuritis , peripneumonia , phrenitis , lethargus , febris ardens , & quicunque alii morbi ad hos consequuntur , quorum febres omninò continuæ interficiunt.

Eadem omnia videntur plebeis dicere Medici tum meliores , tum deteriores.

Ptisana rectè videtur omnibus frumentaceis c-duliis præferri in morbis acutis , eosque qui eam prætulerunt laudo. Nam & lentorem habet lævem , continuum & suavem , ac lubricum , mediocriter humefcentem , sitim minimè inferentem , & si quid elui indiget , probè abluentem , neque adstringit , neque malam turbationem adfert , neque in ventre intumescit , nempe inter coquendum quoad maximè fieri potuit , intumuit.

Si lateris dolore continuo , neque ad calida fomenta remittente , sputoque minimè prodeunte , verum citra concoctionem , extremè glutinoso reddito , nisi quis dolorem , vel ventre emollito , vel secta vena solverit , aut utrum horum conducere videbitur , exhibuerit , ptisanam autem ita affectis dederit , præcipites eos in mortem adducit. Has igitur ob causas , aliasque hujusmodi , qui tota utuntur ptisana 7. die , aut citius , moriuntur , alii quidem mente perculsi , alii verò ab orthopnæa stertore suffocati.

Lateris dolorem sive per exordia, sive postea in-  
cidat, fomentis calidis tentare dissolvere, absurdum  
non est. Quorum quidem optimum est, aqua ca-  
lida, in utre vel vesica, vase æneo, aut testaceo ad-  
hibita. Verum molle quippiam lateri, quo leni-  
or forus fiat, supponere oportet; utiliter admo-  
vetur sponsia mollis & magna ex aqua calida ex-  
pressa, fomentumque linteo involvendum, ut lon-  
giore tempore sufficiat & perduret. Hordeum i-  
tem & eruum, in aceto ita temperato, ut paulo  
acidius sit, quam quis bibere queat, macerata &  
servata, sacculis consuta apponere oportet; fur-  
furesque eodem modo. Ad siccum autem fomen-  
tum, sales & milium torrefactum in sacculis lane-  
is, maximè accommodantur. Quod si ad calida fo-  
menta dolor non remittat, non multo tempore  
calefacere convenit, quod id pulmonem exsiccet,  
& pus intrà thoracem colligat.

Venæ sectio non æque dolorem solvit, nisi do-  
lor ad jugulum pertingat; tunc ex interna cubiti  
vena, quam citissimè copiosum Sanguinem detra-  
here convenit, eo usque dum multo rubicundior,  
aut pro puro & rubro, lividus effluat. Utrum-  
que enim usu venit. Si verò eas, quæ sunt sub  
septo transversò, partes dolor affligat, nullamque  
ad jugulum de se significationem præbeat, alvum  
veratro nigro, aut peplio emollire oportet.

Ptisana quidem, ubi epotum est medicamen-  
tum, insuper sorbendam statim dare oportet, ne-  
que admodum minore quam consuetum est quan-  
titate. Sed rationi consentaneum est, media in  
purgatione, sorbitionem non exhibere.

Multo gravius ferunt insuetam cibi abstin-  
tiam, qui parte superiore ventris sunt biliosi. (πι-  
κρόχολοι τῆς ἀνω.)

Maximæ mutationes morbos potissimum pari-  
unt.

Non ita peritos Medicos video, ut vixium in-  
fir-



firmitates in morbis dignoscant , quæ vel ex vasorum inanitione perficiuntur , vel ob aliud quoddam irritamentum , quæque ob dolorem & morbi vehementiam , quamvis hæc cognita aut ignorata salutem aut mortem afferunt. Majus siquidem malum est , si ob dolorem , aut morbi vehementiam debilitato , quis potum , aut sorbitionem copiosorem , aut cibum exhibeat , ob vasorum inanitionem debilem esse ratus. Indecorum autem est , probroque vertitur , si quis ex vasorum inanitione ægrè habentem non agnoscat , & victus ratione opprimat.

Aceti aciditas biliosis naturis magis confert , quam Melancholicis : Amara enim dissolvuntur , & in pituitam transeunt , dum ab ipso in sublime attolluntur. Nigra verò fermentantur , in sublimem attolluntur , & multis partibus augentur : Acetum namque nigra sursum educit. Mulieribus quam viris acetum longe magis est adversum , nempe cum uterum dolore afficiat.

In morbis acutis Sanguinem detrahes , si vehemens fuerit morbus , & qui ægrotant ætate florenti fuerint , & virium robore valuerunt.

Si angina , aut aliquis aliis lateris morbus ægrum divexarit , Medicamentis quæ delinguntur repurgato ; sin verò detracto copioso Sanguine æger debiliior videatur , infusum alvi per clysterem tertio quoque die exhibebis , donec in tuto æger fuerit , & fame opus habeat.

Pulmonum & laterum inflammationibus hæc instituenda curatio. Si quidem dolor sursum ad jugulum tendat , vel ad mammam & brachium , internam brachii venam secare oportet , eâ parte qua dolor affligit , & Sanguinem detrahente pro corporis habitu , anni tempore , ætate & colore , plusque & cum majori fiducia , si dolor acutus fuerit , ad animi usque deliquium ducere , postea clystima injicere.

Allium optimè editur ei, qui se ad compotatio-  
nem comparare volet, aut jam ebrius est.

Suillæ carniū optimæ sunt, præstantissimæ ve-  
rò, quæ neque vehementer pingues, neque con-  
tra vehementer graciles, neque veteris victimæ  
ætatem assecutæ, edendæque sinè pelle & subfri-  
gidæ.

Si cui Sanguinem detrahère contert, alvum fir-  
mam reddere oportet.

Potionem hydropè laboranti ita concinnabis,  
si cantharidum trium, ablato cujusque capite,  
pedibus & alis, corpora, in tribus aquæ cyathis  
contrita, exhibueris. Ubi verò ex epoto Medi-  
camento laborarit, calida perfundatur, ex oleo  
tamen prius inunctus, jejunus bibat, edatque pa-  
ne & vinis ex oleo.

Ora venarum in ano Sanguinem fundere solita,  
(hæmorrhoidas vocant) intruso in acum quam  
crassissimo & maximo lanæ succidæ filo, deliga-  
bis. Securior enim evadit hæc curatio. Deinde  
compressas Medicamento putrefacies, neque per-  
fundes donec deciderint, unamque perpetuò re-  
linques.

## De Locis in Homine.

Περὶ τῶν τοῦ ἄνθρωπου ὁρίων.

**Q**Uicunque à venis morbus oritur, is levior est,  
quam qui à nervis, diffluit enim una cum  
humore in venis contento, neque quiescit.

Ars Medica ut citò addiscatur fieri nequit, prop-  
tereà quod in ea firma aliqua doctrina tradi non  
potest.

Qui artis Medicæ cognitionem habet, is mini-  
mum ex Fortuna pendet, sed & citra fortunam  
&

& cum fortuna, rectè eam administrabit. Firtas enim est ars tota Medica, ejusque præceptiones ex quibus constat, pulcherrimæ, fortuna minimum indigere videntur.

Si in medullam fluxio contingat, tabes occulta ac inconspicua oboritur.

Cum ambo latera dolent, peripneumonia est, cum alterum tantum pleuritis.

## SECTIO QUINTA.

Continens *Θεραπευτική.*

De Morbis, Lib. I.

*Περὶ νόσων. α.*

**Q**ui de morborum curatione, tum scitè interrogare, tum ad quæsitæ respondere volet, & commodè objecta refutare, hæc secum reputare convenit. Primum quidem ex quibus morbi omnibus hominibus oriuntur: Deinde verò, qui morbi, cum necessarias causas habent, aut longi sunt, aut breves, aut lethales, aut minimè lethales, num pars aliqua corporis mutila reddatur, nec ne. Et qui ubi exorti sunt, eventa habent dubia, aut mala, aut bona, & ex quibus in quosnam transitiones fiant, quæque Medicis, in ægrotorum curatione prosperè succedunt, & quæ ægrotantibus in morbis mala aut bona contingunt, quæque intempestivè dicuntur, aut fiunt à Medico erga ægrum, aut ab ægro erga Medicum, quæ etiam in arte exactè fiunt, aut dicuntur, & quæ in eâ recta vel non recta, &c.

Mo-



Cont.  
509.

Moritur, si quis vulneratum habet cerebrum, aut spinalem medullam, aut jecur, aut septum transversum, aut vesicam, aut venam aliquam multum Sanguinem effundentem, aut cor: Ex vulnere autem minimè mori contingit, si his partibus vulnus acceptum non fuerit, sed ab his quam longissime absit.

Hi morbi ex necessitate, cum adsunt, mortem adferunt, tabes, hydrops, mulierem utero gerentem, si pulmonis inflammatio, febris ardens, pleuritis, aut phrenitisprehendat, aut si erysipelas in utero oriatur.

Hi verò morbi dubium habent vitæ exitum, peripneumonia, febris ardens, phrenitis, pleuritis, angina, uva, hepaticus & splenicus affectus, nephritis, dysenteria, in muliere Sanguinis fluxor.

Isti verò minimè lethales, nisi quid ipsis accedat, diuturnæ in articulos fluxiones (κρίματι dictæ) melancholia, podagra, coxendicum affectus, tenesmus, quartana, tertiana, stranguria, ophthalmia, lepra, impetigo, arthritis.

Ferè in morbis & vulneribus; ubi mala malis ex causis necessariis succedunt; cum ista contingunt, in Medicum causam conferunt; neque talia ex necessitate fieri agnoscunt. Et si ad febricitantem aut vulneratum ingressus, & oblatum quam primum remedium non juvet, sed postridiè æger pejus habeat, in Medicum culpam rejiciunt, quod si prosit, id tamen non perinde laudant, cum id ei contingere oportere existimant.

Suppuratus fit, si pituita ex capite ad pulmonem destillet, ac primum quidem ut plurimum latenter defluit, rursùmque tenuem exhibet, spumumque paulo amarius solito existit, calorque tenuis adest. Temporis autem progressu, exasperatur pulmo, & intus exulceratur à pituita inhaerente ac putrescente, pondusque in pectore, &  
dolo-

dolorem acutum ante & retro exhibet, corpus vehementer incalescit, & pulmo à calore trahit ad se pituitam ex toto corpore, & maximè à capite: Caput verò calefactum ex corpore, & hanc putrescentem subcrassam expuit. Quanto enim longius tempus processerit, tanto sincerum magis pus expuit, & febres acutiores fiunt, tussisque crebra & vehemens, inædia vexat, & tandem alvus infernè turbatur. Cum eò pervenit, perit.

Cerebri sphacelissimus, seu corruptio. Si cerebrum corruptum fuerit, dolor ex capite spinam occupat, & ad cor animi deliquium procedit, & sudor est, & somni expers est, & ex naribus Sanguis fluit; sæpe etiam Sanguinem vomit; non audit, & derepentè privatur voce.

## De Morbis Liber 2.

Περὶ νόσων. β.

**Q**Uod si in cerebro venæ superevomuerint (superevomunt autem ubi bilis & pituita venas subierit) caput dolor, tenebrosa vertigo, & gravitas occupat: Dolor quidem, ex Sanguinis nimia caliditate, vertigo verò tenebrosa cum Sanguis conferta copia ad faciem processerit; gravitas autem cum Sanguis turbidior & morbosior, in capite majore sit copia, quam intrinsecus. Aures etiam sonitum percipiunt, & nihil audiunt. Et si manus, caput, aut alia corporis pars ita affecta secetur, Sanguis ater, & turbidus, ac morbosus effluit.

Si venulæ copiam Sanguinis circa cerebrum superevomuerint, & cerebrum calefecerint, febris ac dolor vehemens ad tempora, incipit, & postero-

Q

steriorem capitis partem detinet, aures tinniunt, flatibus implentur, nihil audit, æstuat, & præ dolore se ipse incontinenter jactat, hic 5to aut 6to die moritur. Cum sic habuerit, caput calefacito. Si per aures aut nares aqua proruperit, periculum effugit.

Alius morbus. Si venæ in caput superevomuerint, dolor levis (alii gravis) totum caput detinet, & ad cervicem pertingit, interdumque ad alias capitis partes transmittit, deinde ubi surrexerit, cum tenebrosa vertigo occupat, febris nonprehendit. Cum sic habuerit, derafo capite, nisi calefactoriis cessarit, à capite frontem qua capillus desinit, scindito, sectam autem diducito, ubi Sanguis defluxerit, tenuissimo sale conspergito. Postea verò quam Sanguis defluxerit, totam sectionem duplici filo involutam composito, deinde splenium cera & pice illitum, ulceri, inferiore parte imposito, lana succida apposita, deligato, & finito ad dies septem, nisi dolor detineat, qui si detineat, solvito. Aquam autem, in quâ farina hordei crassior macerata fuerit, quoad convaluerit, ei bibendam exhibeto, ptisanæ verò succum sorbendum, aquam etiam superbibendam dato.

*Lib. 1. c. 1.*  
*tabes.* Si tertiana febris detineat, si quidem post tres accessiones, quartaprehendat, medicamentum deorsum purgans propinato. Quod si medicamento tibi minimè indigere videatur, pentaphylli radices, acetabuli quantitate, in aquâ tritas bibendas dato.

Tabes dorsalis ex spinali medulla oritur, præcipue verò recentes sponfos & libidinosos corripit, febris sunt expertes, bene comedunt, & colliquantur. Quod si ita affectum perconteris, asseret sibi videri, ex superioribus partibus à capite velut formicas in spinam demitti, cumque urinam aut sterqus reddit, semen genitale copiosum & liquidum ei prodit, neque generatio fit, & inter dormien-



miendum, cum uxore dormiat nec ne, veneris ludibria patitur. Cumque alias, tum præcipue per locum arduum iter fecerit, aut cucurrerit, anhelosus & imbecillis evadit. Caput gravatur & aures sonant. Hic temporis progressu vehementibus febribus correptus, perit ex lipyria febre. Purgato sursum & deorsum corpore, lac bubulum per quadraginta dies bibendum exhibeto.

Hydrops pulmonis. Si hydrops in pulmone fiat, febris & tussis tenet, & acervatim respirat, & pedes tument, & ungues contrahuntur, & patitur talia, qualia is qui suppuratus est, sed debilius ac diuturnius. Et si quid infundas, aut fomentum, aut suffitum adhibeas, pus non sequitur, atque ex hoc sanè cognoveris, non pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore, aure ad latera adhibita, audire tentaveris, ebullit intrinsecus velut acetum: Et hæc quidem aliquamdiu patitur, postea erumpit ad alvum, & statim sanus esse sibi videtur, ac à morbo liberatus. Verum progressu temporis alvus incenditur, eademque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt ventre, scroto, ac facie.

## De Morbis, Lib. 3.

Περὶ νόσων. γ.

**O**riuntur volvuli ex incalescente ventre superiore, inferiore verò refrigerato. Resiccatur enim intestinum & constipatur ex inflammatione, ita ut neque flatum, neque alimenta transmittat, sed venter durus sit, & vomat interdum, imprimis quidem pituitosa, deinde verò biliosa, tandem etiam stercus, sitis & dolor maximè cir-

ca præcordia detinet, totus etiam venter dolet & inflatur, sese jactat, febres invadunt. His ea curatio instituenda est. Venter superior quam citissime purgandus, Sanguis ex capite & cubitis detrahendus, ut alvus superior calefcere desinat. Partes suprâ septum transversum, excepto corde, refrigerandæ. Inferiores autem partes, homine in aquæ calidæ folio collocato, & oleo semper illito, calefaciendæ, & calefacientia humida admovenda. Collyrium ex solo melle decem digitorum longitudinis, summa ejus parte felle taurino illitum, bis aut ter subjiciendum, ut exusta omnia circa rectum intestinum stercora educas. Quod si sic successerit, postea infusum per clysterem injiciendum. Sin minus, folle fabrili indito, in ventrem flatus immittendus, ut tum ventrem, tum intestinum contractum distendas. Deinde extracto folle, infusum per clysterem injiciendum.

Peripneumonia talia facit. Febris acuta tenet, spiritum frequentem ac calidum respirat, anxietas adest, & impotentia, & jactatio, dolor sub scapulis, & ad claviculam & mammam, & in pectore gravitas, quandoque etiam delirium. Quidam dolorem non sentiunt, donec tussire inceperint. Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo est. Salivam tenuem ac spumosam primum spuit. Lingua flava est, verum progressu temporis nigrescit. Si in principio nigrescat, citius morbus finitur: Sin posterius, tardius. Tandem verò etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas, inkæret: Hæc patitur homo minimum diebus 14. ad summum uno & viginti: Et per hoc tempus tussit vehementer, simulque cum tussi, primum quidem copiosum & spumosum sputum expuit, 7. verò & 8. die, cum febris invigore fuerit, humidaque peripneumonia sit, crassius

sius procedit, sin minus, non. nono & decimo aliquantum cum virore pallescens & subcruentum. Duodecimo ad 14. usque copiosum & purulentum. Atque hæc fiunt, quibus naturæ & corporis affectiones humidæ sunt, & morbus vehementior est. At quibus natura, & morbi conditio sicca est, hi minus conflictantur. Si quidem igitur decimo quarto die resiccatus fuerit, neque purulentum amplius tussi rejecerit, sanus est. Sin minus, ad decimum octavum, aut vigesimum primum diem animadvertet, & si tunc sputum illud quieverit, evadit. Sin minus, an dulcius sputum fuerit interroga, quod si affirmaverit, pulmonem purulentum esse scito, morbumque annum fore, si non quadraginta diebus pus sursum eduxerit. At si ingratum sputum esse dixerit, hic morbi status lethalis est. Verum primis potissimum diebus istud in his est conspicuum. Si igitur de his affectibus, aliquid absuerit, nosse oportet, quænam ægro sint necessaria, & quænam Medico aggredienda sint. Quod si pauca ex his signis habeat, non est quod decipiatur, cum hæc pulmonis inflammatio levis sit, & minimè lethalis.

Cum pleuritis corripit, hæc contingunt, dolor latus occupat, febris & horror detinet, crebrâ est spiratio, spiritus non nisi erectâ cervice trahitur, subbiliosa, colore mali punici putamen referentia, per tussim rejicit, nisi quid intus ruptum fuerit. Quod si sic, etiam Sanguinem post ruptiones. Cruenta pleuritis est, in qua subcruenta expuit. Biliosa quidem mitior est, nisi ægro ruptum quid intus fuerit, alioqui gravior quidem, sed non adeo lethalis. Cruenta autem vehemens, & gravis, & lethalis.

Si pleuritis in empyema transeat, & ad latera sui significationem exhibeat, secato aut inuito.



At si neque pus expuatur , neque de se in costis significationem præbeat , jejunum , post copiosæ calidæ balneum , & minimè potum , in sella firma collocato , cunque alter eum ex humeris apprehenderit , tum ipse eum concutito , aurem costis admovens , ut noscas quânam ex parte , sui significationem præbeat. Votum autem est , ut id ad sinistra magis contingat , quod inustio aut sectio in dextris mortem magis afferat. Quo enim dextra valentiora sunt , eo in ipsis vehementiores morbi apparere solent. Quod si propter crassitudinem , humor non fluctuet , neque strepitus edatur in pectore , crebrum autem spiritum trahat , pedes intumescant , & tussicula quædam vexet , ne decipiaris videto , sed scito thoracem pure plenum esse. Linteo itaque tenui , in rubrica liquida admodum trita & tepida , intincto , thoracem in orbem obtegito , quâque parte primum resiccatum fuerit , eâ sectionem aut ustionem facere oportet , ut quam proximè ad septum transversum accedas , ea tamen adhibita cautione ne ipsum attingas. Multi autem simul illinunt , ne partes quæ primum illinuntur , resiccentur. Post sectionem aut ustionem , penicillo ex lino crudo utere , & paulatim pus emittito.

## De Morbis. Liber 4.

Περὶ νόσων τῶ τέταρτον.

**H**Abet tam mulier , tum vir in corpore quatuor humidi formas , ex quibus morbi oriuntur. Hæ verò sunt , pituita , Sanguis , bilis & aqua.

Sanguinis fons est cor , pituitæ caput , aquæ lien , bilis locus in jecore.

Caput velut cucurbitula corpori incumbens , ex ventriculo pituitam attrahit.

Caput & lien morbis maximè sunt obnoxia.

Lumbricos latos, in puero dum adhuc in utero est, gigni assero; neque enim ubi semel uterum egressus est, tanto tempore stercus in alvo manet, ut ex eo putrefacto & diutius permanente, tantæ magnitudinis animal in ea concreescere possit. Qui enim sanus futurus est, histernum stercus semper quotidie per alvum demittit.

Qui latum lumbricum habet, is quale quid cucumeris semen, subinde cum stercore per alvum egerit, idque lumbrici partum esse quidam affirmant; sed malè, non enim ab uno animali tot pulli nasci possunt. Lumbricus hic non parit, sed circum circa abrumpitur.

Calculus in vesica quinque habet signa, cum urinam reddere vult, dolore affligitur, & urina paulatim, velut urinæ stillicidio laborantibus, effluit, interdumque subcruenta est, utpote vesica à calculo exulcerata, & vesica inflammatione vexatur. Verum id non apparet, indicio tamen est summa præputii pars, interdum arenosa per urinam reddit, interdum verò duos aut plures calculos.

## De Affectionibus.

*Περὶ πλῆθους.*

**M**Orbi omnes hominibus ex bile & pituita oriuntur.

In dentium doloribus, si quidem dens erosus fuerit & mobilis, eximendus. Quod si neque erosus fuerit, neque moyceatur, sed dolorem inferat,

rat, uisione reficendus. Profunt etiam quæ com-  
manducantur.

*Lib. 2 de  
Morb.*

Si polypus in naso innascatur, eximitur laqueo  
ad os pertractus.

Morbus lateralis, pulmonum inflammatio, fe-  
bris ardens & phrenitis, hi quidem acuti vocan-  
tur, & sunt maximè quidem, & vehementissimi  
hieme. Oriuntur etiam æstate, sed minus & le-  
viores.

Pleuritis est, cum febris detinet, lateris dolor,  
spiratio difficilis & tussis. Sputum per initia qui-  
dem aliquantum biliosum expuit, ubi verò stum  
& stum diem attigerit, etiam aliquantum puru-  
lentum.

In phrenitide, confert caput multa calida lava-  
re.

Ex omnibus fere morbis, acuti præcipue, &  
interficiunt, & maximos labores excitant; iique  
plurimâ observatione, & accuratissimâ curatione in-  
digent; neque ab eo qui curat, malum aliquod in-  
ferri debet, satis enim sunt quæ à morbis adsunt;  
verum ut boni aliquid præstet, pro viribus curan-  
dum est. Quod si cum probè quidem curet Me-  
dicus, morbi magnitudine superetur æger, hæc  
Medici culpa non est.

In doloribus qui infra umbilicum contingunt,  
alvus molli infuso est abluenda, quod si non se-  
dentur, medicamentum deorsum purgans exhi-  
bendum.

Si quartanaprehenderit, si quidem impurgatus  
fuerit, primum quidem caput purgandum, & tri-  
bus aut 4. interjectis diebus, sub ipsam accessionem  
medicamentum sursum purgans exhibendum, rur-  
sus aliquo intervallo interjecto, aliud medica-  
mentum deorsum purgans in ipsâ accessione dan-  
dum.

Qui magnum habent lienem, & biliosi sunt,  
malè colorati evadunt, prava ulcera contrahunt,



os graviter olet, graciles sunt, lien durus est, semperque æqualis magnitudinis, neque ciborum reliquiæ per alvum demittuntur.

In morbis ubi alter alteri succedit, is plerumque interficit; corpus enim ex præsentī morbo imbecillum redditum, si alter morbus accesserit, ex imbecillitate prius perit, quam alter qui posterior accessit morbus desinat.

Coxendicum morbus quum fit, dolor corripit coxæ juncturam & summas nates: Tandem etiam per totum crus dolor vagatur. Huic confert molire, in quâcunque tandem cruris parte dolor hæserit, per balnea & repectoria, ac fomenta; & alvum subducere. Ubi verò quieverit dolor, pharmacum dandum est infra purgans, & postea bibat lac asininum coctum. Si verò in unum aliquem locum incubuerit dolor, & constiterit, & medicamentis non fuerit exactus, urito quocunque loco fuerit dolor; urito autem lino crudo.

Pedum dolor, his omnibus qui circa articulos contingunt, violentior quidem existit, & maximè diuturnus, quique ægerrimè solvitur.

Cum verò ad ægrotum perveneris, quænam patiatur, & quænam ex causâ interrogandum, & ex quot jam diebus, an etiam venter demittat, ac quænam victus ratione utatur.

Eos qui vulnera acceperunt fame conficito, & quæ insunt ex alvo per iussum subducito.

Pinguia inflammatis minimè conferunt, neque sordidis, neque putrescentibus. Verum ad inflammata frigida conferunt, ad sordida verò & putrescentia, acria & quæ morsum quendam excitando purgant. Cum verò carnem generare voles, pingua & calida magis conferunt. Ab his enim caro succrescit. Cum cibos aut potiones addere vel detrahere cœperis, paulatim, & additiones & detractiones faciendæ.

Singula edulia quæ juvent & noceant habent.  
 Cibi, qui aut flatum, aut odorem, aut morsum,  
 aut repletionem excitant, aut tormina, ab hu-  
 jusmodi liberat vinum merum superbibitum.

---

## De Internis Affectionibus.

Περὶ τῆς ἐντὸς παθούσης.

**Q**ui phthisi laborat hæc patitur. Febris lenta initio invadit, & rigor & pectoris ac dorsi dolor, interdum verò vehemens tussis urget, & sputum copiosum, liquidum & salsum expuit. Et hæc quidem per morbi exordia contingunt: In progressu verò totum corpus extenuatur, exceptis cruribus, hæc autem intumescunt, & pedes unguesque contrahuntur, ab humeris extenuatur & debilitatur, fauces sono implentur, & velut per arundinem sibilum reddunt, sitis vehemens per totum morbum vexat, & movendi impotentia multa corpus occupat. Hic ubi ad hunc habuerit modum, intrà annum malâ tabe perit.

Hydrops pectoris gignitur, ubi tubercula in pulmone exorta fuerint. Et aquâ repleta in pectus eruperint: Hydropem quandoque oriri ita mihi argumento sunt Boves, Oves & Sues; in his enim fere quadrupedibus, pulmonis tubercula oriuntur, quæ aquam continent, sectione namque facta, citissimè cognoveris, effluet enim aqua. Talia autem, multo magis etiam in homine, quam pecoribus fieri videntur, quanto morbosâ magis victus ratione utimur. Plerique verò exortis tuberculis purulenti etiam extiterunt. Hæc igitur per morbi initia (iis) contingunt. Tussis sicca, & fauces stridulam quandam asperitatem habere videntur,

ri-

rigor & febris, erectæque cervicis respiratio (ὀρε-  
 λοπρσιη) contingit, corpus & pedes intumescunt,  
 ungues contrahuntur, interdum ad latus intumescit, & quâ parte secandum sit, indicat. Quod si non indicet, multa calida lotum, humeris comprehensum concutito, deinde quonam latere magis fluctuet, auscultato. Quod cum intellexeris, tertiam ab ultima costam, ad os usque secato, deinde terebra (τερυπείων) acuta ulterius perforato, cumque perforata fuerit, paucam aquam educto, qua educta, penicillum ex lino crudo in vulnus immittito, & mollem spongiam superappo-  
 nito, deinde ne penicillus decidat, deligato. Per 12. autem dies, semel die aqua educenda: Post 12. verò diem, 13. die, tota aqua educenda. Et de cætero, si fuscitetur aqua emittenda, venterque cibis siccis resiccandus.

Lienis morbus quidam. Venter inflatur, postea verò lien intumescit, durus est, eique dolores acuti contingunt; color autem immutatur & niger cernitur, pallidus, & qui malicorium forma referat, ex aure & gingivis, gravis odor exhalat, exque à dentibus discessionem faciunt, & in tibiis ulcera, qualia pustulæ nocturnæ erumpunt, membra extenuantur, neque stercus per alvum demittitur.

Convolutus Sanguineus (ἐλκιδος αἱματίτης.) Ex ore malus odor expirat, à dentibus gingivæ abscedunt, & ex naribus Sanguis effluit, interdum verò ex cruribus ulcera erumpunt, & hæc quidem sanescunt, alia verò exoriuntur, color niger est, cutis tenuis, ad deambulationem & exercitationem (non) alacriter se habet.



## De Natura Muliebri.

Περὶ γυναικείας φύσεως.

**S**I ex partu minimè purgata fuerit, venter & crura intumescunt, rigor & dolor imum ventrem & lumbos occupat. Quandoque etiam ad viscera progreditur, & animo deficit. His per morbi exordia afficitur, procedente verò tempore, cavae faciei partes multum rubescunt. Cum ita habuerit, post fomentum uteris admotum, cyclaminum in subditiōe apponito.

Cum fluor albus subortus fuerit, urina qualis asini apparet, & dolor imum ventrem, lumbos ac laterum inanitates ( *κεναιότητες* ) detinet, crura ac manus intumescunt, oculorum cava elevantur; & oculi humescunt, color auriginosus & albus redditur, cumque deambulat, anhelatione corripitur. In uteri strangulatu, graveolentia omnia in suffitu naribus adhibenda, bitumen scilicet, sulphur, cornu, lucernæ funiculus, vituli marini adeps, castoreum, pudendis verò odorata.

Cum mulieri uteri duri evadunt, & ad pudenda prominent, inguinaque indurantur, & ardor in pudendis inest, canceri initia suspecta sunt.

Olivas albas priùsq̃am oleum insit in tenues partes dissectas siccato, deinde tufas & cribratas in vinum injectas, bibendas exhibeto. Hoc & menses detrahit, & secundas ejicit. Dictamnium creticum oboli pondere, ex aquâ potui exhibeto. Quo epoto, si secundas ejicere non potes, sambuci succum coctum pro fotu injicito, & cantharidem subter apponito. Hoc etiam fœtum expellit.

Si uteri ad cor irruentes strangulârint, viticis & prœonix semen ex vino bibendum dato.

Si

Si cum jam movetur fœtus, corrumpatur & suffocetur, venter imus intumescit, & ad contactum velut ex ulcere dolet, febris, & dentium fremitus eamprehendit, dolorque gravis & vehemens, ipsa pudenda, imum ventrem, coxendices, laterum inanitates & lumbos detinet.

## De Morbis Mulierum. Liber I.

Περὶ Γυναικίων πρώτον.

**M**ulier quæ nunquam peperit, majore cum molestiâ & celerius afficitur, ex mensibus profluentibus, quam quæ partum experta est. Ubi enim peperit, venulæ ei ad mensium descensum insunt ampliores.

Mulierem rariore & molliore carne esse quam virum censeo.

Si intra trimestre spatium mulieri menses non prodeant, in suffocationem subinde incidet, febrisque ac horror, & lumborum dolor sæpè invadet. Intrâ verò quadrimestre spatium, nisi progressi menses prioribus viam fecerint, etiam tunc trimestres omnes afflictiones eam magis affligent, maximèque quo tempore menses decurrere consueverunt, postea minus. Plerumque verò doloris expertus videtur. Erunt autem in quartis mensibus etiam hæc signa, urinam copiosam & crassam subinde reddet, ei venter indurescet, majorque erit quam antea, dentium stridor aderit, ciborum fastidium, & insomnia. Si verò curetur, etiam in his sana evadit. Intra quintum mensem, nisi ei copiosi menses descenderint, dolor adhuc fortior accidit. Sexto verò mense, jam incurabilis erit, & juxta quidem priora signa magis affligetur. Deinde ad ea etiam hæc aderunt, anxia erit,

& subinde seipsam jactabit, & animo deficiet, & pituitam vomet, & vehemens sitis eam corripit, incenso nimirum ventre, ab uteris Sanguine redundantibus, & ad contactum, maximèque circa pubem, dolebit, subindeque acute febricitabit, uteri frequenter murmur edent, neque pro more venter dejiciet, neque vesica urinam percolabit, spinæ & totius dorfi dolore vexabitur: Nonnullis etiam lingua frænatur, vox deficit, animi deliquium adest, stomachus mordetur, urina mingitur rubra, dolet universum corpus, potissimum cervix, spina, lumbi, & inguina. Cumque eo devenerit, tum venter attollitur, tunc crura, & tibiæ, ac pedes, plus æquo intumescunt, & mors instat.

Mulieribus nonnullis, cum copiosi menses duorum mensium spatio in uteris extiterint, ubi intercepti fuerint, ad pulmonem feruntur, eademque omnia his contingunt, quæ in tabe dicta sunt, neque inde superesse possunt.

Infæcunda erit mulier etiam si meliuscule habeat, si magna in uteris orta ulcera fuerint, quamvis curentur, propter cicatrices.

Prodeunt menses crassiores & copiosiores in intermediis diebus, pauciores verò & tenuiores cum incipiunt vel desinunt.

In omni autem muliere si sana sit, euntes menses moderatâ quantitate prodeunt ad duarum Atticarum heminarum mensuram, aut paulo plures aut pauciores, idque ad biduum vel triduum. Longius, autem tempus, aut brevius, morbum aut sterilitatem portendit.

[Hemina attica continet uncias IX.]

Quod si quæ à viro emittuntur non sint ei manifesta, cruribus distentis & alternatim positis quiescat.

Concipiendi facultatem habet ea, quæ neque humiditate redundat, neque etiam exarescit, nisi horum aliquid ex priscâ naturâ insit. Ad



Ad virum autem eam accedere oportet , curatione receptâ , desinentibus aut incipientibus mensibus , præstiterit tamen ubi desierint.

Sunt quæ si acre quiddam , aut amarum præter consuetudinem ederint , aut biberint , fætus perdunt , cum adhuc tenellus puellus intus existat.

Ubi uterum gestat mulier tota pallida redditur , quoniam qui in ea purus est Sanguis , semper quotidie è corpore aliquantulum stillat , & ad fætum fertur , eique in alimentum cedit.

In omnibus morbis , in quibus fœtus conducit , præstiterit post fœtum , pingui aliquo perungi.

Si lac deficiat , porra trita & aqua macerata , potui exhibeto , calidâ lavet , & in cibo , porra & brassicam comedat , quin & fœniculi , necnon radicis illius decoctum propinato , & hordeum decortica- *Lib. de natura Mulier.*

Molæ conceptus hæc est causa , ubi copiosi menses extiterint & paucum ac morbosum semen conceperint , & minimè genuinus conceptus gignitur , & venter tanquam utero gerentis impletur : Nihil autem in ventre movetur , neque lac in mammis innascitur , pectus verò turgescit. Hæc igitur biennium sæpe etiam triennium sic affecta est. Et si quidem una caro nascatur mulier perit , neque enim superesse potest. Sin verò multæ , copiosus ei Sanguis , & carnosus per pudendum erumpit , quod si id moderatè fiat , servatur , alioqui profluvio correpta perit. *Lib. de æpogon.*

Quod si prægnans diutius immoretur , & parere non possit , sed pluribus diebus partus doloribus discrucietur , sit autem juvenis & ætate florens , multoque Sauguine redundet , venas in mal- leolis secare oportet , & virium habitâ ratione Sanguinem detrahare.

Ad

Ad factum excludendum , mulierem ex axillis  
comprehensam vehementer concutito.

## De iis quæ uterum non gerunt.

Περὶ ἀφορέων.

**S**I uterorum os à pudendo aversum fuerit , non  
concipiunt.

Si uteri lubrici fuerint ( id quibusdam naturâ  
contingit , & si innata ulcera magnas cicatrices in-  
tus reliquerint ) mulier utero non concipit , fe-  
men enim foras elabi sinunt.

Si nosse velis an mulier conceptui sit idonea ,  
butyrum , & lac mulieris puerum lactantis , potui  
exhibeto , & si eructaverit concipiet , sin minus ,  
minimè.

Allium caput unicum habens , capite depurga-  
to & derafo , in uterum subdito , & postridiè spe-  
ctato , num odor ad os perveniat , quod si sic , con-  
cipiet , sin minus minimè.

Si mulier nosse velit , an conceptura sit , ani-  
sum ex aquâ quam tenuissimè tritum bibat , & dor-  
miam , quod si quidem pruritus circa umbili-  
cum eam corripiat , concipiet , sin minus , mini-  
mè.

Quæ utero gerentes maculam in facie velut ex  
solis adustione ( ἰφην vocant ) habent , eæ fe-  
mellam gestant. Quæ verò benè coloratæ perma-  
nent , marem plerumque.

Si papillæ sursum conversæ fuerint , marem ge-  
stant , si deorsum fæminam.

Latæ fæminas , parvæ verò & conclusæ mares  
procreare videntur.

Ad conceptum summè faciens. Melanthium  
( ni-

(nigellam) mulieri ex vino rubro acerbo exhibeto.

Mulierem juvenulam fluor muliebris ruber infestabat, & medicamento sumpto, capite purgato, vena secta, nihil proficiebat. Hæc autem ei causa esse videbatur ne conciperet: Ei autem radicum aspalathi decoctum, ex vino albo mane & ante cœnam exhibebam, fluorque cessavit, & non longe postea concepit & marem peperit.

## SECTIO SEXTA.

Continens *Τα χειρουργικά.*

### De Officina Medici.

*Κατ' ἰστέον.*

**P** Rincipio quænam similiter, aut dissimiliter se habeant videndum, idque ex his quæ maximi sunt momenti, aut facillimè cognoscuntur, aut quâvis viâ & ratione comprehenduntur: Quæ & visione, & tactu, & auditione percipiuntur; quæque in visionis, auditionis, tactus, narium, linguæ & intelligentiæ sensum cadunt, ex quibus omnis nostra cognitio constat.

[In sequentibus omnia percurrit *Hippocrates* à quibus, per quæ, quibuscum, & circa quæ, Chirurgia exerceatur. Communia etiam tradit præcepta de recta deligandi ratione.]

Frictio vim habet solvendi, vinciendi, carnem augendi, minuendi. Dura quidem vinciendi, mollis solvendi, multa minuendi, mediocris implendi.



## De Fracturis.

Περὶ Ἀγμῶν.

**T**Riginta ad summum diebus, cubiti ossa in totum coalescunt. Nihil tamen est perpetuum. Nam natura à naturâ, & ætas ab ætate plurimum distat.

Pauciore victu ad decimum usque diem utendum, præsertim cum ex toto quiescant, ac obsonia liquida exhibenda, quæ ventrem modicè deducant. Vino verò & carnibus abstinendum. Post hæc paulatim reficiendi.

Firmatur autem brachii os, diebus ferè quadraginta. Quos ubi exceßerit, resolvendum, minusque adstrictis fasciis, ac paucioribus vinciendum.

Machinas admoveere ubi res non exigit absurdum est.

Septimo, aut nono, aut undecimo die, in fracturis ferulæ sunt admovendæ.

Canales, qui cruribus fractis supponuntur, subijci debeant, nec ne, ambigendum mihi videtur. Profunt etenim, non tamen quantum existimant, qui eos supponunt. Nam neque in quiete, ut putant, crus continent, neque dum reliquum corpus in hanc vel illam partem convertitur, canales prohibent quominus crus sequatur, nisi homo ipse diligenter advertat. Quin etiam durum videtur & asperum lignum subijci, nisi simul molle aliquid in ipsum imponatur. Maximè tamen est usui, cum stratum substernitur, ac dum ad descendendum æger progreditur. Potest igitur cum canali (vel glossocomo) & sine eo, benè vel malè res confici.

Ti-

Tibiæ ossa. quadraginta diebus, si rectè curentur, firmantur. Femur verò quinquaginta diebus firmatur.

Imprimis confert nosse, quâ ratione fasciæ initium injiciendum sit, & quâ parte maximè comprimendum, quantum item conferat, si quis fasciæ initium rectè circumdet, & quâ parte maximè convenit, comprimat; tum quantum detrimenti sequatur, si neque quis probè fasciæ initium circumjiciat, neque quâ maximè parte convenit, sed hinc & inde comprimat.

Turpe est, & ab arte abhorrens, aliquid molientem in ipso artificio deficere.

Ex omnibus machinamentis, quæ convenienter ad usum homines comminiscuntur, violentissima hæc tria existunt, aselli circumactio, per vectem molitio, & cunei adaectio. Negligenda non est per vectes molitio. Hâc siquidem ratione aut nullâ aliâ, ossa in suas sedes reconduntur.

Reposito osse, multo magis excitabitur nervorum distentio, quam non reposito, quod probè nosse convenit. Etenim si reposito osse, nervorum distentio supervenit, in angusto spes est. Præstatque, si id finè molestiâ fieri possit, os retro compellere. Neque enim his, quæ plus justo laxiora sunt, nervorum distentiones accedunt, sed his quæ magis intenduntur.

Nullus articulus, ac minimè omnium cubitus, dum febris adest, in suam sedem compellendus est.

## De Articulis.

Περὶ Ἀρθρῶν.

**H**umeri articulum, uno modo, in aliam videlicet, excidere vidi, nunquam autem in su-

periolem aut exteriorem partem. Non tamen excidat, nec ne contenderim; licet de eo aliquid dicere possim. Verum neque in priorem partem unquam vidi, nec excidere posse existimo.

Humerus calce reponitur, in alæ cavum prius immittendo rotundum aliquid, velut parva pila & dura. Nisi enim tale quid indatur, ad brachii caput calx pervenire nequit. Est & alius restituendi modus, cum in erecti & stantis humerum, æger manu apprehensus sustollitur. Alius repositionis modus per transversum in scala lignum rectè obitur. Pistillo quinetiam, quidam humerum in suam sedem compellunt. Sed omnium optimus reponendi modus, est per machinam *ἀμβλῖ* dictam.

Multarum rerum experientiam Medicum habere oportet, ac certè etiam frictionis. Ex eodem enim nomine, non idem evenire consuevit: Nam & justo laxiorem articulum frictio vincire, & justo duriorem solvere potest.

Non satis est artem tantum ratione nosse, sed & in usum exercitatione traducenda est.

Manus articuli si intrò luxentur, digiti inflecti, si extra, intendi nequeunt. Ut restituantur, collocentur digiti super scamnum, & in diversas partes distendantur: Quod extat ex osse, vel prominentiori palmæ parte, aut calce, simul repellatur, & in anteriorem & inferiorem partem urgeatur: Ab inferiore verò parte, juxta os alterum, molle aliquid in tumorem sublatum, si superiore quidem parte extat, manui conversæ, sin inferiore, supinæ est supponendum. Curatio linteis perficitur.

Digitus articulus ubi exciderit, facîle quidem videtur. Restituitur verò in directum contendendo, & quod eminet propellendo, contrarium autem in alteram partem impellendo. Curatio fasciis fit & linteis.

Optima medicina interdum est, medicinam non facere.

Tur-



Turpe est cum in omni arte, tum verò in arte medendi, vel maximè post multum exhibitum negotium, multum apparatus, multam de se excitare opinionem, tandemque nihil opis adferre.

Femoris articulus ubi coxendice excidit, quatuor in partes promovetur, in interiorem quidem sæpissimè, deinde in exteriorem, interdum verò in posteriorem, & anteriorem sed rarò.

Quibus interiorem in partem excessit, iis crus alteri collatum, longius duabus de causis merito apparet. Ossi enim quod à coxendice procedit, & ad superiorem pectinis partem fertur, femoris caput insidet, & articuli cervix in acetabulo fertur; rursus exteriore parte nates excavatur: Summa item femoris pars ad genu, & tibia similiter, ac pes in exteriorem partem ferri coguntur.

Qui ad perfectum incrementum nondum devenire, iis si prolapsus articulus non reconditur, femur, tibia, & pes breviora evadunt. Neque enim iis ossa æque in longum augentur, verum breviora fiunt, ac præcipue femur.

Ferunt nonnulli, Amazonas masculam suam prolem statim ab infantia, partim ad genua, partim ad coxendices, luxare consuevisse, quo videlicet claudi fierent, ne mares fœminis insidias tenderent, & ut iis ad manuaras operas uterentur.

At quibus in exteriorem partem femoris caput excessit, iis crus juxta alterum extensum, meritò quidem brevius apparet. Exteriore autem parte, nates in gibbum magis extumescit. Extrema verò femoris pars ad genu, & tibia, & pes introrsum spectare conspiciuntur. Quibus jam adultis luxatus articulus reconditus non fuerit, iis crus totum brevius conspicitur, neque ingressu terram calce contingere possunt.

Prædictiones laude dignæ ex eo existunt, quod dignoscimus quonam, & quânam ratione, aut quando, res quæque exitum habitura sit, sive eotendat ut curationem recipiat, sive curationis spem adimat.

Quibus tibiz ossa luxata, accedente vulnere, commissura, quæ est ad pedem penitus eminent, ea sive intro, sive extra vergant, minimè reponenda sunt, sed sinenda. Id enim manifestò nosse oportet, eos, quibus ista reposita permanserint, interituros, paucisque diebus duraturos. Convulsione namque sublatis pauci diem septimum superant. Sed & pes & tibia ad gangrænam deveniunt, eaque sic affore certo nosse convenit. Quod si neque reposita, neque ab initio tentata fuerint, eorum plerique supersunt.

Eadem quoque ratio est, ubi cubiti ossa ad manus articulum, facto vulnere, vel interiorem in partem vel exteriorem emineant. Certo enim tenendum est, cum cui recondita ossa permanserint, supraposito mortis genere, intra paucos dies interiturum. Eadem ratio est in reliquis articulis si cum vulnere luxentur. Ea omnia si reconduntur, mortem, non reposita spem salutis afferunt. At iis qui evadunt claudicatio adest.

## De Capitis Vulneribus.

Περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραυματῶν.

**T**Otius capitis os id tenuissimum, & maximè imbecillum quod ad sinciput est, idque quam minimam & tenuissimam carnem hâc capitis parte in se habet, cerebrumque plurimum eo loco subest. Cumque hæc ita se habeant, ab ictu, os hâc capitis parte magis colliditur, frangitur & me-

medium defidit , sub eoque casu , magis moriuntur ægri , ægriusque curantur , & mortem evitant , quam si quâlibet aliâ capitis parte istud accidat.

Ex vulnere capitis , quâcunque parte acceptum sit , ubi alioqui ex vulnere quis fuerit periturus , hieme quam æstate diutius vivit.

Fracturarum ossium capitis quinque sunt genera. ρωγμή & ρήξις , rima seu fissura , φλάσις & θλάσις , contusio seu collisio , ἑσφλασις seu ἐνθλασις depressio , ἑδρη , sedes , & ζυμφορά , infortunium.

Capitis ulcus nulla re madefaciendum , ac ne vino quidem , aut quam minimum.

In capitis sectione , cæteræ quidem capitis partes tuto secari possunt , tempus verò secari non debet ; nervorum enim distentione prehenditur qui sectus est. At si sinistra tempora secta fuerint , dextra convulsio prehendit. Sin ad dextra sectio fuerit , sinistra convelluntur.

Postquam os scalpro eraseris , si quidem ossis vulnus ad sectionem tendere videatur , intrâ triiduum ad sectionem veniendum , neque id spatium citra sectionem superandum , idque præcipue si calida anni tempestas fuerit.

Ubi quis ex capitis vulneribus periturus est , neque ullâ ratione servari potest ; his signis hoc dignoscere potest. Convulsio plerosque invadit in aliâ corporis parte , si in dextrâ parte fuerit vulnus , sinistra convellitur , & è contra , ante decimum quartum diem hieme plerumque febris invadet , æstate verò post septimum. Quod ubi contigerit , ulcus coloris expers evadit , ex eoque sanies parva effluit , & quod in eo inflammatum est , emoritur , glutinosumque fit , ac salsamentum refert , colore fulvum & aliquantulum lividum , tuncque os corruptione vitiari incipit , & nigrescit , læve existens , ad extremum autem subpallidum &



& albicans evadit. Cum verò jam purulentum extiterit, pustulæ in linguâ exoriuntur, & cum delirio mors contingit.

Inter secandum capitis os, ubi parum abest ut totum os sectum sit, jamque os labat, ab ipsâ sectione desistendum, permittendumque ut os sponte suâ discedat; secto enim ossi & inter secandum relicto, mali nihil contingere potest. Inter secandum etiam terebra sæpius, ne os incalecat, auferenda, & in aquam frigidam demergenda.

## SECTIO SEPTIMA.

Continens. Τὰ ἐπίμικτα.

Liber Primus.

De Morbis Epidemicis.

Ἐπιδημιῶν τὸ πρῶτον.

### Sectio Secunda.

**C**oncoctiones celeritatem judicationis, & securitatem salubrem (certam salubritatem) significant.

Præterita discito, præsentia cognoscito, prædicto futura; hæc meditor.

Duo circa morbos elaboranda sunt, ut prosis, aut non noceas.

Ars ex tribus constat, morbo, ægroto, Medico artis ministro; adversari morbo ægrotum cum Medico oportet.

Sectio

## Sectio Tertia.

**Q**uibusdam icterus sexto die accidit, sed hos aut per urinam purgatio, aut alvus turbata juvabat, aut larga Sanguinis è naribus profusio. Sect. 2.

Cum febres ardentes inciperent, significabant quibus lethalia impenderent: Statim enim incipientibus, febris acuta, parum rigeabant, insomnes, anxii, sitibundi, fastidiosi, paulum exudantes circa frontem, & claviculas, sed nullus per totum: Multum delirabant, timores, tristitiæ, extrema subfrigida, pedes extremi, præcipue autem manus: Accessiones diebus paribus; plurimis quarto die dolores maximi, & sudores plurimum subfrigidi, & extrema jam non recalescentia, sed livida, subfrigida, permanebant, neque amplius sitiebant. Adhuc his urinæ nigræ, tenues, paucae, & alvi sistebantur, neque fluebat Sanguis ex naribus ulli eorum quibus hæc accidebant, sed paucus stillavit: Nulli horum res venit ad recidivam, sed sexto die mortui sunt cum sudoribus.

In hac constitutione (quæ magna ex parte fuit frigida & sicca) ex quatuor præcipue signis servabantur: Quibusdam enim ex naribus Sanguis fluebat, aut per vesicam multa urina, multum sedimentum & bonum habens, procedebat; aut perturbata alvo, biliosa tempestivè excernebant, aut dysenterici fiebant, Multis autem contigit non ex uno superscriptorum signorum judicari, sed plurimis per omnia excurrere, & videri habere gravius. Servabantur autem omnes quibus hæc contigerunt. Fœminis autem & virginibus contigebant omnia antea scripta signa: Quibus autem

horum aliquid benè fiebat, aut muliebria largiter apparebant, per hæc servabantur, & judicabantur: Et nullam novi mortuam earum quibus horum aliquid benè fiebat. Philonis namque filia, cum liberaliter ex naribus Sanguis effluxisset, quod 7mo die intempestivè coenasset, mortem obiit.

Moriebantur plurimi ex his morbis sexto die, velut Epaminondas, Silenus & Philiscus Anagoræ filius:

Sect. 3.

Videndæ sunt quæ fiunt morborum vicissitudines, & ex quibus, in quos, succedant.

Quæ diebus paribus exacerbantur, paribus judicantur, quorum autem paroxysmi in imparibus fiunt, judicantur in imparibus.

Febrium omnium tutissima est quartana, placidissima & longissima. Non enim solum per se ipsa fatalis est, verum etiam ab aliis magnis morbis vindicat. Septimana longa est, non tamen lethalis. Nonana hæc adhuc longior, sed non lethalis. Tertianæ exacta celerem habet judicationem, neque lethalis est. Quintana omnium est pessima: Hæc enim ante tabem, aut jam contabescentibus ubi supervenerit, perimit. Semitertiana etiam præcipue lethalis.

## Ægroti Quatuordecem.

### Primus Ægrotus.

**P**hiliscum qui propè murum decumbebat, primo die febris acuta invasit, sudavit pernoctem laboriose, 2do omnia exacerbata sunt: Vespere verò post clysterem benè habuit, noctem quiete transiegit. Tertio mane & usque ad meridiem videbatur



tur esse sine febre: Ad vesp̄eram verò febris acuta invasit cum sudore & siti; exaruit lingua. Minxit nigrum. Nox laboriosa. Non dormivit. Omnino deliravit. Quarto, omnia exacerbata sunt, urinam nigram reddidit, noctem habuit minus molestam & urinas melioris coloris. Quinto, circa meridiem, parum de naribus stillavit sincerum. Urinæ variæ, habentes pendentia quædam rotunda, genitali semini similia, sparsa, non sudavit. Supposita glande, flatuosa pauca exierunt. Noctem laboriose transegit. Somni exigui, verba cum delirio. Omnia extrema frigida non amplius recalescentia; minxit nigra. Dormivit parum. Subdiem obmutuit. Sudavit frigidum. Extrema livida. Ad meridiem obiit sexto die. Huic spiritus ad finem usque velut recordanti, ( Fœsio intro revocanti & ingeminanti ) rarus & magnus fuit. Splenintumuit tumore rotundo. Sudores frigidi usque ad finem. Paroxyfmi paribus diebus.

### *Ægrotus secundus.*

**S**ilenum qui in Platamone habitabat juxta Euclidis ædes, ex laboribus, computationibus & exercitationibus intempestivis, ignis ( πυρ ) i. e. febris vehementissima præhendit. Cepit autem lumborum dolore & capitis gravitate laborare cum cervicis distentione. Ex alvo primo die, biliosa, sincera, spumosa, abundè colorata, & multa fluxebant. Urinæ nigræ, nigram hypostasim habentes. Siticulosus. Lingua arida. Noctem nihil dormivit. Secundo, febris acuta, dejectiones plures, tenuiores, spumosæ, urinæ nigræ. Noctem difficulter tulit, parum deliravit. Tertio, omnia exacerbata sunt: Hypochondrii contentio utrinque ad umbilicum promissa, submollis. Dejectiones tenues,

subnigræ, urinæ turbatæ, nigræ. Nocte nihil dormivit. Verba multa, risus, cantus, non poterat se continere. Quarto cum iisdem. Quinto, dejectiones sinceræ, biliosæ, læves, valde pingues, urinæ tenues, pellucidæ, paucae. Mente constitit. Sexto circa caput parum sudavit. Extrema frigida, livida. Magna iactatio. Nihil demisit alvus. Urinæ suppressæ sunt. Febris acuta. Septimo die sine voce. Extrema non amplius recaluerunt. Minxit nihil. Octavo, sudor frigidus emanavit e toto corpore. Exanthemata cum sudore, rubra, rotunda, parva, velut vari permanebant, nec faciebant abscessum. Ex alvo irritatione parva, stercora tenuia, velut cruda, multa reddebantur cum dolore. Mingebat cum dolore, mordacia, sincera, pauca. Recalescebat, somni levis, comatosi, obmutuit. Urinæ tenues, perspicuæ. Nono cum iisdem. Decimo potum non capiebat. Comatosus, somni autem tenues erant, & à ventre similia prodibant. Mingebat confertim crassum, subsidens. Sedimentum ( *κρίματόν* ) farinæ simile, album. Extrema rursus frigida. Undecimo obiit. A Principio huius usque ad finem, spiritus magnus & rarus, hypochondrii palpitatio perpetua; circiter vicesimum ætatis annum agebat.

### Ægrotus Tertius.

**H**erophontem corripuit febris acuta, à ventre pauca, qualia per Tenesimum solent, inter initia egerebantur. Post hæc tenuia deiecit, biliosa, copiosa. Somni non aderant. Urinæ nigræ, tenues. Quinto die mane surditas. Exacerbabantur omnia. Lien intumescerebat. Hypochondrii contentio. Ex aluo pauca nigra exibant.

Desi-

Desipuit. Sexto deliravit. Sub noctem sudor, refrigeratio, delirium permanebat. Septimo circumfrigebat. Sticulosus fuit. Desipiebat. Ad noctem rediit in mentem: dormivit. Octavo, febricitavit, lien subsidebat, intelligebat omnia. Doluit ad inguen, primumque tumor ortus est secundum rectitudinem lienis. Deinde dolores in ambas tibias deciderunt. Noctem facile tulit. Urinæ melioris coloris, subsidentiam habebant exiguam. Nono sudavit, judicatus est. Intermissit. Quinto repetiit. Statim autem splen intumuit. Febris acuta. Rursusque surditas. Post recidivam tertio splen subsedit. Surditas minor. Crura dolebant. Noctusudavit. Judicatus circa 17. neque deliravit in recidiva.

### Ægrotus Quartus.

**I**N Thaso, Philini uxorem quæ filiam pepererat, cum ex naturæ præscripto purgationes procederent, & alia leviter transgisset, decimo quarto post partum die, febris ardens cum rigore corripuit. Huic in initio oris ventriculi dolor contigit, & in hypochondrio dextro. Dolores muliebrium locorum. Purgatio cessavit. Apposito autem balano vel pessa, hæc leviora sunt facta. Capitis verò & colli & lumborum dolores permanebant. Somni non aderant, Extrema frigida, siticulosa. Venter uri videbatur. Pauca deiecit. Urinæ tenues & per initia decolores. Sexto die ad noctem deliravit multa, rursusque ad mentem rediit. Septimo siticulosa. Dejectiones biliosæ, coloratæ, Octavo riguit. Febris acuta. Convulsionες multæ cum dolore. Multum deliravit. Glande subdita ad desidendum exsurrexit, multaque deiecit cum fluxu bilis. Somni non aderant.

No-



Nono convulsiones. Decimo nonnihil sapuit. Undecimo dormivit. Omnium recordata est: Sed statim rursus deliravit. Minxit autem cum convulsionibus confertim multum & rarò ( nisi admonita ) crassum, album, quale fit in urinis subsidentibus cum perturbantur. Repositum per multum tempus non subsidebat. Color & crassities qualis in jumentis. Decimoquarto die totum corpus palpitaciones occupârunt. Verba multa Paululum mente conficit, sed confestim rursus desipuit. 17mo. obmutuit. 20. obiit.

### Ægrotus Quintus.

**E**Picratis uxorem, quæ decumbebat prope Archegetem, vicinam jam partui, rigor fortis apprehendit. Non incaluit ut ferebant; sequenti die eadem adfuerunt. Tertiò die peperit filiam, & alia omnia secundum rationem processerunt. Secundo die post partum apprehendit eam febris acuta, cordis & muliebrium locorum dolor. ( Insomnis erat ) subdito pello hæc facta sunt leviora. Capitis autem & colli & lumborum dolor invasit. A ventre pauca biliosa, tenuia, sincera reddidit. Urinæ tenues, subnigræ. Sexto verò postquam eam febris arripuit, sub noctem deliravit. Septimo omnia exacerbata sunt. Sine somno deliravit, siticulosa: Dejectiones omnes biliosæ, subrubæ. Octavo rigit; dormivit copiosius. Nono cum iisdem fuit. Decimo, crura cum labore dolebant, cordis ( oris ventriculi ) rursus dolor invasit, cum capitis gravitate, non deliravit, dormivit magis, venter restitit. Undecimo ( sudavit ) minxit urinas melioris coloris, subsidentiam habentes copiosam, melius se habuit. Decimoquarto rigit. Febris acuta. Decimo quinto

quinto, vomuit biliosa, flava, subcrebra, sudavit, sine febre fuit: Per noctem autem febris acuta; urinæ crassæ albæ habentes subsidentiam. 16. exacerbationem noctè habuit, & cum difficili tollerantia, non dormivit, deliravit. 18. Sirculosa: Lingua exaruit. Non dormivit. Deliravit multum, dolebant ei crura. Ad diem autem 20. mane parum rigit. Comatosa, quieta, dormivit, vomuit biliosa paucā & nigra, sub noctem surda facta est. Circa 21. lateris sinistri gravitas undique cum dolore infestavit: parum tussit. Urinæ autem crassitiem habentes, turbidæ, subrubræ, repositæ non subsidebant. Cetera verò levius habebat, non sine febre. Statim à principio, in faucibus dolorem & ruborem habuit, & gurgulionem revulsum, fluxio acris, mordax, falsa usque ad finem perseveravit. Circa 27 sine febre fuit. Urina habuit sedimentum. Latus non-nihil dolebat. Circa 34. febris eam corripuit. Venter biliosis turbatus est. 40. vomuit paucā biliosa. Judicata est perfectè, & à febre liberata est.

### Ægrotus Sextus.

**C**Leonaſti ſem, qui ſupra Heracleum decumbebat ( πύρ ) febris ardens corripuit incerta periodo. A principio dolor capitis & ſiniſtri lateris adfuit, cæterorumque membrorum, perinde ac ex laſſitudine, labores. Febriles exacerbationes ſubinde & ſine ordine invadebant. Sudores quidem nunc aderant, nunc minime. Maxima ex parte incidebant paroxyſmi in dies decretorios præcipue. Circa 24. frigefcebant ei (Valeſio πύρ, doluerunt) extremæ manus. Vomuit flava, bilioſa, ſatis multa, paulo poſt virulenta, qui-

quibus omnibus sublevatus est. Circa 30. diem cepit Sanguis fluere ex utrâque nare. Et hæc eraticè & paulatim ad judicationem usque. Non abhorruit a cibo, neque sitiit per totum tempus, neque somno caruit. Urinæ tenues non tamen sine colore. 40. autem minxit subrubra, sedimentum multum subrubrum habentia. Sublevatus est. Post hæc variarunt urinæ, nunc quidem sedimentum habebant, nunc non. 60. urinis sedimentum multum & album & læve adfuit. Remissa sunt omnia. Febris intermisit. Urinæ rursus tenues, sed boni coloris. 70 sine febre fuit. Intermisit dies decem. Octogesimo riguit. Febris eum arripuit acuta, sudavit multum. Urina habuit sedimentum rubrum, læve, perfecte judicatus est.

### Ægrotus Septimus.

*Æger.  
octavus.*

**E**Rasimum qui prope Bootæ torrentem habitabat febris ardens post cœnam corripuit; noctem perturbatè transegit, diem primum quietum, noctem molestam habuit. Secundo omnia exacerbata sunt, sub noctem deliravit. Tertium laboriosè transegit, deliravit multum. Quartus fuit molestissimus. Noctè autem nihil dormivit. Insomnia aderant & cogitationes. Deinde pejora & magna & periculosa, timor, difficilis tollerantia. Quintò manè recreatus est. Intelligebat omnia. Multum verò antè meridiem furiit, continere se non poterat. Extrema erant frigida, sublivida. Urinæ crudæ. Mortuus est sub solis occasum. Huic febres ad finem usque cum sudore erant. Hypochondria sublimia (μετὰ ὀρὰ) contentio cum dolore. Urinæ nigræ habentes suspensiones rotundas, nec subsidebant, ex ventre au-



antem reddebat stercus. Sitiēbat usque ad finem,  
non tamen vehementer, Convulsiones multæ  
cum sudore circa mortem usque ad finem.

### Ægrotus Octavus.

**M**Etōnem febris vehemens corripuit cum lum-  
borum gravitate & dolore. 2do. Cum  
multum aquæ biberet, alvus benè egressit. 3tio.  
Capitis gravitas: dejectiones tenuēs; biliosæ,  
subrubræ, 4to. omnia exacerbata sunt. Flu-  
xit à dextrâ nare sanguis paululum bis, noctem  
laboriosè transegit. Dejectiones quales ter-  
tio die, urinas nigras habebat; in quibus  
pendebant subnigra sparsa. Non subsidebant.  
5to, copiosè sanguis fluxit sincerus ex nare  
sinistrâ. Sudavit. Judicatus est. A iudicio  
insomnis erat, delirabat, Urinæ tenuēs, sub-  
nigræ. Capitis perfusione usus est. Dormivit  
mente constitit. Morbus non repetiit. Sed  
fluxit sanguis sæpe post iudicium.

*Æger.  
septimus*

### Ægrotus Nonus.

**C**Ritoni in Thaso erecto & ambulanti pe-  
dis pollex vehementer dolere cepit.  
Decubuit eodem die, horrescens, fasti-  
diosus. Parum incalescens. Noctē deliravit.  
2do. Tumor per totum pedem & usque ad  
talam subrubens & cum contentione. Pustulæ  
nigræ. Febris acuta. Insaniit. A ventre verò  
mera biliosa copiosa effluerunt. Mortuus est  
a principio secundo die.

## Ægrotus Decimus.

**C**Lazomenium qui decumbebat juxta puteum Phrinichidæ, febris vehemens corripuit, a principio dolebant illi caput & collum & lumbi. Statim surditas accidit. Somno carebat. Febris acuta corripuit eum. Hypochondrium attollebatur cum tumore, sed contentione exigua. Lingua arida. 4to. Per noctem deliravit. 5to. Cum dolore omnia sunt exacerbata. Circa undecimum autem nonnihil remissa. Ex ventre ab initio & usque ad 14. Multa tenuia aquei coloris reddebat. quod ad dejectiones attinet, cum bona tolerantia transigebat. Deinde venter restitit. Urinæ usque ad finem tenues quidem, boni autem coloris & multam habebant suspensionem, dispersam, non subsidebant. 16. Minxit paulo crassius, quod habebat exiguam subsidentiam. Sublevatus nonnihil est, melius sibi constitit. 17. Rursus tenues fluxerunt. Secundum utramque aurem tumor cum dolore ortus est, somno carebat. Delirabat. Crura illi dolebant. 20. Sine febre, judicatus est. Non sudavit. Omnia intelligebat. Circa autem 27. Coxæ dextræ fortis dolor ortus est, qui cito sedatus est. Qui vero ad aures tumores, neque subsidebant, neque suppurabant, dolebant tamen. 31. Ex diarrheæ multa aquosa prodierunt, cum excrementis dysentericis. Urinas crassas minxit, subsederunt qui circa aures tumores. 40. doluit dexter oculus. Videbat obtusius. Rediit ad statum.

## Ægrotus Undecimus.

**D** Romeadæ uxorem quæ filiam pepererat, & aliis omnibus secundum rationem procedentibus. 2do. die rigor accepit. Febris acuta. Cepit primo dolere circa hypochondrium, cum fastidio, horrore & inquieta corporis jactatione. Sequentibus diebus non dormivit. Spiritus magnus & rarus: Subito revulsus & retractus. 2do. Ab eo quo riguit, ex alvo bene processerunt stercora. Urinæ crassæ, albæ, turbidæ, quales fiunt ex subsidentibus cum repositæ per multum tempus perturbantur: Non subsidebant. Noctu non dormivit. 3tio. Circa meridiem cum rigore febris acuta corripuit. Urinæ similes, Hypochondrii dolor. fastidiosa. noctem difficulter tulit. Non dormivit. Sudor accidit per totum corpus frigidus. Cito autem recaluit. 4to Circa hypochondrium nonnihil sublevata est: Capitis vero gravitas cum dolore. Levi sopore detenta est. Paucus è naribus sanguis stillavit. Lingua arida, siticulosa erat; Urinæ tenues oleosæ, parum dormivit. 5to. Sitibunda, fastidiosa, urinæ similes, ab alvo nihil dejecit. Circa meridiem multum deliravit, & rursus citò parum rediit ad mentem. Surrexit, mox sopore correpta est, refrigeratio exigua, nocte dormivit, deliravit. 6to. Mane riguit, cito recaluit, toto corpore sudavit, extréma frigebant, deliravit, spiritus magnus & rarus. Paulo post convulsiones à capite ceperunt, Subito mortua est.



## Ægrotus Duodecimus

**H**Omo quidam incalescens largius cœnavit & potavit, nocte vomuit omnia, febris acuta corripuit cum hypochondrii dextri dolore: phlegmone submollis ex externa parte (alii ex interna parte) noctem difficulter tulit. urinæ initio rubræ crassitiem habentes. Repositæ non subsidebant. Lingua arida. non valde siticulosus. 4to. febris acuta corripuit cum omnium membrorum dolore. 5to. minxit læve, oleosum, multum. febris acuta perseveravit. 6to. vesperi multum deliravit. neque nocte dormivit. Septimo omnia exacerbata sunt. urinæ similes. verba multa proferebat, nec se continere poterat, ab alvo autem cum irritatione, exierunt humida, turbata, cum lumbricis. nox similiter laboriosa. mane post rigorem, febris corripuit acuta. Sudavit multum, sine febre fieri visus est. Non multum dormivit. Ex somno refrigeratio accidit & sputatio. Vesperi multum deliravit. Paulo post vomuit nigra, pauca, biliosa, 9o. Refrigeratio. Deliravit multum, non dormivit. 10. Eicrura doluerunt. Omnia exacerbata sunt. Deliravit. Undecimo, mortuus est.

## Ægrotus decimus tertius.

**M**ulierem quæ decumbebat in littore, trimestri foetu gravidam, febris vehemens in vasit

invasit. Statim cæperunt dolere lumbi. Tercio die doluit collum & caput secundum claviculam & dextram manum. citò autem lingua privata est voce, dextra manus elanguit cum Convulsione Apoplectico modo. Deliravit omnino. Noctem difficulter tulit. Non dormivit. Venter turbatus est, biliosis, paucis, sinceris, Quarto, Lingua privata est voce. Convulsio eorundem, dolor omnium membrorum permanebat, circa hypochondrium tumor aderat cum dolore. Non dormivit. Deliravit omnino. Venter turbatus. Urinæ tenues non boni coloris. Quinto, Febris acuta corripuit cum hypochondrii dolore. Deliravit omnino. Dejectiones biliosæ. Per noctem sudavit, & febre liberata est. Sexto, Mente constitit. Omnia sublevata sunt. Circa claviculam sinistram dolor permanebat. Siticulosa. Urinæ tenues. Non dormivit. Septimo, Tremor accidit, levi sopore & delirio detenta est parvo. Dolores secundum claviculam & brachium sinistrum permanebant. Alia verò sublevata sunt. Omnia intelligebat. Tribus diebus eam reliquit febris. Undecimo rediit, & rigore suborto febris eam corripuit vehemens. 14. Vomuit biliosa, flava, copiosa, sudavit. Sine febre. Judicata est non sine dolore ex iisdem passionibus.

### Ægrotus decimus quartus.

**M**elida quæ decubuit juxta templum Junonis, cœpit caput & collum & pectus vehementer dolere. Statim eam corripuit febris

febris acuta. Mensurus sanguis paucus apparuit. Dolores omnium horum continui erant. Sexto, Sopor occupavit cum fastidio, horrore & malarum rubore. Parum deliravit. Septimo, Sudavit. Febris intermisit. Permanebant dolores. Reversa est. Somni pauci, urinæ usque ad finem, boni quidem coloris, sed tenues. Dejectiones tenues, biliosæ, mordaces; valde paucae, nigrae, foetidae prodierunt, in urinis subsidentia alba, lævis. Sudavit. Judicata est perfecte undecimo.



## EPIDEMIORUM

## Liber Secundus.

## Sectio Prima.

I. **I**N ardoribus sine pluvia, maxima ex parte absque sudore febres contingunt. In his si tenuior pluvia guttatim stillaverit, copiosiores sudores statim in febribus fiunt,

Febres ardentes æstate magis grassantur.

Ver in universum saluberrimum est, et minime lethale.

Quæ iudicant in melius, ne statim appareant.

Indicatoria non judicantia, partim lethalia sunt, partim difficilis judicationis.

Quæ præmaturius judicantur, cum cruda sunt omnia, recidivas portendunt, minus, acrisiam. Fluxus sanguinis largi ex naribus solvunt multa, ut Heragoræ. Non agnoscebant Medici. ( i. e. Judicatorium, sed malum & noxium putabant. )

## Sectio Secunda.

**A**Qua quæ celeriter calefcit & celeriter frigescit, semper levior est. Aph. 6  
sect. 5.

Cui-

Cuidam coxa dolebat antequam conciperet, postquam autem concepit, non amplius doluit. Vigesimo die a partu rursus doluit, peperit igitur masculum.

Hieronî judicatio facta est decimo quinto die, ( hoc rarum, ideo ab Hippocrate notatum. )

### Sectio Tertia.

*lib. 6.*

*sect. 2.*

*aph. 9.*

**O** Scitationes assiduas, longa spiratio sanat. Iis qui non bibunt, aut ne vix quidem, brevis spiratio plurimum confert.

*Aph. 12*

*Sect. 2*

Quæ relinquuntur in morbis post crisin, recidivas facere solent.

Quarto die facti sanguinis è naribus fluxus, difficilem faciunt judicationem.

Quæ febres diem unum intermittentes, altero superrigent, judicatione ad septimum circuitum terminantur.

*lib. 6.*

*sect. 2.*

*aph. 14*

### Sectio Quarta.

*Lib. 6.*

*Epid.*

*Sect. 4.*

*aph. 11.*

**I**N Aëno qui leguminum esu continenter utebantur mares & fæminæ, crurum impotentia laborabant. Rursus etiam qui orobum comedebant, genuum dolore torquebantur.

### Sectio Quinta.

**Q** Uicunque rufi sunt & acuto naso, ac parvis oculis, ii maligni sunt : Qui vero,

pero rufi, limi, & magnis oculis, boni. Vocis gracilitatem solvit varix ad sinistrum & dextrum testem subortus: absque horum altero fieri non potest, ut solvatur.

Steriles fovere, ac pharmaco uti oportet.

Qui repente voce privantur, si sine febre sint, iis venam secare oportet.

Si hydropicum tussis corripiat, malum.

*Aph.*

35.

Si quis statim animo linquatur, calidis omnibus uti debet, sin minus, vinum bibere, & cibis repleri.

*Se&. 6.*

Si auris doleat, lacte utatur.

Oris ventriculi morsum, merum in pane, calido exhibitum, sanat.

Vomitus solviur exhibitio aquæ calidæ potu, ut vomat æger.

*Lib.*

*de locis*

*in ho-*

*mine.*

Nisi die legitimo recedat febris, necesse est redeat.

## Sectio Sexta.

**L**ongævi plures dentes habent.

Balbi, celeri lingua præditi, melancholici, biliosi & iracundi sunt.

Qui magnum caput, oculos nigros & magnos, nasum crassum & sinum habent, ij boni sunt.

Prædicere mortem aut vehementes dolores, Medico decorum est.

Numerorum tertius validissimus est.

Cynanchen & ophthalmiam venæ sectio curat,

Mulieri menstrua ut cohibeas, cucurbitulam

*Aph. 50*

*Se&. 5.*



maximam secundum mammam affigere oportet.

Trimestris fœtus omnia habet manifestè figurata.

*Aph.*

Urinæ stillicidium solvit venæ sectio.

36.

*Sect.* 6.

Gravissimos aurium dolores affixa cucurbitula tollit.

Ad reduvias galla nigra cum melle prodest.

## Liber Tertius.

# EPIDEMIORUM.

## Sectio Prima.

### Ægrotus Primus.

**P**ythion qui habitabat juxta telluris ædem. Hunc cœpit tremor à manibus. Primo Die, febris acuta, delirium. 2do. Omnia exacerbata sunt. 3tio. Eadem. 4to. A ventre pauca, mera, biliosa fluxerunt. 5to. Omnia exacerbata sunt. Somni tenues, & alvus restitit. 6to. Sputa varia, subrubra. 7mo. Os distortum est. 8vo. Omnia exacerbata sunt. Tremores perseverabant. Urinæ ab initio usque ad octavum tenues, decolores, suspensione

nes habentes nebulosas. 16. Sudavit, spura  
subcocta, judicatus est. Et Urinæ subtenuēs  
circa judicium. Quadraginta autem diebus  
post judicium, suppuratio facta est circa sedem,  
& stranguriosus etiam abscessus,  $\pi$ .  $\pi$ .  $\nu$ .  $\pi$ .  $\nu$ .  
probabile est, multitudine urinarum, die 40.  
sanctatem illi contigisse.

### Ægrotus Secundus.

**H**ermocratem qui decumbebat juxta novum  
murum febris ingens corripuit. Cœpit  
capitis & lumborum dolore affici, hypochon-  
drium molliter contendebatur. Lingua ab ini-  
tio adusta fuit. Statim obsurduit. Infomnis  
erat nec valde siticulosus. Urinæ crassæ, ru-  
bræ, repositæ non subsidebant. A ventre usta  
non pauca exhibant. 3to Die minxit tenuia,  
habebant suspensionem, non subsidebant. Sub  
noctem deliravit. 6to. Ictericus factus est.  
Omnia exacerbata sunt. Mente non consta-  
bat. Septimus cum difficili tollerantia, urinæ  
tenuēs, similes, sequentibus diebus eodem modo  
se habuit. Circa 11 verò, omnia visa sunt esse  
sublevata. Coma incepit. Urinæ crassæ,  
subrubræ, infra tenuēs, non subsidebant. Pla-  
cide ratiocinabatur. 14. Sine febre. Non  
sudavit, dormivit; intelligebat omnia. Urinæ  
similes. Circa 17. rediit morbus. incaluit die-  
bus sequentibus, febris acuta, urinæ tenuēs.  
Rursus 20. judicatus est, a febre liber, non  
sudavit, cibum non capiebat per totum tem-  
pus, mente constabat. Loqui non poterat:  
Lingua arida, non sitiebat. dormiebat sopo-  
rosus

Iosus. Circa 24. calefactus est, alvus humida, multis tenuibus fluens. Sequentibus diebus febris acuta, lingua exusta est. 27. Mortuus est. Huic surditas semper perseverabat, urinæ aut crassæ & rubræ non subsidentes, aut tenues & decolores, suspensum quid habentes, cibum capere non poterat. π. ς. δ. κ. ζ. θ. i. e. πθανον εξονταν διαχωρηματα κ. ζ. θανατον. Probabile exeuntibus dejectionibus 27. mortem accidisse.

### Ægrotus Tertius.

**Q**ui decumbebat in horto Dealcis, capitis gravitate, & dextri temporis dolore affectus per diuturnum tempus, ex levi occasione, vehementi febre correptus decubuit. 2do. Ex sinistra nare, paucus & sincerus sanguis fluxit. A ventre stercora bene exierunt. Urinæ tenues, variæ, suspensionem habentes minutatim dispersam, farinam crassiolem referentes & genituræ similes. 3tio. Febris acuta, excretiones nigræ, tenues, spumosæ, & quæ in dejectionibus subsidebant livida erant. Somno premebatur, difficulter surgebat, in urinis subsidentia livida, subviscosa. 4to. Evomit biliosa, flava, exigua, paulo post æruginosæ. Ex sinistra nare paucus sincerus sanguis fluxit. Dejectiones & urinæ similes, exsudavit circa caput & claviculam. Splen elevatus intumuit; Femoris dolor accidit secundum rectitudinem. Hypochondrij dextri contentio submollis. Nocte non dormivit, deliravit aliquantulum. 5to. dejectiones plures, nigræ, spumosæ, & quæ in dejectionibus subsiderant,



derant, nigræ erant. Nocte non dormivit, deliravit. 6to. Dejectiones nigræ, pingues, viscidæ, fœtidæ, dormivit, mente melius constabat. 7mo, Lingua sicca, siticulosa, non dormivit, deliravit, urinæ tenues non boni coloris. 8vo. Dejectiones nigræ, exiguæ, consistentes, dormivit, intelligebat, siticulosus non valde. 9no. Ex rigore febris acuta corripuit, sudavit, perfrixit, deliravit, dexter oculus distortus est, lingua arida, siticulosus erat, & insomnis. 10. Eadem, 11. Intelligebat omnia, febre liberatus erat. Dormivit. Urinæ tenues circa judicationem. Duos dies febris intermisit. 14. Rediit. Statim per noctem non dormivit, mente motus est. Omnino deliravit. 15. Urina turbata qualis fit ex iis quæ subsederunt, quum agitantur. febris acuta, omnino deliravit, non dormivit. Genua & tibie dolebant. A ventre autem, glande apposita, nigra stercora exierunt. 16. Urinæ tenues, habebant enæorema nebulosum, deliravit. 17. Summo mane extremæ partes frigebant, contegebatur. Febris acuta, toto corpore sudavit, sublevatus est, mente melius constabat, non est a febre liberatus, siticulosus, vomuit biliosa, flava, pauca, a ventre autem stercora exierunt. Paulo post nigra, pauca, tenuia, urinæ tenues non boni coloris. 18. Mente non constabat, sopore tenebatur. 19. Eodem erat in statu, urinæ tenues. 20. Dormivit. Intelligebat omnia, sudavit, a febre liberatus est. Non sitivit, Urinæ autem tenues. 21. Parum deliravit, parum sitiebat, hypochondrii dolor & circa umbilicum, palpitatio usque ad finem manens occupavit. 24. Urinis hypostasis, intelligebat omnia. 27. Coxæ dextræ

dextræ dolor cepit. Urinæ tenues, habentes subsidentiam. Alia placidissimè se habebant.  
 29. Dexter oculus doluit, urinæ tenues erant.  
 40. Egessit pituitosa, alba, copiosa, sudavit multum, & toto corpore. Perfectè judicatus est.

## Sectio Secunda.

### Ægrotus Quartus.

**I**N Thaso, Philistes diuturno capitis dolore confictatus, tandemque sopore aliquantulum correptus, decubuit. Excitata verò post potationem febre, dolor exacerbatus est. Nocte incaluit primum. Primo Die, vomuit biliosa, pauca, flava primum. Postea æruginosa plurima. A ventre stercora fluxerunt. Noctem difficulter tulit. 2do. Surditas accidit, & febris acuta, cum hypochondrii dextri contentione, quæ in partes internas vergebat. Urinæ tenues, pellucidæ, habentes suspensum genituræ simile. Parum insanivit circa meridiem. 3tio. Graviter se habuit. 4to. Convulsiones acciderunt. Exacerbata sunt omnia. 5to. Mane mortuus est.

### Ægrotus Quintus.

**C**Herionem qui decumbebat juxta Demænetum, ex potu, febris vehemens corripuit.

puit. Statim capitis gravitate cum dolore la-  
 boravit. non dormivit. alvus turbata est  
 tenuibus, subbiliosis. 3to. Febris acuta in-  
 vasit, et capitis tremor, præcipue labii inferi-  
 oris. Paulo post rigor, convulsiones, omnino  
 deliravit, noctem difficulter tulit. 4to. Quie-  
 vit. Parum dormivit, deliravit. 5to. La-  
 boriose se habuit. omnia exacerbata sunt, de-  
 lirium, nox molesta, non dormivit. 6to. ea-  
 dem. 7mo. Superriguit, febris acuta cor-  
 ripuit, toto corpore sudavit. Judicatus est.  
 Huic perpetuo ab alvo dejectiones biliosæ, exi-  
 guæ, sinceræ prodierunt. Urinæ tenues, boni  
 coloris, suspensum nebulosum habentes: circa  
 8vum. Minxit melioris coloris urinas, habentes  
 hypostasim albam, exiguam. mente constabat.  
 Febris intermisit, quæ 9mo. rediit. 14.  
 Febris acutaprehendit, sudavit. 16. Vomuit  
 biliosa, flava, satis multa. 17. Superriguit,  
 febris acuta, sudavit. A febre decretorie  
 liberatus est. Urinæ post recidivam, &  
 Judicationem, melioris coloris, subsidentiam  
 habentes, neque deliravit in recidiva. 18. In-  
 calescebat parum, insuper sitiebat. Urinæ  
 tenues, suspensum quid nebulosum habentes.  
 parum deliravit. Circa 19. A febre libera-  
 tus. circa cervicem habebat dolorem, urinis  
 subsidentia aderat. perfecte judicatus est 20.  
 .x. .xv. .x. .v. .i. e. Probabile est multi-  
 tudine urinæ Cherionem 20. die Sanatum.



## Ægrotus Sextus.

**E**uryanactis filiam virginem febris vehemens corripuit, permansit usque ad finem sine siri, et quævis alimenta respuebat, à ventre pauca exierunt. Urinæ tenues, exiguæ, non boni coloris. Incipiente febre circa sedem dolebat. 6to die, febre libera, non sudavit, judicata est. Quod autem circa sedem, parum suppuratum est, et exivit cum judicatione. Post judicationem die 7mo. riguit, nonnihil incaluit, sudavit. post judicationem 8vo die, riguit non multum, postea vero extrema frigida semper fuerunt. Circa 10, post eum quem habuerat sudorem, deliravit, & rursus ad mentem confestim rediit. Dicebant autem eam hæc pati, quod gustasset racemum. Intermittens vero, 12mo. rursus deliravit, venter turbatus est biblosis, paucis, sinceris, tenuibus & mordacibus, crebro surgebat. 7mo. Quo postremum deliraverat, mortua est. Hæc incipiente morbo doluit fauces, & perpetuo ruborem habebat, & columella revulsa fuit, fluxiones multæ, exiguæ, acres, tussit concocta. Nihil excreabat. Nullum cibum toto tempore accipere poterat, neque apperebat quicquam, neque sitiebat, neque bibit quicquam notatu dignum. Tacita, nihil loquebatur, tristis, desperata statim erat. Erat autem nativa quædam ad tabem propensio.

### Ægrotus Septimus.

**A** Nginosa quæ juxta Aristionem agebat, Hæc primum a lingua incepit. Obscura vox erat, lingua rubra & resiccata. Primo, Die horrida, incaluit. 3tio. Rigor, febris acuta invasit, cervicis tumor subruber, durus, & super pectus ab utraq; parte. Extrema frigida, livida, Spiritus sublimis. Potum per nares rejiciebat, bibere non poterat, dejectiones & urinæ restiterunt. 4to. omnia exacerbata sunt. 5to. mortua est. π. δ. α. β. γ. i. e. αἰθανὸν διαχωρημάτων ἐπὶ χεῖαντον θανάτου. Probabile dejectionibus suppressis 5to, Mortuam.

### Ægrotus Octavus.

**A** Dolefcentem illum qui decumbebat in foro Mendacium, vehemens febris corripuit, ex lassitudinibus & laboribus, & cursibus insolitis. Primo, alvus turbata est biliosis, tenuibus, multis. Urinæ tenues, subnigræ, non dormivit, siticulosus fuit. 2do, omnia exacerbata sunt, dejectiones plures, intempestiviores, non dormivit. Mente turbatus fuit, & levi sudore perfusus. Tertium difficulter tulit, siticulosus, anxius, multum se jactavit & perplexerat, deliravit. Extrema livida & frigida; hypochondrii contentio submollis utrinque. 4to. non dormivit, pejus se habuit. 7mo. mortuus est. Circiter vigesimum ætatis an-

num agebat, *π. ζ. θ. ι. ε. πιθανόν* *ἐπεὶ* *ὁ* *πρὸς* *τὸν* *θανάτον*. Probabile insolens quiddam  
7mo die mortem attulisse.

### Ægrotus Nonus.

**M**ulier quæ decumbebat juxta <sup>T</sup>Misame-  
num. Huic volvulosa moleste conci-  
tabantur, vomitibus multis torquebatur, po-  
tum continere non poterat, dolores aderant  
circa hypochondria, & in inferioribus secun-  
dum ventriculum partibus. Dolores & tor-  
mina continenter affligebant, non erat siticu-  
losa, incalescebat. Extrema frigida usque ad  
finem. Fastidiosa sine somno. Urinæ tenues,  
paucæ, excretiones crudæ, tenues, paucæ,  
non erat remedio locus, mortua est.

### Ægrotus Decimus..

**M**ulierem quandam earum quæ apud  
Pantimedem degebant, ex abortu re-  
centis fœtus, vehemens febris primo die cor-  
ripuit. Lingua sicca, siticulosa, fastidiosa,  
insomnis erat. Alvus turbata est tenuibus,  
multis, crudis, 2do. Superriguit, febris acu-  
ta invasit, ex alvo multa egressit. Non dormi-  
vit. 3tio. Dolores augebantur. 4to. De-  
liravit. 7mo. Mortua est. Alvus per totum  
morbum humida, cum dejectionibus multis  
tenuibus, crudis. Urinæ paucæ, tenues. feb-  
ris ardens

Ægrotus



## Ægrotus Undecimus

**A**lteram ex abortu circa 3<sup>um</sup> mensem, Oecetæ uxorem, febris vehemens corripuit. Initio comatosa erat, & rursus infomnis, cum renum dolore & capitis gravitate. 2<sup>do</sup> Alvus turbata est paucis, tenuibus, meris primum. 3<sup>tio</sup>. plura & deteriora, Nocte nihil dormiuit. 4<sup>to</sup>. Deliravit. timores, tristitiæ aderant. dexter oculus distortus est, sudore circa caput paucis & frigido, maduit, extrema frigida. 5<sup>to</sup>. omnia exacerbata sunt. Multum deliravit, & rursus celeriter ad mentem rediit, siticulosa erat & infomnis. Alvus multis & meris, usque ad finem defluxit. Urinæ erant tenues, paucæ, subnigræ, extrema frigida, sublivida. 6<sup>to</sup>. Eadem. 7<sup>mo</sup>. mortua est phrenitide.

## Ægrotus Duodecimus.

**M**ulierem quæ decumbebat in foro Mendacium, enixam primum laboriose masculum, vehemens febris corripuit. Mox in principio siticulosa, fastidiosa, dolebat cor, lingua arida, alvus turbata tenuibus, paucis, non dormivit. 2<sup>do</sup>. Parum riguit, febris acuta invasit, paucus sudor circa caput & frigidus diffusus est. 3<sup>tio</sup>. laboriose ex alvo cruda multa tenuia fluxerunt. 4<sup>to</sup>. Supperriguit, omnia exacerbata sunt, infomnis. 5<sup>to</sup>, Laboriose se habuit. 6<sup>to</sup>. Eadem. ab alvo

alvo fluxerunt humida multa. 7mo. Superriguit: Febris acutaprehendit. Sitis multaaderat, & corporis jactatio: circa vesperam frigidus toto corpore sudor dimanavit. Perfrixit. Extrema erant frigida, nec recalescebant, & rursus ad noctem superriguit. Extrema non recalescebant. Non dormivit, parum quiddam deliravit, & rursus cito mente constitit. 8vo. circa medium diei recaluit, siticulosa, comatosa, fastidiosa, vomuit biliosa, pauca, flava, noctem difficulter tulit, nondormivit, minxit multum, confertim, inscia. 9no. Remissa sunt omnia, erat comatosa, ad vesperam parum superriguit, vomuit amara, biliosa, 10. rigor accidit, febris exacerbationem habuit, non dormivit quidquam: Mane minxit multum, subsidentiam non habens. Extrema recalesfacta sunt. 11. Vomuit virulenta, biliosa, riguit non multo post, & rursus extrema frigida. Ad vesperam rigor, sudor, vomuit multa. Noctem laboriose transegit. 12. Vomuit multa, nigra, fætida, Singultus multus adfuit, & sitis laboriosa. 13. Nigra, fætida, multa vomuit, rigor obortus est. circa meridiem voce privata est. 14. Fluxit sanguis de naribus. Mortua est. Huic per totum alvus humida fuit, & horrebat. annum ætatis agebat circiter 17. Febris ardens.

## Sectio Tertia:

## Ægroti 16.

## Ægrotus Primus.

IN Thaso Parium, qui decumbebat supra domum *Artimesū*, febris corripuit acuta, circa initia continua, ardens, siticulosa: ab initio comatosus erat, rursusque insomnis. Alvus turbata inter initia. Urinæ albæ. 6to. Minxit oleosum, deliravit. 7mo. Exacerbata sunt omnia. Nihil dormivit, sed urinæ similes, & mens turbata. Ex alvo autem biliosa pinguis fluxerunt. Deinde 8vo. Parum a naribus destillavit. Vomuit virosa, pauca, parum dormivit. 9no Eadem adfuerunt. 10. Omnia remiserunt. 11. Sudavit non per totum, circumfrigit quidem, cito autem recaluit. 12. Febris acuta fuit, dejectiones erant biliosæ, tenues, multæ, urinis enæorema, deliravit; 17. Laboriose transmissus est, neque somni aderant, neque febris intendebatur. 20. Sudavit toto corpore, insomnis, dejectiones erant biliosæ, cibum averfabatur, comatosus erat. 24. Recidiva contigit. 34. Sine febre, alvus non substitit, & rursus recaluit. 40. Sine febre. Alvus non diu restitit, cibum averfabatur, parum rursus febricitavit, & perpetuo erraticæ, aliquando a febre liber, aliquando non, si enim aliquid intermisisset, & allevata esset,  
rursus



rursus revertebatur; Cibariis multis & malis utebatur. somni mali in recidivis. Delirabat. Urinas tunc reddebat crassas quidem, verum turbatas & pravas. Alvus adstricta fuit, & rursus soluta, febriculæ aderant continuæ, dejectiones multæ, tenues. 120. die mortuus est. Huic alvus ab initio ad finem usque lubrica erat, excernebatque blanda, liquida, multa, aut si subsisteret, tervida & cruda. Urinæ usque ad finem malæ. Comatosus erat, aut plerumque cum doloribus insomnis: cibos fastidiebat, & continenter febre ardente laborabat.

---

### Ægrotus Secundus.

**M**ulierem in Thaso juxta frigidam decumbentem, cum filiam peperisset, nec purgationes procederent, 3tio. Die febris acuta cum horrore corripuit. Multo autem ante partum tempore ex febre decumbebat, & cibum fastidiebat. Postquam verò riguisset, continuæ fuerunt febres, acutæ, & cum horrore. 8vo. Et sequentibus diebus multum deliravit, rursusque cito ad mentem rediit. Alvus turbata est multis, tenuibus & aquosa bile permixtis. Non sitiebat. 11. Constabat mente, comatosa tamen erat. Urinas multas, tenues & nigras reddidit, insomnis erat. 20. Parum circumfrixit, & cito rursus recaluit. Parum deliravit, insomnis erat. & venter eadem demisit. Urinæ aquosæ & multæ erant. 27. A febre immunis fuit, & alvus substitit. Non

Non multo post vehementi & diuturno dextrae coxendicis dolore vexata est. Febres rursus comitabantur, & urinæ aquosæ. 40. Coxendicis dolores remiserunt; tussis autem continuæ, humidæ, multæ. Alvus substirrit. Cibus averfabatur. Urinæ eadem, febres omnino quidem non desinebant, sed erraticas aliquando habebant exacerbationes, aliquando non. 60. Tussis sine signis evanuerunt, nulla enim sputorum concoctio apparuit, neque alius consuetus abscessus. Maxilla etiam dextra convulsa est, comatosa, rursus deliravit, & cito ad mentem rediit. Cæterum a cibus aversum habebat animum. Maxilla autem ad locum suum rediit. Alvus biliosa pauca reddidit. Febricitavit acutius cum horrore, & sequentibus diebus vox decit, rursusque rediit ad mentem, & loquebatur. Et 80. Mortua est. Huic Urinæ usque ad finem erant nigræ & tennes, & aquosæ, & coma comitabatur. Cibus non sumebat, animo erat dejecto, insomnis, ira & inquietudinē torquebatur, animo erat melancholico.

### Ægrotus Tertius.

**I**N Thaso Pythionem, qui decumbebat supra Herculis fanum, ex laboribus & lassitudinibus, & pravo victu; rigor magnus & febris acuta corripuit. Lingua arida erat. Siriculosus & biliosus. Non dormivit; Urinæ subnigræ suspensum quid sublime habebant, non sudavit. Altero sub meridiem die, extremarum partium refrigeratio accidit, & maxime circa manus & caput. Obmutuit ( *ἄφωνος* ) vox defecit ( *ἀφ᾽ ὧτος* ) brevem spiritum traxit, post diuturnum

turnum tempus recaluit, sitiit, nocte quievit. sudavit circa caput parum. Tertium diem quietum habuit. Vespero circa solis occasum, aliquantulum frixit, turbatio accidit. Noctem laboriosè transegit. Nihil dormivit. Ex alvo pauca stercorea compacta exierunt. 4to. Mane quievit, circa mèridiem omnia exacerbarata sunt. Frixit, obmutuit, vox defecit, deterius se habuit, recaluit. Post aliquod tempus minxit nigra suspensum quid habentia. Noctem quietam habuit, dormivit. 5to. Allevatus esse visus est. Circa ventrem tamen pondus sensit cum dolore. siticulosus fuit, noctemque habuit molestam, 6to. Mane quievit, vesperi autem dolores creverunt, exacerbationem habuit, injecto verò clystere vesperi, ex alvo probe deiecit, nocte dormivit. 7mo. die fastidiosus erat & inquietus, minxit oleosum, noctem turbulente transegit, deliravit, nihil dormivit. 8vo. Mane quidem dormivit parum, mox accidit refrigeratio, vocis defectio, spiritus exilis & imminutus. vesperi rursus recaluit. Deliravit, instante jam die parum levatus est, dejectiones erant meræ, pauca, biliosa. 9no. Soporosus erat, fastidiosus, & quum excitabatur non valde siticulosus. Circa solis occasum moleste sese habuit, deliravit, noctem habuit incommodam. 10. mane defecit vox, multa refrigeratio, febris acuta, multus sudor. Mortuus est. Labores huic diebus paribus accidebant.



---

### Ægrotus Quartus.

**P**hreniticus primo die quo decubuit, vomuit æruginosa, multa tenuia, febris corripuit cum horrore, multus sudor & continuus toto corpore dimanavit, capitis & colli gravitas cum dolore. Urinæ tenues, suspensiones exiguæ, dispersæ. Non sudavit. Ab alvo ejecit stercus confertim, multa deliravit, nihil dormivit. 2do. Mane vox defecit: Febris acuta invasit. Sudavit. Non intermisit. Palpitationes per totum corpus. Nocte convulsionēs. 3tio. Exacerbata sunt omnia. Mortuus est ( secundum Fœsium ) quarto.

---

### Ægrotus Quintus.

**I**N Larissa Calvus femoris dextri repentino dolore correptus est, nihil eorum quæ offerebantur juvabat. Primo die febris acuta & ardens, sensim corripuit, dolores autem comitabantur. 2do femoris dolores remiserunt, febris autem intensa est, submoleste sese habuit, non dormivit. Extremæ partes frigidaerant. Urinarum non probarum copia prodibat. 3tio. Femoris dolor sedatus est, mentis autem alienatio accidit & perturbatio & multa jactatio. 4to. Circa meridiem mortuus est acutissime.

---

### Ægrotus Sextus.

**A**Bderæ Periclem morbus corripuit acutus, continuus, cum dolore. Multum scribebat, anxius erat, potum continere non poterat, erat sublihenosus, & capitis gravitate laborabat. Primo Fluxit sanguis multus ex sinistra nare, febris intendebatur, Minxit multum, turbatum, album, repositum, non subsidebat. 2do Omnia exacerbata sunt. Urinæ vero crassæ quidem erant, sed magis residentes: & anxietas levata est, dormivit. 3tio. febris remissa est. Urinæ copiosæ, costæ, multam hypostasin habentes. Noctem quiete transegit usque ad medium diem, sudavit sudore multo calido, 4to die per totum corpus, à febre liberatus est, & iudicatus. Non rediit. Morbus erat acutus.

---

### Ægrotus Septimus.

**A**Bderæ Virginem quæ decumbebat in via sacra, febris ardens corripuit. Erat autem siticulosa & insomnis. Fluxerunt muliebria primum ipsi. 6to. Fastidium multum, ruborem contraxit cum horrore & inquietudine. 7mo. Eadem perseverarunt. Urinæ tenues quidem, boni autem coloris, alvus commodè habebat. 8vo. Surditas accedit & febris acuta, insomnis erat & anxia, horrebat, intellegebat. Urinæ similes. 9no Et sequentibus eadem. Manebat item surditas. 14. Mens turbata

turbata, febris remisit. 17. E naribus sanguis  
fluxit multus. Surditas parum remisit, sequen-  
tibus fastidium & surditas aderat & delirabat.  
20. Pedum dolor coepit. Surditas & delirium  
intermisit. Fluxit parum sanguinis de naribus,  
sudore à febre liberata fuit. 24. Febris rediit,  
surditas rursus, pedum dolor permansit, alie-  
natio mentis. 27. Sudavit multum, a febre  
liberata fuit. Surditas desit. Dolor pedum  
permanebat. Quoad alia vero perfecte judi-  
cata est.

### Ægrotus Octavus.

**A** Bderæ Anaxionem qui decumbebat ad por-  
tas Thracias febris acuta corripuit : la-  
teris dextri dolor continuus, tussis erat sicca,  
neque expuit primis diebus. Siticulosus, in-  
somens. Urinæ boni coloris, multæ, tenues.  
6to. Deliravit, post fomenta calida nihil re-  
mittebatur. 7mo. Laboriose se habuit, fe-  
bris enim intendebatur, & dolores non sunt  
minuti, & tusses infestabant & difficulter re-  
spirabat. 8vo. Venam in cubito secui, fluxit  
multum, ut decebat. Remissi sunt dolores.  
Tusses quidem aridæ permanserunt. 11. Fe-  
bres remiserunt, parum circa caput sudavit.  
Tusses adhuc durabant, & quæ à pulmone exi-  
bant humidiora erant. 17. Incepit pauca  
concocta spuere. Levatus est, sitibundus  
verò erat. Et eorum quæ à pulmone exibant  
probæ non erant expurgationes. 20. Sudavit,  
à febre liberatus est. A judicatione melius  
habuit. 27. Febris rediit, extussit, excrea-



vit cocta multa. In urinis erat subsidentia multa alba, desiit sitire, dormivit. 34. Sudavit toto corpore, liberatus est à febre, & omnino judicatus.

### Ægrotus Nonus.

**A**Bderæ Herophytus rectus & obambulans capite dolebat, non multo postea decubuit. Febris eum corripuit ardens, acuta. Vomuit ab initio multa biliosa. Siticulosus. Difficilis tollerantia multa. Urinæ tenues, nigrae in quibus suspensum quid sublime aliquando erat, aliquando non. Noctem laboriosam habuit. Febris alias aliter exacerbescerebat plerumque sine ordine. 14. Verò, surditas accidit, febres intendebantur, Urinæ eadem fuerunt. 20. Multum deliravit, & sequentibus. 40. Multus sanguis exiit de naribus & intelligebat magis. Surditas inerat quidem, minus tamen. Febres remiserunt. Sequentibus diebus sanguis erumpebat crebro & paulatim. Circa 60. Fluxus sanguinis cessaverunt. Coxæ autem dextræ dolor fortis exortus est, & febres intendebantur. Non multo tempore postea doluerunt omnes inferiores partes. Contigit autem aut febres esse majores & surditatem multam; aut hæc quidem, recedere & sublevari, infernarum vero partium circa coxam majores esse dolores. Circa 80. remiserunt omnia; Deriliquit autem nihil. Urinæ enim boni coloris & copiosiores subsidentias habentes prodibant, & deliria minora erant. Circa 100. Alvus multis biliosis turbata est, & tempore non exiguo multa

multa hujusmodi prodibant ; & rursus dysenterica cum dolore. Aliorum autem quies. In summa febres defecerunt & surditas cessavit. 100. Die perfecte judicatus est. Febris erat ardens.

### Ægrotus Decimus.

**A**Bderæ Nicodemum ex venere & potu febris corripuit. Initio fastidiosus erat & cardialgicus & siticulosus. Lingua usta, urinæ tenues, nigræ. 2do. Febris exacerbata est cum horrore. Fastidiosus, nihil dormivit. Vomuit biliosa flava, urinæ similes. Noctem quietam habuit, dormivit. 3tio. Remiserunt omnia & quies erat. Circa solis occasum rursus subdifficilem habebat tollerantiam. Noctem laboriose transegit. 4to. Rigor cœpit & febris magna, omnium dolores aderant, urinæ tenues in quibus suspensum quid erat, deliravit multum. 7mo. Tranquillitas adfuit. 8vo. Alia omnia remiserunt. 10. Et sequentibus manserunt quidem dolores, leviores autem omnes; accessiones & dolores, huic usque ad finem diebus paribus magis contingebant. 20. Urinam reddidit albam, cui crassities inerat, reposita non subsidebat, sudavit multum. Visus est a febre liberatus. Vesperis rursus incaluit. Iidemque dolores perseverârunt cum horrore & siti, parum deliravit. 24 Urinam reddidit copiosam albam, in qua multa subsidebant. Sudore copioso & calido diffusus est per totum corpus, à febre liberatus est & judicatus.

Ægrotus

---

### Ægrotus Undecimus.

**I**N Thaso mulier morosa, ex mœrore manifesto, recta adhuc & obambulans, insomnis facta est, & cibum non capiebat, siticulosa erat & anxiosa. Habitabat prope Pyladem in Leio. Primo die sub initium noctis, terrores, Sermones multi, tristitia, febricula tenuis. Mane convulsiones multæ contigerunt. Cum autem intermisissent convulsiones illæ multæ, deliravit, turpia loquebatur. Multi dolores, magni, continui. 2do. Eadem. Nichil dormivit. Febris acutior. 3tio. Convulsiones desiêrunt, coma autem & cataphora eam detinuerunt, & rursus expergetacta exiliit. Continere se non poterat. Multum delirabat, febris acuta erat. Eadem nocte sudor copiosus & calidus toto corpore dimanavit. liberata est a febre, dormivit. Omnia intelligebat. Judicata est. circa 3tium diem, urinæ nigræ, tenues erant, habebantque suspensum quid valde rotundum, non subsidebat; circa judicationem muliebria multa fluxerunt.

---

### Ægrotus Duodecimus.

**L**arissæ Virginem febris corripuit ardens acuta. Insomnis, siticulosa; Lingua fuliginosa, arida. Urinæ, boni quidem coloris, sed tenues erant. 2do. Laboriose se habuit, non dormivit. 3tio. Multa fluxerunt ab alvo-  
ut,



et aqua biliosa , & sequentibus talia com-  
mode prodierunt. 4to. Urinam reddidit tenuem,  
paucam, habebat suspensum quid sublime, quod  
non subsidebat, deliravit sub noctem. 6to. San-  
guis ex naribus copiosus & multus effluxit,  
horrore correptus est, & sudore copioso  
calido perfusa per totum corpus, a febre li-  
berata est & judicata. Per febres autem &  
etiam perfecta judicatione muliebria tunc pri-  
mum fluxerunt. Virgo enim erat. Perpetuo  
autem stomachi fastidio laborabat, horrebat,  
faciei rubor aderat, oculorum dolor, capitis  
gravitas. Hæc non passa est recidivam, sed  
judicata. Dolores paribus diebus continge-  
bant.

### Ægrotus Decimus Tertius.

**A** Pollonius Abderæ morbum diu rectus &  
obambulans sustinebat. Magna illi erant  
viscera & circa hepar dolor consuetus multo  
tempore comitabatur, & tunc sane ictericus  
factus est, flatuosus, colore subalbido.  
Cum cibo & potu intempestivo uteretur, &  
præcipue carne bovina, primò incaluit parum,  
decubuit. Cum verò usus fuisset copioso lacte,  
cocto, crudoque, caprino & ovino, pravaque  
victus ratione, insignes omnium læsiones factæ  
sunt: Nam febres exacerbatae sunt, nec ven-  
ter quicquam ex ingestis effatu dignum reddi-  
dit. Urinæ tenues & paucæ prodibant. In-  
somnia erat. Inflatio mala aderat, multa fi-  
tis, comatosus, hypochondrii dextri elevatio  
cum dolore. Extrema omni ex parte subfrigi-  
da

da erant, parum deliravit, omnium quæ locutus est obliviscebatur, mentis compos non erat. Circa 14. verò, ex quo suborto rigore, incaluit, decubuit & insanivit, clamor, perturbatio, sermones multi, rursusque cessatio, & coma tunc temporis accessit. postea verò alvus turbata est multis, biliosis, meris, crudis. Urinæ nigræ erant, paucæ, tenues; plurima anxietas, dejectiones variæ erant, aut enim nigræ & paucæ & æruginosæ erant, aut pingues crudæ & mordaces, postea videbatur etiam lacti similes reddidisse. Circa 24. Levius, se habuit, alia verò eodem modo manserunt parum ad mentem rediit, verum ex quo decubuerat nullius recordabatur, rursusq; celeriter desipiebat, procedebat omnia in deterius. Circa 30 diem febris acuta corripuit, alvi excrementa copiosa erant & tenuia, diliravit, extrema frigida erant, vox defecit. 34. Mortuus est. Huic ex quo eum vidi, ad finem usque alvus turbata fuit, urinæ tenues, nigræ comatosus, insomnis, extremitates frigidæ, deliravit usque ad finem, phreniticus.

### Ægrotus Decimus Quartus.

**I**N Cyristo Mulierem quæ gemellas et quidem ægre pepererat, nec satis expurgata erat, Primo febris corripuit cum horrore, & acuta, capitis & cervicis gravitas cum dolore tenuit. Insomnis a principio erat, taciturna, & tetrica, & non obsecundans. Urinæ tenues erant & decolores, siticulosa, ut plurimum fastidiosa & anxiosa. Alvus erraticè turbata fuit &

& rursus adstricta. 6to. Subnoctem deliravit, nihil dormivit. Circa 11. verò insanivit, rursusque ad mentem rediit. Urinæ nigræ erant, tenues, & rursus cum intermisissent, oleosæ, & alvus multa tenuia, turbata, egressit. 14. Convulsiones multæ exortæ sunt, extremitates erant frigidæ, neque amplius ad mentem rediit. Urinæ suppressæ sunt, mortua est. phrenitis.

### Ægrotus Decimus Quintus.

**I**N Thaso, Dealcis uxorem quæ decumbebat in Leio ( vel Plano ) febris cum horrore, & acuta, ex mœrore corripuit. A principio contegebatur, & semper usque ad finem taciturna erat, palpabat, vellebat, scalpebat, pilos legebat, plorabat, rursusque ridebat, non dormiebat, alvus irritabatur, sed nihil exhibat, exiguum, admonita, bibebat. Urinæ tenues erant & paucæ, febres ad manum leves apparebant. Extremæ partes frigebant. 9no. multum deliravit, rursusque quievit, tacita. 14. spiratio fuit rara & magna per aliquod tempus, rursusque brevis. 17. Alvus turbulentè irritata est. Deinde ipsi potus pertransibant, neque consistebant, omnium sensu privata est, & cutis arida, circumtensa. 20. Multum loquebatur, rursusque quiescebat, muta. Breve spiritum trahebat. 21. Mortua est. Huic spiratio rara & magna fuit usque ad finem, omnium sensu privata est, semper contegebatur, aut multum loquebatur, aut taciturna erat usque ad finem, phrenitis.



---

## Ægrotus Decimus Sextus.

---

**I**N Melibæa Adolecens, ex potu & multa venere, multo tempore calefactus decubuit. Horrore concussus est, fastidiosus erat, & anxius, sine somno, & sine siti. Ex alvo, primo die, multa stercora prodierunt, cum multa defluxione, & sequentibus, aquosa, biliosa multa prodierunt. Urinæ tenues, paucæ, decolores. Spiritus rarus, magnus per tempus, hypochondriorum distentio submollis, producta utrinque, cordis palpitatio perpetua usque ad finem. minxit oleosum, deliravit modice, modestus erat, & quietus, cutis arida & distenta, dejectiones multæ, tenues, aut biliosæ & pingues. 14. Omnia exacerbata sunt. Mente est motus. Multa deliravit. 20. insanivit. sese jactavit. nihil minxit, vix potum continebat. 24. Mortuus est, phrenitis.

---

## Liber Quartus Epidemiorum.

---

**V**irgini, cum die sexto judicatio advenisset, in morbum recidit, judicata vero sunt omnia per sextum. His temporibus sexto & octavo judicabantur circa Pleiadis occasum.

Qui in Sutrina decumbebat, Sanguinem per nares fudit valde biliosum, pauca dejiciebat,

bat, judicatus est 7mo. cum rigore.

Mulier quædam cum albis mensibus filiam peperit: Alia cum rubris, ut par erat.

Nicippus in febribus semen effudit somnians, nec quicquam in deterius processit, & hoc ipsi sæpe contigit, & nullo modo læsus est. Illi prædictum est istud cessaturum, cum febres judicatæ essent, & ita accidit.

Alcippus hæmorrhoidibus laborans, prohibebatur curari, curatus, insania correptus est, quæ febre acuta superveniente cessavit.

In acutis febribus siticulosi, a medicis vexati in potu, aut etiam sua sponte abstinentes, videntur posse bibere multum. Aqua frigida data, ut vomant, prodest, biliosa enim aderunt.

---

## Liber Quintus Epidemiorum.

---

6. **I**N Oeniadis, vir quidam morbo tenebatur, cum sine cibo permaneret, strepitum in ventre vehementem ( vel secundum Valesium vehementem suctionis sensum ) & dolorem percipiebat: & cum cibo assumpto & contrito, tempus etiam aliquod elapsum esset, post assumptum cibum, paulo post idem patiebatur, corpusque tabescebat & absumebatur, neque alimentum ei accedebat ex assumptis cibis, et reliquæ ciborum prævæ et exustæ, per alvum demittebantur. Cum vero recens cibatus esset, tum minime strepitum ( suctionis sensum ) sentiebat, neque dolor detinebat. Hic, assumptis omnis generis medicamentis & sursum & deorsum purgantibus, nihil alleva-

batur. Secta verò per vices utriusque manus vena, donec exsanguis redderetur, tum demum juvatus est, et à malo liberatus.

✿ Larissæ famula Dyseridis adhuc juvencula, cum venere uteretur, vehementi circum circa dolore afficiebatur, alias verò indolens erat, nec unquam concepit. Sexaginta autem annos nata, post meridiem dolebat vehementer, velut paritura. Cum autem ante meridiem multum comedisset porrum, et dolor, omnium præteritorum vehementissimus, ipsam corripuisset, exurgens asperum quiddam in uteri ore contrectavit. Deinde cum jam animo linqueretur, alia mulier immittens manum extraxit lapidem asperum fusi verticillum æquantem, et statim sana facta est, posteaque permansit.

27 Autonomus in Omilo ex capitis vulnere mortuus est 16 die, cum æstate media cominus lapide fuisset percussus secundum futuras in medio sincipite. Hoc me latuit, eum sectione indigere, deceperunt enim me futuræ, in seipsis jaculi læsionem continentes. Postea enim manifestum fuit. Primum quidem ad claviculam, postea autem ad latus, dolor admodum vehemens exortus est, & convulsio utramque manum occupavit. In medio enim capitis & sincipitis habebat ulcus. Sectus est 15. die, nec multum pus prodiit, meninx enim sine putredine apparebat.

*Cornel.  
Celsus.*

(A futuris se deceptum esse Hippocrates memoriæ prodidit, more scilicet magnorum virorum, & fiduciam magnarum rerum habentium. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt.)

28 Famula in Omilo 12 annos nata, ex capitis vulnere



vulnere moritur ætate media, 14. die, convul-  
sio manum sinistram corripiebat, nam in dex-  
tra magis parte habebat vulnus.

40 Hermophili filius ægrotavit undecem diebus:  
Febris tenebat iptum, & non descendebant cibi,  
primum quidem deliravit, nocte vero cessavit,  
sequenti die sine voce jacebat stertens, distortos  
habens oculos, febricitans. Penna vero im-  
missa vomuit bilem atram, & clystere immisso  
stercus multum subiit.

45 Sutor qui in Pityo erat, calceum assuens se-  
se supra genu in femur pupugit, & fere ad di-  
giti longitudinem subulam immerisit. Huic nul-  
lus sanguis effluxit, & vulnus cito coivit. fe-  
mur autem totum intumescebat, & tumor  
ad inguina, & lateris inanitatem extendebatur.  
3tio die mortuus est.

46 Quidam juxta inguen sagitta percussus. quem  
nos vidimus, maxime præter opinionem servatus  
est. Neque enim cuspis exempta est ( erat  
enim admodum in profundo ) neque hæmorrha-  
gia ulla fiebat mentione digna : Neque Phleg-  
mone aderat, neque claudicavit. Nos autem  
cuspidem invenientes exemimus, cum sex jam  
essent anni, ex quo percussus erat. Suspicio  
erat, inter nervos occultatam fuisse cuspidem,  
nullamque venam aut arteriam dissectam esse.

50 Virgo illa pulchra Nerei filia annos 20. nata,  
à muliercula amica ludente, lata manu percussa  
est secundum sinciput, & tunc quidem vertigine  
tenebricosa correpta est, & respiratione pri-  
vata, & cum in domum venisset, statim eam  
febris vehemens corripuit, cum capitis dolore &  
faciei rubore. 7mo die è dextra aure pus prodiit  
foetidum, subrubrum, cyatho amplius, & melius  
se habere videbatur, & sublevata est. Rursus  
in-

intendebatur febris, & in somnum deferebatur nec loqui poterat, & faciei pars dextra trahebatur, difficulter spirabat, et cum tremore convellebatur, et lingua cohibebatur, et oculus stupidus erat, 9no. mortua est.

53 Cuidam, quæ 20 ætatis annum agebat, et pharmacum corruptorium biberat, dolor contigit, et vomitus biliosorum multorum, pallidum et porraceum: cum bibisset, convulsio corripiebat, linguam mandebat. Cum circa 4tum advenissem, ipsi lingua erat magna et nigra, oculorum vero album rubescebat, infonnis erat. 4to die mortua est sub noctem.

74 Magnæ navis Gubernatori anchora digitum indicem et manus dextræ os infernum, confregit; inflammatio successit, sideratio, et febris. Moderate per alvum purgatus est, ex quo calores et dolores mites fuerunt. E digito quiddam decidit. Post 7mum diem moderata sanies exibat. Postea dixit, se omnia non posse lingua enunciare. Prædictum est fore opisthotonum, ad id conferebant maxillæ impactæ, deinde ad cervicem retractæ. Tertio vero in posteriora totus convellebatur cum sudore. 6to die à prædictione mortuus est.

(Libro septimo ubi reperitur eadem historia, quinto die purgatus dicitur. )

85 Adolescens quidam post multum meri potum, in tentorio quodam supinus dormiebat. Huius in os serpens arges irrepsit, & cum sensisset, nec posset loqui, stridit dentibus, et serpentem devoravit, et vehementi dolore afficiebatur, et manus efferebat, ut qui strangularetur, iactavit seipsum, et convulsus, mortuus est.

89 Uxor Epicharmi antequam pareret dysenteria laborabat, vehemens dolor aderat dejectiones sub-

cruent

eruentæ, mucosæ, ubi peperisset, confestim sanata est.

96 Philes filium ex denudatione ossis in fronte, 9no. die febris corripuit, os livorem contraxit, mortuus est.

---

## LIBER SEXTUS.

### EPIDEMIORUM.

---

#### Sectio Prima.

**Q**uibuscumque ex corruptione circa uterum, et tumoribus, in capitis gravitatem convertitur affectus, circa sinciput dolores præcipue accidunt.

6 Menstruæ purgationes mulieribus aquosis diu perseverant, nisi autem celeriter prodeant, intumescunt.

9 Ante rigorem, urinarum suppressiones accidunt, si ex utilibus signis processerint, et alvus permeet, somnique affuerint.

#### Sectio Secunda.

1 Dilatare, constringere, alia quidem oportet alia autem non.

13 Quæ 4to die accidunt sanguinis e naribus eruptiones, difficilem faciunt judicationem. *Lib. 2. Sect. 3.*

15 Quæcumque febres naturam tertianæ induunt, noctem quæ accessionem præcedit, difficilem habent, quæ verò subsequitur, *aph. 13. Sect. 2.*  
ut plurimum leviolem. 7 Nihi



17 Nihil sine consilio suscipiendum, nec quidquam negligendum.

18 Contraria paulatim adhibere oportet, et interquiescere.

*Valesius* Periculosius censeo incidere in medicum, qui nesciat quiescere, quam qui nesciat contraria adhibere. Nam qui nescit quiescere, nescit occasiones contraria adhibendi, quare nescit contraria adhibere. Qui nescit contraria adhibere, tamen, si prudens est, scit quiescere, atque si prodesse non potest, tamen non obest. Præstantissimus tamen est medicus eruditus pariter ac prudens, qui novit festinare lente, pro ipsius morbi urgentia, auxiliis instare, atque in occasione uti maxime opportunis, alioqui quiescere. )

*aph. 68. Sect. 5.* 19. Capitis posteriore parte dolente, secta in fronte vena recta juvat.

22. Lata exanthemata non sunt admodum pruriginosa, qualia Simon habebat per hiemem, qui cum ad ignem inungeretur, aut calida lavaretur, juvabatur. Vomitus non conferebant. Si quis calida fomenta adhibuisset, adjuvari potuisse existimo.

26. In magnis malis, facies si sit bona, signum bonum. In parvis, bonæ significationi contraria denunciatis, malum significat.

33. Ut omnia circa ægrotantem sedulo administrantur, quædam de morbo sunt interroganda, videndum qualia sint, quæ narrant, ut accipiendi sermones, quænam pertinent ad ægrotantem, quæ ad assidentes, et ad externa.

## Sectio Tertia.

1. **C**utis raritas affert alvi densitatem, cutis compactio carnum incrementum, & cerebri consumptio calvitium.

2. Corporis evacuatio, seu detractio fit curribus, luctis, ( quiete ) multa deambulatione, ovilla carne, maza cocta ut plurimum; Et panis exiguus convenit.

3. Cum autem jam conciderint, offerre suillam assam convenit. Cum verò reficiantur, id indicat, quod corpus floridum rursus efficitur.

4. Exercitationum modum significat sudor fluens guttatim, qui exit velut ex canalibus, aut coincidentia ex elevatione.

18. Cum venere uri, aut hircire incipiunt, sanguinem fundunt.

20. Mutationes cavendæ sunt.

24. Sitim cohibet os claudere, tacere, ventum cum potu frigidum inducere.

28. Quibus in morbis, quæ facta sunt liberant, eosdem, si ante fiant, prohibent.

31. In cruenta spuentibus, sanguinis detractio-  
nem prohibet anni tempus, lateris dolor, bilis.

## Sectio Quarta.

7. **Æ** Grotis gratificandum est in istis rebus, ut nimirum potus et cibi mundè præparentur, et quæcunque videt, et tangit, mollia sint; In aliis etiam quæ non valde læ-  
B b dant,

dant, aut facile emendari queant, ut frigida, quum ea opus est. In his etiam ægrotis gratificandum, qualia sunt introitus, sermones, habitus corporis, vestitus, tonsura, ungues et odores.

18 Aqua edax, vigilia edax.

20 Sanitaris tutela est, cibus non satiari, et impigrum esse ad labores.

24 Teriâ siccitatibus squalidâ, volatiliū genus bene se habet.

28 Cibus Labores præcedere debent.

### Sectio Quinta.

**N**aturæ morborum sunt medicatrices.

6 Morbi connutriti in senectute desinunt, concoctione, solutione, et rarefactione.

9 Labor articulis et carnibus confert, visceribus vero cibus et somnus; animæ deambulatio, cogitatio hominibus.

13 Lingua humorum serum quale sit indicat. pallidæ quidem Linguae, ex bilis redundantia fiunt. ( Biliosum autem a pingui ) rubicundæ vero a sanguine, nigræ ab atra bile, aridæ autem ab exustione fuliginosa, et vterque, albe vero a pituita.

15 Lingua concolor est humori prædominanti, ideoque per hanc dignoscimus humores.

16 Si carnes videntur esse salsæ gustanti, redundantiae signum est.

18 Hominibus aurium sordes, dulces quidem lethales, amaræ verò minimè.

19 Terram mutare confert in longis morbis.



21 In diuturnis circa articulos defluxionibus,  
( quæ Κασματα græcis dicuntur ) venas in  
auribus posteriores pertundere oportet.

22 Venus in morbis a pituita utilis.

23 Increscentes morbos coitus exasperat.

32 Ulcera exoriantur, si quis impurus exer-  
citatione utatur.

33 Si mulier aut capra elaterium aut cucume-  
rem sylvestrem comederint, etiam pueri pur-  
gantur.

### Sectio Sexta.

I. "Εκπνοον καὶ ὁ ἰσθμὸν ὅλον τὸ σῶμα.  
Totum corpus tam foras, quam intro spira-  
bile est.

9 Quartana laborantes nullo magno morbo  
corripiuntur, si prius autem corripiantur, &  
quartana superveniat, liberantur.

*Aph. 70*  
*Secl. 5.*

10 Pro quibus, quinam morbi succedant, viden-  
dum.

21 Sputa rotunda delirium significant.

22 Urina multam subsidentiam habens, solvit  
deliria: qualis fuit Dexippi, post defluvium  
capillorum.

23 Quartana non producit ultra annum.  
( Fœsius, non ante annum desinit. )

### Sectio Septima.

2 **A** Nginae hac tempestate ( quam fusc descri-  
bit ) liberis duabus abortæ sunt, eaque

mitissima, servis verò exuberabant, & quibus vehementissima contingebant, eæ celerimè peribant.

3 Sanguinem è venis profluentem sistunt animi deliquium, figura aliorum tendens, linamentum contortum, appositio, deligatio.

5 Hydropicos celeriter secare oportet; tabescentes urere statim, secare caput, & huiusmodi.

---

### Sectio Octava.

---

4. **R**Enum vitia supra quinquagesimum annum sanata non vidi.

19 Continentia, contenta et impetum facientia corpora sunt consideranda.

20 Sermonis et silentii habenda est ratio. Dicere oportet quæ velit æger; quibus sermonibus utatur videndum, siue magni sint, siue multi, siue veri, siue conficti.

46. Contraria victus ratio in morbis instituenda est.

48 Victus ratio quantum fieri potest cognoscenda, nam illius ignoratio multas affert calamitates.

49 Optimis Medicis similitudines imponunt, et difficultates pariunt, sed contraria efficit causa. Et sane difficile est curandi vias rationatione assequi.

52 Satyrus in Thaso cognomento Grypalopex, cum esset annorum circiter 25. Semen per somnum effudit sæpe, et interdium quoque sæpe ipsi prodibat. Cum autem ad annum 30. pervenisset, tabe correptus mortuus est.

54. Melancholici plerumque consueverunt fieri

Aleri epileptici; & epileptici melancholici: horum autem quidvis præcipue fit, prout, in alterutram partem morbus inclinaverit, etenim si in corpus, epileptici fiunt, si autem in mentem, melancholici.

55 Abderis, Phaethula Pythei conjunx, per juventam antea sæcunda fuerat, cum autem vir ipsius in exilium pulsus fuisset, muliebria multo tempore defecerunt, postea verò in articulos dolores, & rubores acciderunt; quæcum ei contigissent, tunc corpus virile factum est, & omnino hirsutum, & barba producta est, & vox aspera reddita; & cum omnia fecissemus ut muliebria elicerentur, non profluxerunt, sed mortua est, cum non diu postea vixisset.

56. Evenit autem & Namysæ Gorgippi uxori in Thaso idem. Videbatur omnibus medicis, quibus & ego forte adfui, unica spes esse, ut in muliebrem naturam reduceretur, si menses secundum naturam prodirent, sed neque huic potuerunt prodire, quamvis omnia tentata. Non multo post mortua est.

## Liber Septimus.

## EPIDEMIORUM.

**C**Auponi, qui peripneumonia laborabat, alvus statim subiit, circa 4<sup>um</sup> diem, sudor multus accidit. Febricula soluta esse videbatur. Tussicula, nulla erat, ut ita, dicam. 5<sup>to</sup>, 6<sup>to</sup> & 7<sup>mo</sup> detinebat febris, sudor octavo



octavo. 9no. excreabat pallidum. 10. affatim, non sæpe deiciebat. Circa undecimum mitius se habuit. 14, Sanus evasit.

Prodromi filius ætate sublæsus, febre ardente laborabat, lingua ipsi subarida, obscura, dejectio multa, servatus.

Isagoræ filius posteriore capitis parte vulneratus est, contuso osse ac denigrato, die quinto liberatus : Os autem non abscessit.

Hippiæ Soror hieme phrenitide correpta est, mente aberrabat, manibus laborabat, seipsam lancinabat. 5to & 6to die, sub noctem voce destituta est. Comatosa buccas & labia veluti dormientes, inflabat. 7mo die mortua est.

Capitis dolores ex utero, castoreum sedat. Plerique hysterici affectus à flatibus ortum ducunt : indicant ructus & strepitus circa ventrem, & tumores lumborum, & dolores circa renes & coxas.

Quibus prægnantibus ex casu aut convulsione, aut plaga, dolores accidunt moderati, intra triduum manifestè constat, an fœtum corrumpent.

Fello qui in Syro Phrenitide laborans cum ustione tremulus fuit. Crurum color erat culicum puncturis similis, oculus magnus, exiguus motus, vox fracta, clara tamen. Urina pura subsidentiam non habens. Nunquid propter dejectionem à Tapfia morbus 18. remisit, sine sudore evanescens.

# L I B E R.

## APHORISMORUM.

Περὶ Ἀποριμῶν.

### Sectio Prima.

1 **V**ita brevis, ars longa, occasio præceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Oportet autem non modo seipsum exhibere quæ oportet facientem, sed & ægrum, & præsentem, & externa.

2 In perturbationibus alvi, & vomitibus sponte evenientibus, si quidem, qualia oportet purgari, purgantur, confert & faciliè ferunt: Sin minus, contra. Sic & vasorum evacuatio, si quidem, qualem fieri decet, fiat, confert, & faciliè ferunt: Sin minus, contra. Respicere igitur oportet & regionem, & tempestatem, & ætatem, & morbos, in quibus convenit, aut non.

*Aph. 2.  
Sect. 4.*

3 Athletarum boni habitus, ad summum progressi, periculosi, si in extremo constituerint: Neque enim possunt in eodem statu permanere, neque quiescere. Cum vero non quiescant, neque ultra possunt in melius proficere, reliquum est, ut in deterius labantur. Horum igitur causa bonum habitum solvere conducit haud cunctanter, quo rursus renutritionis initium corpus sumat. Neque vasorum confidentiæ ad extremum perducendæ: Periculosum enim. Sed qualis natura fuerit ejus qui id per-

perpeſſurus eſt, cò uſque progrediendum. Sic & evacuationes, quæ ad extremum tendunt, periculofæ : & rursus reſectiões, cum extrema fuerint periculofæ.

4 Viçtus tenuis & exquiſitus, cum in morbis longis ſemper, tum in acutis, ubi non convenit, periculofus. Ac rursus qui ad extremum tenuitatis devenit viçtus, gravis. Nam & repletiones ad extremum perductæ, graves ſunt.

5 In tenui viçtu delinquant ægri: ob id magis læduntur. Quicunque enim error committitur, major in tenui fit, quam in paulo pleniore viçtu. Propterea etiam ſanis periculofus eſt valde tenuis viçtus; Quoniam errores gravius ferunt. Hac igitur de cauſa tenuis & exquiſitus viçtus, eo qui ſit paulo plenior, maxima ex parte periculofior.

6 Ad extremos morbos extrema exquiſite remedia optima.

7 Ubi morbus peracutus eſt, ſtatim extremos habet labores, & extreme tenuiſſimo viçtu uti neceſſe eſt. Ubi verò non, ſed plenius licet cibare, tantum a tenui recedendum, quantum morbus remiſſior extremis fuerit.

8 Cum morbus in vigore fuerit, tum vel tenuiſſimo viçtu uti neceſſe eſt.

9 Conſpicere oportet, num ſufficiat ægro is viçtus uſque ad morbi vigorem, & utrum prius ille deficiet, neque cum eo viçtu perdere poterit, vel morbus ante deficiet & remittet.

11. In paroxyſmis cibum ſubtrahere oportet; exhibere enim noxium. Et quicunque morbi per periodos exacerbantur, in eorum



paroxysmis subtrahere oportet.

13 Senes facillime jejunium ferunt, deinde qui constanti sunt ætate, minime adolescentes, omnium minime pueri, præsertim illi, qui inter ipsos sunt vividiores.

14 Quæ crescunt, plurimum habent calidi innati : Plurimo igitur egent alimento : sin minus, corpus consumitur. Senibus verò parum calidi inest, paucis propterea fomitibus indigent, quia a multis id extinguitur. Hanc ob causam senibus febres non perinde acutæ fiunt : trigidum enim eorum corpus.

15 Ventres hieme & vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi. Per ea igitur tempora copiosiora alimenta sunt exhibenda, siquidem calidi innati plus habent, unde & copiosiore indigent alimento ; indicium sunt ætates & Athletæ.

16 Victus humidus febricitantibus omnibus confert, maximè verò pueris, & aliis qui tali victu uti consueverunt.

17 Et quibus semel aut bis, plura aut pauciora, & per partes offerre oporteat, considerandum. Concedendum autem aliquid tempestati anni, regioni, ætati & consuetudini.

18 Æstate & autumnno cibos difficillimè ferunt, hieme facillimè, deinde vere.

20 Quæ judicantur & judicata sunt perfectè, ne moveto, neque innovato, siue purgantibus medicamentis, siue aliis irritamentis, sed finito.

21 Quæ ducere oportet, quo maximè vergant, eò ducenda, per loca convenientia.

22 Concocta medicamento purgante educenda, & movenda, non cruda, neque per initia, nisi turgeant, ut plurimum verò non turgent.

23 Excreta non copia sunt æstimanda, sed si qualia oportet exeant, & facile ferat æger. Atque ubi ad animi defectionem educere expedit, faciendum id quoque, si æger par esse possit.

24 In acutis morbis rarò, & in principiis, medicamentis purgantibus utendum, idque diligenti ante adhibita circumspeditione faciendum.

## Sectio Secunda.

I **Q**uo in morbo somnus noxam adfert, lethale. Si verò somnus proffit, minime lethale.

2 Ubi delirium somnus sedaverit, bonum.  
*Aph. 7 I*  
*Sect. 7.* 3 Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum.

5 Spontaneæ lassitudines morbos denunciant.

6 Qui aliqua corporis parte dolentes, fere dolorem non sentiunt, iis mens ægrotat.

7 Quæ longo tempore extenuantur corpora, lente reficere oportet: quæ vero brevi, celeriter.

8 Si a morbo cibum capiens quispiam, vires non recipiat, copiosiore alimento corpus uti significat. Si verò cibum non capienti, idem eveniat, vacuatione indigere sciendum est.

9 Corpora ubi quis purgare volet, facile fluentia reddere oportet.

10 Impura corpora, quo plus nutriveris, eo magis lædes.

II Faci-

11 Facilius est potu refici, quam cibo.  
 12 Quæ in morbis post crisin relinquuntur, recidivas facere solent.

13 Quibus crisis fit, his nox accessionem præcedens, gravis. subsequens verò, levior plerumque.

14 In profluviiis alvi, mutationes excrementorum juvant, nisi in prava mutantur.

16 Ubi fames, laborandum non est.

19 Morborum acutorum non omnino certæ sunt prædictiones, neque mortis, neque salutis.

20 Quibus per juventutem, alvi sunt humidæ, iis senescentibus exsiccantur: quibus vero in juventute, alvi sunt siccæ, iis senescentibus humectantur.

21 Famem, vini potus solvit.

22. Morbos, qui a repletionem fiunt, curat *Lib. de nat. hom.* evacuatio; eos verò qui ex evacuatione, repletio: & in cæteris contrarietas remedio est.

23 Morbi acuti judicantur intra dies 14.

24 Index septimi quartus. Sequentis septimanæ Octavus initium. Spectandus quoque est undecimus, siquidem is secundæ septimanæ quartus est. Rursumque 17. spectandus: Is enim a quarto decimo quartus est, & ab undecimo septimus.

25 Æstivæ quartanæ plerumque breves sunt: Autumnales verò longæ, & maxime quæ ad hiemem pertingunt.

26 Febrem convulsioni supervenire satius est, quam convulsionem febri.

27 Iis quæ non cum ratione sublevant, non oportet fidere. Neque multum formidare mala quæ præter rationem eveniunt. Plurima enim horum incerta sunt, nec admodum



dum perseverare, aut longo tempore durare consueverunt.

29 Incipientibus morbis, si quid movendum videtur move: Vigentibus autem, quiescere melius est.

31 A morbo belle comedenti, nihil proficere corpus, malum est.

33 In quovis morbo valere ratione, recteque se ad ea quæ offeruntur habere, bonum. Contrarium verò malum.

34 In morbis minus periclitantur, quæ naturæ, & ætati, & habitui, & anni tempestati morbus magis cognatus fuerit, quam quibus in nullo horum cognatus fuerit.

35 Omnibus in morbis, partes quæ ad umbilicum & imum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est: Valde verò tenues & tabefactas esse, pravum. Periculosum verò illud est, etiam ad infernas purgationes.

36 Sana habentes corpora, pharmacia purgati citò exolvuntur, ut & qui pravo utuntur cibo.

38 Paulo deterior, & potus, & cibus, suavior tamen, melioribus quidem, sed insuavioribus, præferendus.

39 Magnam partem Senes Juvenibus minus ægrotant: Quicumque verò morbi iis accidunt diuturni, plerumque commoriantur,

40 Raucedines & gravedines, in valde Senibus non coquuntur.

41 Qui sæpe & vehementer, sine causa manifesta, animo linquantur, ii derepente moriuntur,

42 Solvere Apoplexiam, vehementem impossibile quidem, levem vero non facile.

43 Ex iis, qui strangulantur, & dissolvuntur,

nec dum tamen mortui sunt, non se recolli-  
gunt, quibus spuma circa os fuerit.

44 Qui natura sunt valde crassi, magis su-  
bito moriuntur, quam graciles.

45 A Comitiali morbo, juvenes mutatione  
potissimum ætatis, & regionum, & victuum,  
liberationem accipiunt.

47 Dum pus fit, dolores ac febres accidunt  
magis, quam confecto.

49 Consueti solitos labores ferre, etsi fue-  
rint invalidi aut Senes, non consuetis, quam-  
vis robustis & Juvenibus, facilius terunt.

50 Consueta longo tempore, etiamsi de-  
teriora sint, insuetis minus molesta esse solent;  
quare ad insolita quoque facienda mutatio.

51 Plurimum & repente vacuare, vel re-  
plere, vel calefacere, vel refrigerare, aut alio  
quovis modo corpus movere, periculosum :  
Omne siquidem nimium, naturæ inimicum.  
Paulatim vero quod fit, tutum, & præsertim si  
quis ab uno ad aliud transierit.

52 Omnia secundum rationem facienti, si  
non succedant secundum rationem, non est tran-  
seundum ad aliud, manente eo, quod ab initio  
visum fuit.

53 Quicumque alvos humiditas habent, dum  
Juvenes sunt, melius degunt his qui siccas ha-  
bent. At in senectute deterius degunt; nam  
senescentibus ut plurimum siccantur.

---

### sectio Tertia.

**S**Ex primos Aphorismos hujus sectionis, vide  
supra lib. de humoribus.)

7 Per siccitates febres acutæ fiunt; Et si-  
qui-

quidem annus magna ex parte talis extiterit, qualem fecit constitutionem, ut plurimum etiam tales morbos expectare oportet.

8 Constantibus temporibus, si tempestiva tempestive fiant, morbi stabiles, et boni iudicii accidunt. Inconstantibus autem, instabiles, & mali iudicii.

9 Autumno in universum morbi acutissimi & perniciosissimi: Ver autem saluberrimum & minimè exitiale.

10. Autumnus tabidis malus.

*Lib. de  
aere, lo-  
cis &  
Aquis.*

11 Inter anni partes, si hiems sicca & aquilonia, ver pluviosum & australe fuerit, & stare necesse est febres acutas fieri, & ophthalmias, & dysenterias, mulieribus præsertim, & viris natura humidioribus.

*Lib. de  
aere, lo-  
cis &  
Aquis.*

12 At si australis hiems, & pluviosa, & clemens fuerit, ver autem siccum & aquilonium, mulieres quibus partus in ver incidit, quavis occasione abortiunt: Quæ vero pepererint, infirmos & morbosos infantes edunt, ita ut vel statim intereant, vel tenues, & valerudinarii vivant. Cæteris vero mortalibus dysenteria, & ophthalmia sicca fiunt, & Senibus catarrhi perniciem brevi allaturi.

*Lib. de  
aere, lo-  
cis &  
Aquis.*

13 Si verò æstas sicca & aquilonia fuerit, autumnus autem pluviosus & australis, capitis dolores ad hiemem fiunt, & tussis, & raucedines, & gravedines, nonnullis etiam tabes.

14 Si verò aquilonius sit & siccus autumnus, hominibus natura humidis, & mulieribus commodus: Reliquis verò, ophthalmia sicca accident, & febres acutæ, & gravedines diuturnæ, nonnullis verò etiam melancholia.

15 Ex constitutionibus anni, in universum siccitates assiduis imbris sunt salubriores, & minus mortiferæ.

16 Assiduis



16 Assiduus inbibus morbi fere fiunt, febres longæ, fluxiones alvi, putredines, epilepsia, apoplexia, angina. Siccitatibus autem, morbi tabifici, ophthalmia, articulorum dolores, urinæ & intestinorum difficultates.

17 Quotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem, cogunt corpora, & firma, agilia, beneque colorata, ac auditu valentiora reddunt, alvum siccant, oculos mordent, & si pectus dolor aliquis prius habuerit, exasperant: At austrinæ, corpora exolvunt, & humectant, auditum hæbetant, caput gravant, vertiginem oculis, tarditatem corporibus adferunt, alvum humectant.

18 Per tempora verò anni, vere quidem, & prima æstate, pueri, & his ætate proximi, optime degunt, valentque maxime. Æstate verò, & autumno ad aliquam quidem partem, Senes. Reliquo autumno & hieme, qui mediam ætatem agunt.

20 Vere fiunt furores, melancholia, epilepsia, fluxiones sanguinis, angina, gravedines, raucedines, tussis, lepra, impetigines, vitiliginis, & pustulæ ulcerosæ plurimæ, tubercula, articulorum dolores.

21 Æstate verò, nonnulli horum, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, quartanæ item, & vomitiones, alvi profluvia, ophthalmia, aurium dolores, oris ulcerationes, genitalium putredines, & sudationes.

22 Autumno, æstivi etiam multi morbi fiunt, & febres quartanæ, & erraticæ, lienes, aquæ inter cutem, tabes, urinæ stillicidia, lienteria, dysenteria, coxæ dolores, angina, asthmata, volvuli, epilepsia, insanix, melancholia.

23 Hieme

23 Hieme vero, pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, gravedines, raucedines, tusses, pectoris, laterum, lumborum, & capitis dolores, vertigines, apoplexiæ.

24 In ætatibus autem talia eveniunt, parvis quidem & recens natis pueris, aphthæ, vomitus, tusses, vigilæ, pavores, umbilici inflammationes, aurium humiditates,

25 Ad dentitionem vero accedentibus, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, & maximè ubi caninos dentes producunt, & iis qui inter pueros sunt crassissimi, & qui alvos duras habent.

26 Ipsis vero grandiusculis, consillarum inflammationes, vertebæ in occipitio introrsum luxationes, asthmata, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ pensiles, satyrismi, strumæ, & alia tubercula, præcipue ante dicta.

27 Grandioribus adhuc, & ad pubertatem accedentibus, plurima ex his, & febres diurnæ potius, & ex naribus sanguinis fluxiones.

29 Juvenibus autem, sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, epilepsiæ, & alii morbi, sed præcipue supra nominati.

30 Ultra hanc ætatem provectis, asthmata, pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alvi profluvia diuturna, cholera, dysenteria, lienteria, hæmorrhoides.

31 Senibus, spirandi difficultates, catarrhi tussiculosi, stranguriæ, dysuriæ, articularum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiæ, mali corporis habitus, pruritus totius corporis, vigilæ, alvi, oculorum, & narium humiditates,

rates, visus hebitudines, glaucomata, auditus graves.

## Sectio Quar ta.

**P** Rægnantes purgabis, si materia turgeat, *Apb. 29*  
quadrimestres, & usque ad septimum *Sect. 5.*  
mensẽ, sed has parcius. Juniores autem &  
Seniores caute vitare oportet.

4 Æstate superiores Potius ventres, hieme verò  
interiores purgandi.

5 Sub cane, & ante canem, difficiles sunt  
purgationes.

6 Graciles, & ad vomendum faciles, sur-  
sum purgandi, caventes hiemem.

7 Difficulter autem vomentes, & medio-  
riter carnosì, deorsum, caventes æstatem.

8 Tabidi verò, vitantes purgationes per  
superiora.

10 Purgandum in valde acutis, si turgeat  
materia, eodem die, differre enim in talibus,  
malum.

11 Quibus tormina adsunt, & circa umbi-  
licum dolores, & lumborum dolor, qui neque  
medicamento, neque aliter solvatur, in siccum  
hydropem firmatur.

13 Ad helleboros, qui non facile sursum  
purgantur, iis ante potionem corpora præhu-  
æstanda, copiosiore alimento, & quiete.

14 Poto Helleboro, corpus movendum po-  
tius, quam somno tradendum, aut quieti.  
Nam vel navigatio indicat, motione turbari  
corpora.

15 Quum helleborum magis ducere voles,  
D d move



move corpus: Quum veró sistere, somnum concilia, nec move.

*Aph.* 36  
*Señ.* 2.

16 Helleborus periculosus sanas carnes habentibus. Convulsionem enim inducit.

17 Non febricitanti, cibi fastidium, oris ventriculi morsus, vertigo tenebricosa, & oris amaritudo, purgatione per superna opus esse, significat.

18 Supra septum transversum dolores, qui purgatione egent, sursum purgare opus esse, indicant. Qui veró infra, deorsum.

19 Qui potione medica dum purgantur non sitiunt, purgandi finis non fit, donec sitiverint.

20 Febris expertibus si tormina adsint, & genuum gravitas, & dolor lumborum, inferna purgatione opus esse, significant.

*Coac.*  
608.

21 Excrementa alvi nigra sanguini atro similia, sponte euntia, sive cum febre, sive citra febre, pessima. Et quanto ipsorum colores pravi fuerint plures, eo deterius. A medicamento autem talia exigi, melius est. idque quanto ipsorum plures fuerint colores, non malum.

22 Morbis quibuscumque incipientibus, si atra bilis supra infrave exierit, lethale.

23 Quibus per morbos acutos, aut diuturnos, aut vulnera, aut alio modo extenuatis, atra bilis, aut velut sanguis niger, prodierit, postmodum moriuntur.

24 Dysenteria, si ab atra bile incipiat, lethalis est.

25 Sanguinem superné quidem efferri, qualiscunque sit, malum. Inferné veró niger si deiciatur, bonum.

28 Quibus dejectiones sunt biliosæ, furditate

rate superveniente, cessant: Et quibus furditas adest, biliosis dejectis, finitur.

29 Febricitantibus, si sexto die rigores fiant, difficulter judicantur. *Coac. I 5*

37 Frigidi sudores, cum febre quidem acuta, mortem: Cum mitiore vero, morbi longitudinem significant,

38 Qua corporis parte, sudor est, ibi morbum esse significat.

41 Sudor multus per somnum citra causam manifestam factus, copiosiore cibo corpus uti significat: Quod sicibum non assumenti hoc accadat, vacuatione indigere significat.

43 Febres quæ tertio quoque die vehementius affligentes non intermittunt, periculosiores: Quoquo modo autem intermiserint, periculum abesse significant. *Aph. 62 Sect. 7. Aph. 63.*

44 Quos febres longæ exercent, his tubercula ad articulos, vel dolores fiunt. *sect. 7. Aph. 64*

45 Quibus tubercula ad articulos, vel dolores, post febres diuturnas, fiunt, ii cibariis plurimis utuntur. *sect. 7.*

46 Si rigor, febre non intermittente, ægrum jam debilem frequenter invadat, mortiferum est.

48 In febribus non intermittentibus, si partes externæ algeant, internæ urantur, & sitiunt, lethale est. *Aph. 1. Sect. 72. sect. 7.*

57 Spasmo aut Tetano vexato, febris si accesserit, morbum solvit.

59 Tertianæ exquisita septenis ad summum circuitibus, judicatur.

60 Quibus per febres aures obsurduerint, his sanguis ex naribus profluens, aut perturbata alvus, solvit morbum.

61 Febricitantem nisi diebus imparibus febris

bris reliquerit, solet reverti.

62 Quibus per febres icterus supervenerit, ante diem Septimum, malum.

63 Quibus in febribus quotidie rigores repetunt, quotidie febres solvuntur.

64 Quibus per febres icterus die 7mo, Aut 9no, Aut undecimo, aut decimo quarto, supervenerit, bonum, nisi dextrum hypochondrium durum sit, alioqui minimè bonum.

70 Quibus per febres urinæ turbatæ quales jumentorum, iis dolor capitis vel adest, vel aderit.

71 Quibus die septimo futura crisis est, iis urina rubram die quarto nubeculam habet.

72 Quibus pellucidæ & albæ sunt urinæ; malæ: Maxime verò tales in phreniticis apparent.

74 Quibus spes est ad articulos abscessum futurum, abscessu liberat urina multa, crassa, et alba reddita: Qualis in febribus cum lassitudinis sensu, quarto die exire incipit. Quod si ex naribus etiam sanguis profluxerit, brevi admodum solutio fit.

75 Si quis sanguinem, aut pus meiat, renum aut vesicæ exulcerationem significat.

76 Quibus cum urina crassa, exiguæ carunculæ, aut velut pili una exeunt, his a renibus excernuntur.

77 Quibus cum urina crassa, fursurea quædam simul minguntur, his vesica scabie laborat.

78 Qui sponte sanguinem meiant, iis a renibus venulam ruptam esse significat.

79 Quibus in urina subsident sabulosa, iis vesica calculo laborat.

80 Si quis sanguinem, aut grumos meiat, aut



aut urinam guttatim emittat, & dolor ad i-  
num Ventrem, ac interfoeminum incidat,  
ea quæ circa vesicam sunt laborant.

81 Si quis sanguinem, aut pus, aut squammulas  
meiat, & gravis odor adsit, vesicæ exul-  
ceratio significatur.

83 Mictus noctu plurimus parvam dejecti-  
onem significat.

### Sectio Quinta

1 **C**ONvulsio ab helleboro, lethalis.

2 Convulsio vulneri superveniens, *Aph. 25*  
lethalis. *Sett. 7.*

3 A copioso sanguinis fluxu, singultus,  
aut convulsio, malum.

4 A purgatione immodica, convulsio, aut  
singultus superveniens, malum.

5 Si ebrius quispiam derepente obmutef-  
cat, convulsus moritur, nisi febre corripiatur,  
aut ubi ad horam pervenerit, qua crapulæ  
solvuntur, vocem recuperet.

6 Qui Tetano corripiuntur, intra 4 dies in-  
tereunt: Si verò hos superaverint, incolumes  
evadunt.

7 Epilepsia, quibus ante pubertatem con-  
tingit, mutationem recipit: Quibus post 25  
annum, eos ferè comitatur ad mortem us-  
que.

8 Qui pleuritide laborant, nisi intra 14 dies  
supernè repurgentur, iis in empyema fit mali  
translatio.

9 Tabes iis maximè ætatibus fit, quæ a  
decimo

decimo octavo sunt anno, ad tricesimum quintum.

10 Quibus ex angina liberatis, ad pulmonem mali fit conversio, ii intra dies septem moriuntur: Si vero hos effugerint, purulenti evadunt.

11 Qui tabe vexantur, si sputum quod extussunt, carbonibus injectum olet graviter, & capilli a capite defluunt, lethale.

13 Qui spumantem sanguinem extussunt, iis ex pulmone educitur.

14 Si tabe detento profluvium alvi superveniat, lethale.

15 Qui ex pleuritide empyi fiunt, si aruptione intra dies 40. sursum purgentur, liberantur: Alioqui transeunt in tabem.

18 Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, dorsali medullæ, calidum verò amicum.

24 Frigida pectori inimica, tussis movent, sanguinis fluxiones, & destillationes efficiunt.

25 Articulorum tumores & dolores absque ulcere, atque etiam podagricos, & convulsionones, magna ex parte, frigida largè effusa levat, & extenuat, solvitque dolorem. Torpor enim modicus doloris solvendi vim habet.

28 Suffitus aromatum muliebria educit.

30 Mulierem gravidam morbo quopiam acuto corripit, lethale.

31 Mulier in utero gerens secta vena abortit: Et magis, si major fuerit foetus.

32 Mulieri sanguinem evomenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.

33 Mulieri, menstruis deficientibus, sanguis è naribus profluens; bonum.

34 Mulier

34 Mulieri uterum gerenti, si alvus multum fluat, periculum est ne abortiat.

35 Mulieri hystericae, aut difficulter parienti, sternutamentum superveniens, bonum.

36 Mulieri menses decolores, nec eodem semper modo & tempore prodeuntes, purgationem indicant esse necessariam.

37 Mulieri in utero gerenti, si mammae subito extenuentur, abortit.

39 Si mulier quae nec praegrans, nec puerpera est, lac habet, ei menstrua defecerunt.

44 Quae praeter rationem tenues uterum gerunt, abortiunt donec habitiores evaserint.

45 Quae mediocriter corpulentae, abortum faciunt secundo mense, aut tertio, sine occasione manifesta, iis acetabula uteri mucoris sunt plena, nec praepondere fatum continere possunt, sed abruptuntur.

46 Quae praeter naturam crassae non concipiunt, iis uteri os ab omento comprimitur, & priusquam extenuentur, non concipiunt.

49. Ad secundas deturbandas, sternutatorio immisso, nares & os comprimito.

57 Menstruis abundantibus morbi eveniunt, Et subsistentibus accidunt ab utero morbi.

60 Si praegrans purgationes menstruae cursum suum teneant, bene valere foetum est impossibile.

61 Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente, cibique fastidia ei accidunt, praegnantem esse putato.

62 Quae frigidos & densos uteros habent, non concipiunt: Et quae praehumidos uteros habent, non concipiunt: Extinguitur enim in ipsis genitura. Et quae plus aequo siccos & adurentes:

Nam



Nam alimenti defectu semen corrumpitur. Quæ  
verò ex utrisque moderatam naturæ sunt tempe-  
riem, eæ fecundæ evadunt.

64 Lac præbere capite dolentibus, malum,  
Malum verò & febricitantibus, & quibus hypo-  
chondria elata, aut murmurantia, & siticulosi.  
Malum item quibus biliosæ dejectiones, febres acu-  
tæ, copiosa sanguinis evacuatio facta est. Conve-  
nit vero tabidis non admodum febricitantibus,  
& in febribus longis & languidis, dum nullum ex  
supradictis signis adsit, & præter rationem  
extenuatis.

*Lib. 2.* 68 Parte capitis posteriore dolenti, in fron-  
*Epid.* tem excurrentes vena incisa, prodest.

*Seç. 3.* 69 Rigores incipiunt mulieribus ex lumbis  
*Lib.* magis, & per dorsum perveniunt in caput:

*6. seç. 3* Viris vero parte corporis posteriore magis quam  
antere, veluti ex femoribus, & cubitis. Ar-  
gumento est cutis raritas quam pilus ostendit.

70 Qui quartana corripiuntur, non admo-  
dum convulsionibus tentantur: Si vero prius  
tentati fuerint, superveniente quartana, libe-  
rantur.

## Seçtio Sexta.

*Lib. 2.*

*Epid.*

*Seç. 2*

1 **I**N diuturnis lævitatibus intestinorum, si ru-  
ctus acidus superveniat, qui prius non ex-  
titerit, bonum est signum.

2 Quibus nares humidiores natura, & ge-  
nitura humidior, ii minus prospera valetudine  
fruuntur: Quibus vero hisce contraria adsunt,  
Salubrius degunt.

3 In longis intestinorum difficultatibus ci-  
bi

bi fastidium, malum. Et cum febre pejus. *Lib. 6.*

4 Circumglabra ulcera, maligna. *Epid.*

6 Renum & vesicæ vitia in senibus diffi- *sect. 8.*  
culter curantur.

8 Hydropicis ulcera in corpore orta, non facile sanantur.

10 Caput dolenti, & vehementer laboran-  
ti, pus, aut aqua, aut sanguis per nares, os,  
aut aures, effluens, morbum solvit.

11 Melancholicis, & nephriticis, hæmor-  
rhoides supervenientes, bonum.

12 A diuturnis hæmorrhoidibus curato, ni-  
si una quæpiam seruetur, periculum hydropis  
vel tabis impendet.

13 Singultu detento, si sternutamenta su-  
pervenerint, singultum tollunt.

14 Hydrope detento, si aqua è venis in  
ventrem confluerit, solutio fit.

15 Longo alvi profluvio laboranti, sponte  
vomitus superveniens, alvi profluvium solvit.

16 Pleuritide aut peripneumonia detento,  
alvi profluvium superveniens, malum.

17 Ophthalmia laborantem, alvi proflu-  
vio corripit, bonum.

18 Cui perfecta est vesica, aut cerebrum,  
aut cor, aut septum transversum, aut aliquod  
ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut  
hepar, lethale.

19 Ubi dissectum fuerit os, aut cartilago,  
aut nervus, aut genæ pars tenuis, aut pre- *Aph 28*  
putium, neque augetur, neque coalescit. *sect. 7.*

21 Infanis, si varices, vel hæmorrhoides  
supervenerint, infantiæ solutio.

23 Si metus & mæstitia multo tempore  
perseverent, melancholicum est signum.

24 Si quod gracile intestinum perfectum

fit, non coalescit.

25 Erysipelas foras intro converti, malum: intus vero foras, bonum.

26 Quibus in febre ardente tremores fiunt, delirium solvit.

27 Quicumque empyi, aut hydropici uruntur, aut secantur, si pus, aut aqua universum effluerit, omnino moriuntur.

28 Eunuchi non laborant podagra, neque calvi fiunt.

29 Mulier non laborat podagra, nisi menses ipsi defecerint.

30 Puer non laborat podagra, ante veneris usum.

31 Oculorum dolores meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut purgatio solvit.

33 Qui acidum ructant, non admodum pleuritici fiunt.

*Aph* 47 35 Hydropicis tussis superveniens, malum.

*Secl.* 7. 36 Difficultatem urinæ phlebotomia solvit.

*Aph* 49 37 Ab angina detento tumorem fieri in collo, bonum: Foras enim morbus vertitur.

*Secl.* 7. 10, bonum: Foras enim morbus vertitur.

38 Quibus occulti cancri fiunt, non curare melius: Curati enim citius intereunt.

39 Convulsio vel a repletionem fit, vel ab inanitione: Ira vero & singultus.

42 In ictericis hepar durum fieri, malum.

43 Qui lienosi dysenteria corripuntur, iis post longam supervenientem dysenteriam, hydrops, aut lienteria accidit, & moriuntur.

45 Quæcunque ulcera annua sunt, aut longiore tempore durant, in iis os abscedere est necesse, & cicatrices cavas fieri.

46 Qui gibbi ex asthmate aut tussi ante pubertatem fiunt, moriuntur.

47 Qui-



47 Quibus venæ sectio, aut purgatio pro- *Aph. 53*  
dest, his vere secunda vena, aut purgatio im- *sect. 7.*  
peranda.

48 Lienosis dysenteria superveniens, bo-  
num.

49 Qui podagrici morbi fiunt, sedata inflam-  
matione, intra dies 40. conquiescunt.

50 Quibus divisum est cerebrum, his febrem  
& biliosum vomitum supervenire est necesse.

51 Qui valentes capitis repente doloribus  
corripiuntur, & protinus muti fiunt, & stertunt,  
intra dies septem intereunt, nisi febris eos pre-  
benderit.

53 Deliria quæ cum risu fiunt, tutiora: quæ  
vero studio adhibito, periculosiora.

55 Dolores podagrici vere, & autumnio  
serè moventur.

57 Apoplectici fiunt maximè à quadragesi-  
mo anno, ad sexagesimum.

58 Si omentum exciderit, necessario compu-  
trefcit.

59 Quibus longo coxendicum dolore con-  
flictatis, femoris summum coxa excidit, rur-  
susque recidit, iis mucrescunt.

60 Quibus diuturno dolore ischiadico vexa-  
tis femur excidit, iis crus contabescit, & clau-  
dicant, nisi urantur.

## Sectio Septima.

10 **A** B ileo vomitus, vel singultus, vel con-  
vulsio, vel delirium, malum.

11 **A** pleuritide, peripneumonia, ma-  
lum.

- 12 A peripneumonia, phrenitis, malum.
- 14 Propter plagam in capite acceptam, stupor, aut desipientia, malum.
- 15 Ex sanguinis sputo, puris sputum, malum.
- 16 A puris sputo, tabes, & fluxus: quum vero sputum sistitur, moriuntur.
- 17 Inflammationi hepatis si supervenerit singultus, malum.
- 22 A diuturno partium ad ventrem attinentium dolore, suppuratio.
- 23 A sincera dejectione, dysenteria, malum.
- 27 Si prægnanti tenesmus supervenerit, abortum facit.
- 29 Si Leucophlegmatia detento, fortis diarrhæa supervenerit, morbum solvit.
30. Quibus per diarrhæam spumosa, sunt alvi excrementa, iis a capite effluunt talia.
- 31 Quibus per febres in urinis sedimenta crassiorem farinam referunt, longam invale-  
tudinem fore significant.
- 32 Quibus in urinis biliosa sedimenta, sed supra tenuia apparuerint, acutum morbum significant.
- 33 Quibus divulsæ sunt urinæ, iis vehemens fit in corpore perturbatio.
- 34 Quibus in urinis bullæ innatant, nephritim, & longam fore invale-tudinem significant.
- 35 Quibus in urina adipalis superficies est, & conferta, iis nephriticum, & acutum morbum adesse significat.
- 37 Qui sanguinem evomunt, si sine febre, salutare; si cum febre, malum. Curatio perficitur refrigerantibus, & astringentibus.
- 39 Si quis sanguinem & grumos meiat, & stran-

stranguria laboret, dolore ad hypogastrium, & pectinem, & perinæum pertinente, ad vesicam loca laborant.

40 Si subito lingua impotens reddatur, vel aliqua corporis pars attonita stupeat, planè id melancholicum est.

44 Si empyis cum uruntur, aut secantur, purum & album pus effluat, evadunt: Si vero subcruentum, sæculentumque & fætidum, pereunt.

45 Quibus purulentum jecur adurit, si purum pus effluat & album, salvi fiunt: In tunica enim ipsis pus continentur. Si vero qualis amurca profluat, intereunt.

46 Dolores oculorum post meraci vini potum, & aquæ calentis copiosæ balneum, venæ sectione curato.

48 Urinæ stillicidium, ac meiendi difficultatem, vini meraci potus, & venæ sectio solvit.

50 Quibus cerebrum syderatum est, intra tres dies intereunt: Si vero hos superaverint, sani fiunt.

52 Quibus hepar admodum dolet, iis febris superveniens solvit dolorem.

56 Anxietudinem, oscitationem, horrorem, vinum pari aquæ portione temperatum, solvit.

58 Quibus occasione aliqua cerebrum fuerit vehementer concussum, mutos protinus fieri necesse est.

59 Corporibus, humida carne præditis, imperanda fames est: Nam fames siccatur corpora.

Sectio



## Sectio Octava:

## Quæ Spuria Habetur.

55 **E**x morbo diuturno, alvi fluor, malum,  
 6 Quæcunque non sanant medica-  
 menta, ea ferrum sanat, quæ ferrum non sa-  
 nat, ea ignis sanat, quæ ignis non sanat, ea  
 incurabilia, judicare oportet.

## S E C T I O O C T A V A.

Continens. Τα ἰσχυρά.

## Ex Epistola ad Cratevam.

**S**ucci omnes, & fluidi liquores in vitreis  
 vasis adferantur: Folia, flores & radi-  
 ces, in fistilibus novis probe obturatis, ut ne  
 ventis diffolata vim medicam perdant.

Cum ab omni arte aliena sit procrastina-  
 tio, tum verò maximè in Medicina, in qua  
 dilatio, vitæ periculum adfert. Temporum  
 autem opportunitates curationum sunt animæ.

Multa nos mortales latent.

Neque enim ei qui in periculo constitutus  
 est, satis sunt quæ possumus, verum etiam  
 quæ non possumus expetit.

## Ex Epistola ad Damagetum.

**T**otus homo ab ipso ortu morbus est. Dum  
 educatur inutilis, auxilium supplex im-  
 plorat,

plorat; Dum increfcit, improbus & demens  
 eft, institutione puerili indigens; In ætatis vi-  
 gore conftitutus, audax; Ætate marcefcens,  
 miserabilis, fuos labores per imprudentiam ex-  
 colens.

Ægrotantes fimul ac fervati funt, cau-  
 fam Diis, vel Fortunæ attribuunt.

---

### Ex Epiftola ad Democritum.

**I**N arte Medica quæ recte fiunt, plerumque  
 quidam hominum vulgus non admodum  
 laudat, sæpe vero Diis attribuit. At fi in ali-  
 quo repugnans natura, eum qui curatur, in-  
 teremerit, Numen prætermittens, Medicos in-  
 cufat: Et Ego fane plus reprehenfionis, quam  
 honoris ex arte mihi confecutus videor. Neque  
 enim quantumvis jam Senex, ad artis medicæ  
 finem perveni, neque etiam ipfius inventor  
 Æfculapius.

---

### De Veratri purgatione.

**Q**ui non facile per fuperiora purgantur, *Aph. 13*  
 iis corpora copiofiore cibo & quiete, *feñ. 4.*  
 ante potionem humectanda funt.

Post veratri purgationem, corpora magis  
 ad motionem, quam ad fomnos adducenda. *Aph. 14*  
 Quod vero motio corpora turbet, id indicat *feñ. 4.*  
 navigatio.

Ex

Ex Democrati Epistola ad  
Hippocratem, de Natura  
humana.

**V**esicæ vicina infantium mater, gravis calamitas, sexcentarum ærurnarum mulierum author, uterus delitescit.

---

Ex Epistola ad Demetrium  
Regem.

---

**H**umanorum morborum radix caput est, ex eoque maximæ ægrotationes adveniunt, cum enim toti corpori incumbat, eorum omnium quæ ingeruntur reliquias, & tenues humores, non secus ac cucurbitulam attrahere contingit.

---

De Purgatoriis Remediis.

---

**A**n te omnia biliosis oportet propinare cholagogum pharmacum, pituitosis, phlegmagogum, hydropicis, hydrogogum, melancholicis, melanogogum.

Fæda est calamitas, pharmaco purgatorio hominem interiisse.

Qui validis febribus impliciti jacent, his non ante febris remissionem, pharmaca dare oportet.



oportet; sin minus, cunctandum saltem ne intra  
decimum quartum diem.

## De Hominis Structura.

**S**anguinis locus, & spiritus in corde est: A  
dextris quidem ejus sanguis, a sinistris  
vero spiritus consistit.

Venæ a corde sanguinem sumunt, per quas  
corpori distribuitur.

**FINIS.**

**F f**

( )  
A D D I T A M E N T U M.

Paucula hæc omiffa ad fuum quæque locum  
ita revocentur.

Pag 3. ad finem libri de lege.

**H**æc vero cum sacra fint, facris hominibus  
demonftrantur, profanis vero nefas pri-  
usquam ſcientiæ facris initiati fueint.

Ad paginam 58.

**I**N pulmonis inflammationibus, ſi lingua to-  
ta alba fiat, ac aspera, ambæ pulmonis  
partes inflammatione vexantur, quibus vero  
dimidiata lingua, qua parte id apparet, in-  
flammatio affligit. Et quibus ad unam clavi-  
culam dolor fit, his ſuperna pulmonis ala una  
ægotat: Quibus vero ad ambas claviculas  
dolor extenditur, ambæ ſupernæ pulmonis alæ  
ægotant. Quibus ad mediam coſtam, me-  
dia. Quibus ad discriminationem ( i. e. Ad  
ſeptum tranſverſum ) inferna,

Ad Paginam 86.

Pro initio libri de Septimeſtri partu.

**S**eptimeſtres naſcuntur diebus centum &  
octoginta duobus, & inſuper addita qua-  
dam diei particula.

pag 106 ad lib de Alimento.

**A**limentum in pilos, in ungues, & in extimam  
ſuperficiem ab internis partibus pervenit,  
ruſusque ab externis partibus extimaque ſuperfi-  
cie ad interna redit.

Ad

Ad paginam III.  
ad finem lib. de locis in homine.

**Q**ui ex pulmonis inflammatione, aut morbo laterali pus intro colligunt, minime moriuntur, sed convalescunt.

## Index Sectionum & Capitum in singulis Sectionibus Contentorum.

### Sectio Prima.

	pag.
<b>J</b> Usjurandum.	I
Lex.	2
De Arte.	3
De Prisca medicina.	4
De Medico.	6
De Decenti habitu.	7
Præceptiones.	8

### Sectio Secunda.

<b>L</b> iber Prænotionum.	10
De Humoribus.	24
De Crisibus.	26
De Diebus criticis.	30
Prædictorum Liber Primus.	30
Secundus.	32
Coactæ prænotiones.	34

### Sectio Tertia.

<b>D</b> E Natura hominis.	77
De Genitura.	79
De Natura pueri.	80
F f 2	De



## Index.

<i>De Carnibus.</i>	84
<i>De Septimestri partu.</i>	86
<i>De Octimestri partu.</i>	86
<i>De Superfœtatione.</i>	87
<i>De Dentitione</i>	88
<i>De Corde.</i>	89
<i>De Glandulis.</i>	89
<i>De Ossium natura.</i>	90
<i>De Aere locis &amp; aquis.</i>	90
<i>De Flatibus.</i>	96
<i>De Morbo Sacro.</i>	97

## Sectio Quarta.

<b>D</b> <i>E Salubri victus ratione.</i>	99
<i>De Victus ratione lib. Primus.</i>	100
<i>Secundus.</i>	101
<i>Tertius.</i>	104
<i>De Insomniis.</i>	105
<i>De Alimento.</i>	106
<i>De Ratione victus in morbis acutis.</i>	107
<i>De Locis in homine.</i>	110

## Sectio Quinta.

<b>D</b> <i>E Morbis liber primus</i>	111
<i>Secundus.</i>	113
<i>Tertius.</i>	115
<i>Quartus.</i>	118
<i>De Affectionibus</i>	119
<i>De Internis affectionibus.</i>	122
<i>De Natura muliebri.</i>	124
<i>De Mulierum morbis.</i>	125
<i>De</i>	De

# Index.

De his quæ uterum non gerunt.

128

## Sectio Sexta.

DE Officina medici.

129

De Fracturis.

130

De Articulis.

131

De Capitis Vulneribus,

134

## Sectio Septima.

DE Morbis Epidemiis.

136

Liber Aphorismorum.

191

## Sectio Octava.

EPISTOLÆ.

217

Index Rerum præcipuarum quæ hoc  
Opere Continentur.

A

Abortus causa. 88. Futuri signum.

pag.

207

Acetum biliosis magis quam melancholicis  
confert.

109

Adole-

# Index.

<i>Adolescentiæ morbi.</i>		200
<i>Adolescentis in foro Mendacium historia.</i>		161
<i>Adolescentis in Melibæa historia.</i>		178
<i>Adolescentis in cujus os serpens irrepserat historia,</i>		182
<i>Ægrotis in quibus gratificandum.</i>	-	185
<i>Æstate, morbi infestantes.</i>	-	199
<i>Alimentum quid.</i>	106	Triplex. 97
<i>Allii vires.</i>	-	103
<i>Alvi dejecto quæ bona, quæ mala.</i>	15	74
<i>Amazones infantes masculos luxant.</i>		133
<i>Anaxionis historia.</i>	-	171
<i>Angina prognosis.</i>	22 55 206. 210.	
<i>curatio.</i>	-	109
<i>Angina liberis mites, servis vehementissima.</i>		187
<i>Anginosa juxta Aristionem historia.</i>		161
<i>Anima corporis humani portio.</i>	-	100
<i>Anni divisio.</i>	-	104
<i>Anni tempora considerata.</i>	-	90
<i>Anni temporum maximæ mutationes observanda,</i>		94
<i>pro Anni varia constitutione varii morbi,</i>	93	94
<i>Apii facultates.</i>	-	103
<i>Aphoniam tremor solvit,</i>	-	36
<i>Apollonii historia.</i>	-	175
<i>Apoplexiæ præsagia.</i>	64. 65. 196.	211
<i>Aquæ quænam calidæ. 91, quænam optimæ, &amp; præva</i>	-	92 151
<i>Aquiloniæ tempestatis incommoda.</i>	25	199
<i>Aqua vorax.</i>	-	186
<i>Articulus presentis febre, suam in sedem reponendus non est.</i>	-	131
<i>Asiatici Europæis minus bellicosi.</i>	-	55
<i>Asparagi vires.</i>	-	103
<i>Astronomia ad artem medicam confert,</i>		91
<i>Athletarum habitus boni periculosi.</i>		191
<i>Avis fit ex ovi luteo,</i>		84
<i>Auris doloris præsagia.</i>	-	22

*Aurium*



# Index.

200			
161	<i>lurium affectus.</i>	:	43
178	<i>lurium sordes dulces quid significant.</i>	-	186
182	<i>lustrina tempestatis incommoda,</i>	25	199
185	<i>lusioni historia ex capitis vulnere mortui,</i>		180
199	<i>lutione morbi infestantes,</i>	-	199

## B

171	<i>Beta facultates,</i>	-	103
109	<i>Bilis atra dejectio quid significet,</i>		28
187	<i>Biliofi egre cibi abstinentiam ferunt</i>	108.	202
161	<i>Brachii os fractum diebus quot firmetur :</i>		130
100	<i>Brassica vires.</i>	-	103

## C

94	<i>Calculum frangentia nulla dantur,</i>		64
103	<i>Calculi in vesica signum,</i>		119
36	<i>Calidum immortale vocatum.</i>		84
175	<i>Caloris &amp; frigoris inaequalitas,</i>	14	27
211	<i>Calvi in Larissa historia,</i>	-	169
151	<i>Calvitie a cerebri consumptione,</i>	-	185
199	<i>Canales pro cruribus fractis,</i>	-	130
186	<i>Cancer oculus</i>		210
131	<i>Capitis dolores in febribus,</i>		22
55	<i>Capitis doloris cura,</i>		209
103	<i>Capitis doloris ex utero cura,</i>		190
91	<i>Capita debilia habentes numquam egregii potiores,</i>		91
191	<i>Caput &amp; lien morbis maxime obnoxia,</i>		119
84	<i>Capitis fluxiones,</i>		89
22	<i>Capitis partes quae tuto secari possunt, &amp; quando</i>		
	<i>sectio instituenda.</i>		135
	<i>Capitis os quomodo secandum,</i>		136
	<i>Ex Capitis vulneribus perituri signa,</i>		135

# Index.

<i>Hieme quam æstate diutius vivunt,</i>	135
<i>Cardialgia quando funesta.</i>	50
<i>Carnis omnis generis qualitates,</i>	102
<i>Carus &amp; Coma,</i>	42
<i>Cauonis peripneumonia laborantis historia,</i>	189
<i>Cephalalgia prognosis &amp; cura,</i>	41. 42
<i>Cerebrum glandula est,</i>	89
<i>Cerebri concussio,</i>	66. 181
<i>Cerebri sphacelismus.</i>	113. 213
<i>Ckerionis historia,</i>	158
<i>Cibus &amp; potus paulatim addendus vel detrahendus</i>	121
<i>Ciceris vires,</i>	102
<i>Clazomenii historia,</i>	146
<i>Cleonactidis historia,</i>	143
<i>Conceptus signa, 85. 87. impedimentum, 207.</i>	
<i>Remedium,</i>	128
<i>Concocta, non cruda, educenda,</i>	193
<i>Consuetudini aliquid dandum,</i>	193
<i>Continentia, contenta &amp; impetum facientia,</i>	188
<i>Contrariorum contraria sunt remedia, 78. 97 &amp;</i>	
<i>188; paulatim sunt adhibenda,</i>	184
<i>Convolutulus sanguineus,</i>	123
<i>Convulsio, quando &amp; quibus funesta,</i>	54. 205
<i>ejus cause 24. 210. cura,</i>	203
<i>Cor musculus est, 89 &amp; sanguinis fons,</i>	118
<i>Corpus totum spirabile &amp; omnia consensientia</i>	106. 187
<i>Coxendicis doloris curatio.</i>	121. 221
<i>Cranii fractura ejusque 5 genera</i>	67. 135
<i>Crisin quæ ostendant, 27. sexto die, &amp; decimo</i>	
<i>quinto salutaria,</i>	152. 193
<i>Critonis historia,</i>	145
<i>Cubiti os fractum quot diebus coalescat,</i>	130
<i>Curandi gratis qui, &amp; quando,</i>	19
<i>Cuis rarias &amp; compatio quid efficiant,</i>	115

## D

184	E	
123		
205	<b>E</b>	Brietatis remedium, 110
203		Emphyematis prognosıs, 206
118		Epicharmi uxoris historia, 182
137		Epicratis uxoris historia, 142
221		Ab Epilepsia ut juvenes liberantur, 197, 205
135		Nil habet aliis morbis divinius, 97
		quinam ea non apprehendantur, 98
198		Epileptici plerumque fiunt melancholici & e
145		contra, 188
130		Erasini historia, 144
9		Erysipelatis prognosıs, 210
115		Euryanactis filie historia, 160
		Exercitationis justa mensura, 185
		Excreta non copia æstimanda, 194
		Experimentum periculosum, 191

## G



# Index

## F

<b>F</b> abarum vires.	
<b>F</b> acies Hippocratica quid.	10. 43.
<b>Ex</b> facie signa.	45. 184.
<b>F</b> amem vini potio solvit, & ubi adest labor nocet.	196.
<b>F</b> amula in Omilo historia.	180.
<b>F</b> asciae quomodo deligandae.	131.
<b>F</b> auces exulceratae.	22. 49.
<b>F</b> ebrium signa.	21. 23. 28. 34.
<b>F</b> ebres aestate magis grassantur.	141.
<b>F</b> ebri quarianae cura.	120.
ejus privilegium, 187. 208. terminus	187. 196.
<b>F</b> ebri tertianae cura. I I + terminus	27. 203.
<b>F</b> ebres sine sudore quando contingant.	191.
<b>F</b> emoris articulus quorū modis luxetur.	133.
<b>F</b> erulae quando admoventur.	130.
<b>F</b> istulae quae pessimae.	68.
<b>F</b> latus eruptio quae probanda.	16.
<b>F</b> luor albus.	124.
<b>F</b> œtus mortui signa. 87. 125.	
<b>F</b> œtus quando movere incipit.	82.
<b>F</b> rictionis vires & commodū. I 29.	132.
<b>F</b> rigora quae vitanda.	105.
<b>F</b> ullonis historia.	190.

## G

<b>G</b> enitura septem dierum.	
<b>G</b> ravitas corporis	

## H

<b>H</b> æmorrhagiæ commodæ.	
<b>H</b> æmorrhagia narium. 14. 52. largæ, solutæ.	131.

# Index

Enaribus 4to die, non probanda	152. 183
Hæmorrhoidum cura; 10. curatio, suspecta.	179
Hæmorrhoidum fluentium commoda.	26. 28
Hermocratis historia.	155
Hærophontis historia.	140
Hærophyti historia.	172
Hieme morbi infestantes,	200
Historia cujusdam sagitta juxta inguen percussæ.	181
Hominis corpus ex pluribus constat.	78
Homo totus a natura morbus.	214
Hominis innominati historia.	148
Hordei facultates.	101
Hippæ sororis historia.	190
Humeri os quomodo reponendum.	132
Humores pro anni temporum differentiis augentur.	78
Humores ducendi quo maxime vergant.	193
Humidi quatuor species 79. 24.	118
Hydropis remedium.	188
Hydropis sicci signum.	201
Hydrops pulmonis.	115. 122
Hypochondria in morbis qualia probantur.	13
Hypochondriorum tumor.	13. 49. 50
Hysterici affectus cura.	124

## I

Icterus febribus succedens.	27, 204
Ieiunium qui facilius ferunt.	193
Ex igne & aqua omnia constant.	100
Ilei causa, signa & cura.	105. 115
Infantis situs in utero.	83
Infantium morbi.	200
Inflammationi quæ convenient, quæ non.	121
Insania quandoque utilis.	28
Insomnia quid significant.	105
Insulæ continenti vicinæ marinis rigidiores.	101

# Index

Isagoge filii historiae. 186  
 Iudicantia in melius ne statim appareant. 187  
 Quae iudicantur & iudicata sunt non morienda. 189  
 Ischuria rigorem praecedat. 188  
 Iuvenes multo egent alimenta. 189  
 Iuvenum morbi. 190

## L

Labores cibos praecedant. 186  
 Lacti extincto quae medeantur. 187  
 Lactis qualitates, 101 quibus conveniat. 208  
 Larissae virginis historia. 174  
 Leguminum esus incommoda. 182  
 Lentescit quae qualitates habeant. 182  
 Lienes magni. 120, 183  
 Lienteria praesagia. 63  
 Lingua humorum serum quale sit indicat. 186  
 Lini seminis vires. 102  
 Lochiorum suppressio. 124  
 Lumbricus latus quando & quomodo generetur. 119

## M

Machinis quando & quibus utendum. 130, 181  
 Macrocephali quomodo prognari. 251, 95  
 Manuum gesticulatio. 102  
 Manus luxatae signa & cura. 112  
 Medicam artem dari probatur. 4. ex quibus conficitur. 116  
 Medicina artem nobilissima, 2. Ad eam cognoscendam sex adiumentis opus est. 111  
 Ejus definitio 2, 27, 100. Dea ascripta. 110, 105  
 Medicina optima est interdum medicinam non facere. 112  
 132 procrastinatio ab ea abstinere. 114



# Index.

Medicus calculo laborantes secare non debet, 1. con-	
sultationes audet, 9. Deum invocet, 105. In-	
strumentum omnis generis habeat preparata,	
Siprobis, alteri nunquam invidet, 9. Ejus in-	
dulgentia egrotanti saepe nocet, 9. quæ eum	
deceant, 6, 7. Silere jubetur, 2. De quibus	
egrotum interroget, 121. Multarum rerum ex-	
perientiam habere oportet. 132. Mali quibus si-	
miles. 5. Medicus nesciens quiescere periculo-	
sus, 184. quæ illi considerata ut recte in cura-	
tione morborum procedat,	111, 184
Melancholia præsigna,	65.
Melidæ historia,	149
Membrorum discretio quot diebus fiat,	81
Mensium mensura justa, & tempus,	126
Ad menses immodice fluentes.	129. 153
Menstruum reientorum incommoda & cura,	69, 124, 125
Mentis facultates,	103
Mentis humanæ sedes,	89
Metonis historia,	145
Molæ causa,	127
Morborum acutorum terminus, 27, 195, acuti qui.	
107, 120, acutorum incertæ prædictiones,	195
Morbus cujus causa nota, facile curatur,	97
Morborum communium causa est Aer.	79
Morbi, qui letales, dubii, aut minime letal-	
es,	112, 120
Morbos quæ prohibent,	185
Morbis extremis extrema conveniunt remedia	192
In morbis longis terram mutare bonum est,	186
Morbi secundum anni tempora augentur & desi-	
nunt,	78
Morbi nutriti quomodo desinant,	186
Morbus alteri succedens ut plurimum perniciosus	121
Morbi omnes ex bile & pituita oriuntur	119
Mororum facultates,	104
Mulieris	

# Index.

<i>Mulieris apud Pantanidem historia,</i>	162
<i>Mulieris in Cyrico decumbentis historia,</i>	176
<i>Mulieris in foro Mendacium historia,</i>	163
<i>Mulieris gravidæ historia</i>	16
<i>Mulieris gravidæ signum,</i>	207
<i>Mulieris gravidæ cum dysenteria ad partum superfunt,</i>	33
<i>Mulieri gravidæ caute secunda vena,</i>	206
<i>Muliebria educit suffitus aromatum,</i>	206
<i>Mulieris in Thaso historia,</i>	166. 174
<i>Mulieris iuxta Tisamenum historia,</i>	162
<i>Mulieris quæ venenatum medicamentum biberat historia,</i>	182
<i>Mutationes cavendæ &amp; considerandæ,</i>	25. 108. 185

## N

<b>N</b> <i>Amysæ historia,</i>	189
<i>Nasturtii vires,</i>	103
<i>Natura morborum medicatrix,</i>	186
<i>Navis gubernatoris historia,</i>	182
<i>Nerei filix historia,</i>	181
<i>Nervorum morbi graviores,</i>	110
<i>Nervorum subsultus,</i>	38
<i>Nicodemi historia.</i>	173
<i>Nimium omne naturæ inimicum,</i>	197

## O

<b>O</b> <i>Occipite laborante, in fronte venæ sectio faciat</i>	184, 208
<i>Oculorum affectus,</i>	11, 46
<i>Oculorum dolorum cura,</i>	210
<i>Oecetæ uxoris historia,</i>	163
<i>Ossa fracta habentes tenuiter cibandi,</i>	130
<i>Ossa luxata cum vulnere, minime sani reponenda</i>	194
<i>Ossibus frigidum inimicum,</i>	206
<i>Oscitationis curatio,</i>	192

# Index.

P

<b>P</b>	<b>Anis vires,</b>	101
	<b>Parii historia,</b>	166
	<b>Paronychia remedium,</b>	154
	<b>Parotides quid por tendant,</b>	44
	<b>Paroxysmo parce cibandum,</b>	192
	<b>Partus sine dolore periculosus,</b>	69
	<b>Partus ut fit 83. quibus mensibus vitalis. 83. 85. 86</b>	
	<b>octimestris. 86 ad eum facilitandum, 127. 207</b>	
	<b>Pectori frigida inimica,</b>	206
	<b>Pepasmus quid,</b>	55
	<b>Periclis historia,</b>	170
	<b>Perepneumonia abscessus succedentes,</b>	20
	<b>quomodo fiat ejusque signa, 116. 211. ut a pleuritide</b>	
	<b>differat, 111. ejus &amp; pleuritidis curatio,</b>	109
	<b>Perniciosa sine signis levantia, mortifera</b>	31
	<b>Phaethusæ historia,</b>	189
	<b>Phile's filii historia.</b>	183
	<b>Philini uxoris historia,</b>	141
	<b>Philisci historia,</b>	138
	<b>Philistis historia,</b>	158
	<b>Pbrenitici historia,</b>	169
	<b>Pbrenitici curatio,</b>	120
	<b>Phibifis quando lethalis, 60. quibus præcipue</b>	
	<b>fit. 61, 205, signa diagnostica,</b>	112, 122
	<b>Piscium saxatiliu natura,</b>	102
	<b>Pithyonis historia,</b>	154-167
	<b>Pleuritis quid. 120. quænam salutaris, quæ non.</b>	57.
	<b>117. ejus curatio. 107. in sanguinea non mittendus san-</b>	
	<b>guis 26. 57. 185. Sicca funesta. 56. quando in</b>	
	<b>empyema transeat 205. ejus tum curatio, 117. alvi</b>	
	<b>fluxu corripit malum</b>	209
	<b>Podagra quænam salutaris, quæ non.</b>	33
	<b>Quæturnum est malum, &amp; ægerime soluitur,</b>	121
	<b>Polypi curatio</b>	120



# Index.

Ptisana laudes,	107
Pregnantes quando purgandi,	201
Puer in utero alimentum ore fugit,	85
Puris optimi nota,	14
Purgatio sanis periculosa,	202
quid eam præcedere debeat,	194. 20
Purgandum quando & quomodo	201
Pyrorum facultates	104

## R

Rapi facultates,	103
Rauedines in senibus non coquantur,	196
Recidiva quando metuenda, 28. quomodo fiat, 152.	195
Renum vitia quæ non sanantur,	188. 209
Respirationis præsagia,	48
Rigor ante partum metuendus,	69
ejus præsagia,	203
Ructus acidus in lienteria bonus.	208
Rutæ vires.	103



## S

Sanguinis mictio quid significet,	204
Sanguinis missio purgationem præcedat 58. quando nocet 66. quando mittendus in morbis acutis,	109
Sanguinem e venis fluentem sistentia,	188
Sanguinis stillæ damnosæ,	38
Sanitatis regula & tutela.	186
Satyri pollutione nocturna laborantis historia,	188
Scytharum modus vivendi, & cur evirati.	96
Secundas relictas expellentia.	124 207
Semen ab omnibus corporis partibus procedit,	79
Senum morbi.	200

Signa

# Index.

107	Signa in morbis quæ bona, quæ mala.	18. 19. 58
201	Sileni historia,	139
85	Silentii & sermonis habenda ratio.	188
14	Simonis exanthemata.	184
202	Similitudines optimis medicis imponunt.	188
4. 20	Sinapi vires	103
201	Sincipitis vulnera magis periculosa.	135
104	Singultus in febre funestus. 37 ejus cura.	209
	Sitis perfectæ purgationis finis.	202
	Sitis remedia.	185
	Solani facultates.	108
	Somni præsagia.	194
103	Spiratio bona & mala.	12
196	Spiritus necessitas.	97
2. 195	Sputorum signa.	17: 18: 187: 212:
209	Sterilitatis causæ, 126. non semper culpandi albi menses.	179
48	Sternutationes quando juvent, quando non.	18. 38
69	Sudores boni & mali	12. 27. 70. 203
203	Smillæ carnes præstantissimæ.	110
208	Suppurationum observatio,	14. 18. 21
103	Surditatis commoda 28. 202. In febris cura.	203
	Sutoris in Pityo historia,	181

## T

204	Tabidis autumnus malus,	198
uando	Tabes dorsalis,	114
109	Tabes occulta quando fit,	111
188	Tabes quæ sanabilis, quæ non,	32, 206
38	Testes & pudenda contracta.	15
186	Tibiæ ossa fracta quot diebus firmentur,	131
188	Triticæ natura & vires.	101
96		
207		
79		
200		
Signa		

# V

<b>V</b> enarum & arteriarum origo.	106
Vene sectio ubi instituenda.	90
Venarum circa caput supervenit,	113
Veneris effectus.	187
Venti pro regionum & locorum situ differunt.	101
Ventres hieme & vere calidissimi.	193
Vere morbi infestantes.	199
Vesica inflammatio.	21
Victus humidus quibus conveniat.	194
Victus tenuis quando periculosus, quando con-	
veniat,	192
Vigiliae quid portendant.	45
Vini natura & vires.	202
Vini merati in flatibus, repletione, aut tormini-	
bus vires.	122
Virginis Abderitanae historia.	170
Viri cujusdam in Oeniadis historia.	179
Virium infirmitates ut dignoscenda.	109
Vlcus capitis nulla re madefaciendum.	135
Vlceris lividi & aridi prognosis,	12
Infra Umbilicum doloribus quid faciendum	120
Vocis praesagia.	43
Vomitio quae laudabilis quae non.	17, 70
in febribus quando expectanda.	41
Vomitus quando ciendus, ejusque commoda,	99. 104
Urina quae probanda, quae junctae, quidque signi-	
ficent 16: 27: 71: 204: 212,	
Uterus sexentarum Arumnarum auctor.	216
Uteri Cancer.	124
Uteri ad conceptum idonei & inidonei signa.	33
	34 128
Vulnorum prognosis	67. 68. 209
Vulnerati tenuiter cibandi.	121

F I N I S.



Errata per pauca nec magni momenti ita corrigat benignus  
lector.

Pag. 20. lln. 16. lege decumbunt. pag. 28. l. 16. lege dolores  
Pag. 161. l. 11: lege διαχρηματων in exidertur a.  
δαταται. Pag. 162. l. 4. lege Tisamenum. pag. 170.  
l. 23. lege accidis. Ibid. l. 24. lege intelligebat. pag. 173. l.  
14. lege occasum. pag. 175. l. 9 lege jam. pag. 176. l. 16. lege  
precedebant. pag. 213. l. 13. lege continetur.